

58017
4371

SCHEDÆ

OPERIS QUOD INSCRIBITUR

PLANTÆ FINLANDIÆ EXSICCATÆ

E


MUSEO BOTANICO UNIVERSITATIS HELSINGFORSIENSIS
DISTRIBUTÆ

FASC. XXI—XLII

N:ris 1001—2081



HELSINGFORSIÆ 1933, 1944



SCHEDÆ

OPERIS QUOD INSCRIBITUR

PLANTÆ FINLANDIÆ EXSICCATÆ

E

MUSEO BOTANICO UNIVERSITATIS HELSINGFORSIENSIS
DISTRIBUTÆ

FASC. XXI—XLII

N. ris 1001—2081



HELSINGFORSIÆ 1933, 1944

2
290
L
- 21+2

HELSINGFORS 1944
TILGMANN'S TRYCKERI

1001. *Cystopteris fragilis* (L.) Bernh.

Karelia Ladogensis, par. Sortavala, Kekrinlahti, in fissuris rupium in nemore. 13 Iul. 1933.

leg. K. H. Pankakoski.

Per totum territorium dispersa, in Finlandia australi et media satis frequenter aut passim obvia, in parte boreali et in Lapponia plerumque rarior, sed usque ad summum septentrionem progreditur.

1002. *Struthiopteris filicastrum* All.

Tavastia australis, par. Jokioinen, loco umbroso juxta rivulum prope templum. 22 Aug. 1917.

leg. S. Salmenlinna.

In Finlandia australi et media plerumque passim (— satis frequenter) obviam, excepta Alandia, ubi rara esse videtur. In Finlandia septentrionali etiam rara, in Lapponia rarissima, tantum in partibus occidentalibus.

1003. *Woodsia ilvensis* (L.) R. Br.

Regio Aboënsis, par. Lojo, in fissuris rupium graniticarum in insula Storön. 15 Iul. 1916.

leg. Harald Lindberg.

Per totum territorium plus minusve frequenter dispersa est.

1004. *Woodsia ilvensis* (L.) R. Br.

Nylandia, par. Esbo, Bodom, in fissuris rupium graniticarum. 2 Sept. 1920.

leg. C. Cedercreutz.

Cfr n. 1003.

1005. Botrychium lunaria (L.) Sw.

Karelia Ladogensis, par. Sortavala, Melloinen, in prato sicco prope Vuorlahti. 12 Jul. 1932.

legg. H. Pullinen, A. Tiirikka, H. Tulla.

In tota fere Finlandia et Lapponia usque ad summum septentrionem, regionibus superioribus Lapponiæ tantum exceptis, plerumque passim aut rarius, interdum autem frequentius occurrit.

1006. Pilularia globulifera L.

Tavastia australis, par. Luopioinen, in pago Puntikkala, in lacu Kukkiajärvi juxta prædium Saksala, in fundo limoso in aqua 0.5 m alta, inter *Scirpus lacustris* et *Phragmites*. 24 Aug. 1933.

leg. R. Bäck.

Tantum loco supra allato in Finlandia lecta est, anno 1933 detecta.

1007. Equisetum silvaticum L.

Satakunta, par. Kuru, in abiegno umbroso juxta Taipaleenniemi in pago Parkkuunkylä. 18 Aug. 1932.

leg. H. Edelmänn.

Per totum territorium frequenter aut frequentissime dispersum.

1008. Equisetum arvense L.

Tavastia australis, par. Sääksmäki, Ikkala, in silva graminosa humida juxta ripam lacus. 12 Jul. 1933.

leg. K. Linkola.

In formis multis per totum territorium dispersum.

1009. Equisetum arvense L. × E. heleocharis Ehrh.
(*E. litorale* Kühlewein)

Al a n d i a, par. Geta, ins. Snäckö, in palude haud procul a litore maris copiosissime. 27 Iun. 1933.

leg. Harald Lindberg.

Forma hybrida in Finlandia rarissima, tantum locis duobus in parte australi lecta est.

1010. Equisetum palustre L.

O s t r o b o t t n i a K a j a n e n s i s, par. Sotkamo, Korholanmäki, in palude. 10 Iul. 1932.

leg. K. Metsävainio.

In nonnullis plagis præcipue partis orientalis frequenter (— frequentissime) crescit, in aliis præcipue in vicinitate oræ occidentalis rarum aut non est, ceteroquin sæpius passim aut satis frequenter occurrit et boream versus usque ad summum septentrionem progreditur.

1011. Equisetum heleocharis Ehrh., formæ.

S a v o n i a a u s t r a l i s, Mikkeli (St. Michel), Moisio, in ripa limosa stagni Moisioilampi. 10 Iul. 1932.

leg. Laini Pantsar.

In Finlandia pleurumque frequenter et copiose crescit, boream versus ut in Lapponia minore tantum frequentia occurrit.

1012. Equisetum heleocharis Ehrh., formæ.

N y l a n d i a, par. Helsinge, in fossa juxta viam prope templum. 18 Iun. 1932.

leg. M. Puolanne.

Cfr n. 1011.

1013. Equisetum hiemale L.

Tavastia australis, par. Tammela, in campo arenoso prope sepulcretum juxta oppidulum Forssa. 15 Aug. 1916.

leg. O. Tähtinen.

Cfr n. 10.

1014. Lycopodium selago L. f. ad f. *appressa* Desv.

Kuusamo, Korojoki, ad saxa juxta viam. 16 Jun. 1911.

leg. Edv. af Hällström.

Cfr n. 12.

1015. Lycopodium annotinum L.

Nyländia, par. Esbo, Bodom, in abiegno subhumido. 31 Aug. 1920.

leg. C. Cedercreutz.

In tota fere Finlandia et Lapponia frequenter obviam.

1016. Lycopodium annotinum L.

Satakunta, par. Tyrvää, Nuupala, in abiegno hylocomioso. 8 Sept. 1916.

leg. V. Heikinheimo.

Cfr n. 1015.

**1017. Lycopodium annotinum L. f. *pungens* Desv.
(f. *alpestre* Hartm.)**

Lapponia Kemensis, par. Muonio, Kätkäsvanto. 27 Aug. 1915.

leg. J. Montell.

In alpinis Lapponiæ frequenter invenire indicatur. Cfr n. 1015, 1016.

1018. *Lycopodium clavatum* L.

Satakunta, par. Tyrvää, Nuupala, in abiegno hylocomioso.
8 Sept. 1916.

leg. V. Heikinheimo.

In tota fere Finlandia et Lapponia frequenter crescit.

1019. *Lycopodium clavatum* L. f. *lagopus* Læst.

Lapponia Kemensis, par. Muonio, Kätkäsuvanto. 27 Aug.
1915.

leg. J. Montell.

In Lapponia præcipue superiore et Finlandia maxime boreali. Cfr
n. 1018.

1020. *Lycopodium complanatum* L. f. ad f. *polystachyum* Lindb. fil.

Lapponia Kemensis, par. Muonio, in silva sicca cladiosa
prope templum. 19 Sept. 1915.

leg. J. Montell.

Cfr n. 15.

1021. *Selaginella selaginoides* (L.) Link.

Ostrobottnia Kajanensis, par. Sotkamo, Korholan-
mäki, in prato paludoso
juxta Haapalahti. 10 Jul.
1932.

leg. K. Metsävainio.

In Lapponia et Finlandia boreali plerumque satis frequenter obviam;
in parte maxime occidentali jam supra 67° rarescit, in parte
orientali infra 62°. In cetera Finlandia raro (— rarissime) sed
adhuc in Alandia lecta est.

1022. Selaginella selaginoides (L.) Link

Ostrobottnia Kajanensis, par. Sotkamo, Haapaniemi
in prato paludoso. 8 Aug.
1930.

leg. M. Lindqvist.

Cfr n. 1021.

1023. Isoëtes echinosporum Dur.

Lapponia Kemensis, par. Muonio, in flumine juxta temp-
lum. 26 Aug. 1915.

leg. J. Montell.

In tota fere Finlandia (Alandia excepta) et Lapponia occidentali
et australi varia frequentia indicatur.

1024. Sparganium submuticum (Hartm.) Neum.
(*S. hyperboreum* Læst.)

Lapponia Kemensis, par. Muonio, in palude prope temp-
lum. 12 Jul. 1916.

leg. J. Montell.

In Lapponia et Finlandia boreali sat frequenter crescit, ad meridiem
versus usque ad Savoniam borealem lectum est.

1025. Potamogeton natans L.

Tavastia australis, par. Teisko, in lacu Kirkkojärvi.
Fl. 13 Jul. 1919, fr. 27 Jul. 1919.

leg. R. Idman.

In tota fere Finlandia frequenter obvius, in Finlandia maxime sep-
tentrionali et Lapponia rarescit, sed ad 69° fere procedere
videtur.

1026. Potamogeton alpinus Balbis

Satakunta, par. Kokemäki (Kumo), Sipilä, in rivulo Maalisjärven puro. 5 Aug. 1932.

leg. L. Pohjala.

In tota Finlandia et Lapponia dispersus.

1027. Potamogeton gramineus L. var *fluviatilis* Fr. f. *angustifolius* Tiselius.

Lapponia Kemensis, par. Muonio, in flumine prope tempulum. 22 Aug. 1916.

leg. J. Montell.

Species in formis diversis per totum territorium frequenter dispersa est.

1028. Potamogeton compressus L.
(*P. zosterifolius* Schum.)

Alandia, par. Saltvik, in lacu Toböle träsk. 31 Iul. 1933.

leg. C. Cedercreutz et G. Åberg.

Cfr n. 433.

1029. Potamogeton obtusifolius Mert. et Koch

Savonia borealis, par. Maaninka, in fossa in palude juxta pagum Pöljänkylä. 30 Iul. 1918.

leg. O. Kyyhkynen.

In Finlandia raro obvius, sed per maximam partem invenitur.

1030. Potamogeton filiformis Pers. mf. *terrestris*

Alandia, par. Ekerö, Storbyn, Sandviken, in litore arenoso humido. 21 Iun. 1933.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 28, 434. In mari ad tæniae exteriores sæpe frequenter — satis frequenter præcipue ad oras australes, sed quamvis deminuta frequentia ad summum septentrionem provenit, in tæniis interioribus rarior; in aqua dulci in Tavastia australi, lac. Vesijärvi, in lac. Onega, in Ostrobottnia Kajanensi, in Kuusamo et locis nonnullis in Lapponia lectus est.

1031. Potamogeton filiformis Pers. × **P. vaginatus** Turcz.
(*P. fennicus* Hagstr.)

Ostrobottnia australis, par. Korsnäs, Harrström, in sinu maris. 10 Aug. 1929.

leg. A. Lindfors.

Tantum in Sinu bottnici locis paucis lectus est. N. 435 *P. filiformis* Pers. × *P. vaginatus* Turcz. (det. O. Hagström 1911) verisimiliter *P. pectinatus* L. × *P. vaginatus* Turcz. (teste O. Hagström 1919) est.

1032. Najas marina L.

Regio Aboënsis, par. Korpo, Långviken, in aqua subsalsa non profunda, fundo limoso. 4 Sept. 1920.

leg. O. Eklund.

In maribus Finlandiæ australis sat raro invenitur; ad septentrionem versus usque ad 63° 15' occurrit. In Finlandia numquam in aqua dulci lecta est.

1033. Sagittaria sagittifolia L.

Tavastia australis par. Vesilahti, Ojoinen, in ripa sinus
Pylkinlahti. 26 Iul. 1932.

leg. N. Söyrinki.

In maxima parte Finlandiæ passim, in nonnullis tamen plagis,
præcipue in parte orientali frequenter aut satis frequenter
provenit. Etiam in Lapponia Kemensi lecta est. In Alandia
incerta.

1034. Sagittaria natans Pallas

Savonia borealis, par. Leppävirta, Konnus, Konnuskoski,
in sinu aqua tranquilla, 60 cm alta.
29 Iul. 1932.

leg. A. Vaarama.

Cfr n. 440.

1035. Leersia oryzoïdes (L.) Sw.

Karelia australis, Kymi (Kymmene), Mussalo, in ripa
limosa graminosa ad ostium fluminis
Kymijoki (Kymmeneälv). 24 Aug. 1932.

leg. A. Ulvinen.

Planta rarissima in Finlandia, etiam in Isthmo Karelico, ad ostium
fluminis Systerbäck lecta est.

1036. Phalaris arundinacea L.

Tavastia australis, par. Teisko, in ripa insulæ Vähä
Kaljonsaari. 29 Iul. 1917.

leg. R. Idman.

In tota Finlandia et Lapponia dispersa.

1037. Phalaris arundinacea L.

Ostrobottnia australis, par. Korsnäs, in litore maris.
17 Iul. 1917.

leg. A. Lindfors.

Cfr 1036.

1038. Anthoxanthum odoratum L.

Nylandia, par. Helsinge, Tamunisto, in colle aprico in margine
querceti. Iun. 1919.

leg. K. Linkola.

Cfr n. 37 a, b.

1039. Hierochloë odorata (L.) Wahlenb. var. firma F. Nyl.

Tavastia australis, par. Hattula, Parola malm, in campo
arenoso. 30 Mai. 1910.

leg. A. Wegelius.

Cfr n. 38, 39, 444.

1040. Phleum alpinum L.

Savonia borealis, par. Maaninka, in prato humidiusculo
prope pagum Pöljänkylä. 1 Iul. 1918.

leg. O. Kyyhkynen.

In maxima parte Lapponiæ et Finlandiæ septentrionalis frequenter
provenit. Infra 65° in parte occidentali et 64° in parte orientali
frequentia minuitur, sed saltem usque ad 62° lectum est; dein
etiam in Hogland, insula in Sinu Finlandico, rarissime occurrit.

1041. Alopecurus arundinaceus Poir. × A. geniculatus L.
(*A. Marssonii* Hausskn.)

Alandia, par. Lemland, Järsö, in prato juxta mare. 23 Iul. 1902.

leg. F. W. Klingstedt.

Cfr n. 448.

1042. Phippsia algida (Soland.) R. Br.

L a p p o n i a P e t s a m o e n s i s, Haukilampi, in alpe Pilguoaiv-
njunne, loco humido. 13 Aug.
1933.

leg. N. Söyrinki.

In summa Lapponia rara est.

1043. Agrostis stolonifera L.

(*A. alba* L.)

T a v a s t i a a u s t r a l i s, par. Längelmäki, Länkipohja, in prato
juxta ripam lacus. 14 Iul. 1933.

leg. T. Kontuniemi.

Cfr n. 47.

1044. Agrostis tenuis Sibth.

(*A. vulgaris* With.)

K u u s a m o, Akanlahti, in prato juxta stagnum Kuorikkilampi.
28 jul. 1916. Specimina distributa ex eodem caespite
capta sunt.

leg. Edv. af Hällström.

In tota Finlandia frequenter aut frequentissime et copiose — copio-
sissime obvia. In Lapponia subito rarescit, sed usque ad
summum septentrionem indicatur, quamquam non in omnibus
partibus occurrit.

1045. Agrostis tenuis Sibth. var. *aristata* (Hartm.)

K u u s a m o, Akanlahti, in prato juxta stagnum Kuorikkilampi.
28 Iul. 1916. Specimina distributa ex eodem caespite
capta sunt.

leg. Edv. af Hällström.

Cfr 1044.

1046. Agrostis borealis Hartm.

K u u s a m o, Akanlahti, in prato paludoso. 14 Iul. 1914.

leg. Edv. af Hällström.

Cfr n. 453.

1047. *Aira praecox* L.

Alandia, insula Ekerö, loco arenoso sicco juxta viam ad Tullhuset. 18 Jul. 1919, 21 Jun. 1933.

leg. Harald Lindberg.

Planta rarissima in Finlandia, tantum locis nonnullis in insula Ekerö lecta est.

1048. *Phragmites communis* Trin. f. *flavescens* Custer

Regio Aboënsis, par. Lojo, Gerknäs, in aqua in Ahtialasundet, sat copiose unico loco una cum f. typica. 12 et 25 Aug. 1927.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 60. F. *flavescens* Custer tantum loco supra indicato in Finlandia lecta est.

1049. *Dactylis glomerata* L.

Regio Aboënsis, par. Lojo, SOLhem, in prato. 8 Jul. 1915.

leg. Harald Lindberg.

In Finlandia australi usque ad 62° plerumque frequenter invenitur. Ad septentrionem versus rarescit, sed in parte orientali usque ad 63° 30' lecta est; ulterius tantum adventicia occurrit.

1050. *Poa glauca* Vahl

(*P. caesia* Sm.)

Karelia Ladogensis, par. Sortavala, in fissuris apricis rupium in ins. Haukkariutta. 24 Jul. 1933.

leg. K. H. Pankakoski.

In Lapponia et in Finlandia orientali raro crescit.

1051. *Poa alpina* L.

Lapponia Enontekiensis, Pyhäkero in alpe Ounastunturi. 3 Sept. 1916.

leg. J. Itkonen.

Cfr n. 473.

1052. *Poa alpina* L.

Lapponia Inarensis, par. Utsjoki, 20 Iun. 1915.

legg. P. Ekwall et C. Finnilä.

Cfr n. 473, 1051.

1053. *Poa nemoralis* L.

Tavastia australis, par. Tyrväntö, Mälkiäinen, Kariniemi, in margine fossæ. 10 Iul. 1933.

leg. K. Linkola.

Cfr n. 474.

1054. *Poa palustris* L.

(*P. serotina* Ehrh.)

Tavastia australis, par. Sääksmäki, Nuutola, Harjula, in margine silvæ. 12 Iul. 1933.

leg. K. Linkola.

Per totam Finlandiam dispersa.

1055. *Poa alpigena* (Fr.) Lindm.

Kuusamo, Akanlahti, loco arenoso juxta »Keskikone». 8 Iul. 1914.

leg. Edv. af Hällström.

In Finlandia septentrionali et in Lapponia frequenter occurrit.

1056. *Poa angustifolia* L.

Regio Aboënsis, par. Lojo, SOLhem, in graminosis in rupe calcarea, sicca. 9 Jul. 1915.

leg. Harald Lindberg.

In Finlandia australi satis frequenter dispersa, in parte media usque ad Ostrobottniam Kajanensem et Ostrobottniam mediam crescit. In Lapponia et in Finlandia maxime septentrionali deest.

1057. *Poa angustifolia* L.

Tavastia australis, par. Tyrvântö, Mälkiäinen, Kariniemi, in declivibus siccis inter arbores. 9 Jul. 1933.

leg. K. Linkola.

Cfr 1056.

1058. *Glyceria aquatica* (L.) Wahlenb.

Regio Aboënsis, par. Kimito, in amne prope templum. 22 Jul. 1920.

leg. B. Olsoni.

Cfr n. 69, 480.

1059. *Glyceria aquatica* (L.) Wahlb.

Tavastia australis, par. Jokioinen, in fossa in palude prope Minkiö. 17 Aug. 1917.

leg. S. Salmenlinna.

Cfr n. 69, 480, 1058.

1060. *Festuca rubra* L.

Ostrobottnia australis, par. Korsnäs, loco graminoso ad domos. 15 Jul 1917.

leg. A. Lindfors.

In formis diversis in tota Finlandia et Lapponia frequenter, interdum frequentissime invenitur, in alpina tamen regione rarescit.

1061. Festuca rubra L. var. arenaria (Osborn) Fr.

Ostrobothnia australis, par. Korsnäs in litore marino,
lapidoso. 12 Jul. 1917.

leg. A. Lindfors.

In litoribus marium haud infrequens.

1062. Bromus mollis L.

Nylandia, Helsingfors, Kampen, in rupibus siccis. 20 Jun. 1919.

leg. M. Puolanne.

Cfr n. 81.

1063. Agropyron caninum (L.) PB.

Kuusamo, in silva umbrosa juxta flumen Oulankajoki. 26 Aug.
1914.

leg. Edv. af Hällström.

Cfr n. 83.

1064. Agropyron junceum (L.) × A. repens (L.)

(*A. acutum* (DC) Marss.)

Nylandia, oppidum Hangö, in litore arenoso una cum *A. repente*
crescens. 8 Aug 1920.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 489.

1065. Schoenus ferrugineus L.

Rossia, Karelia Pomorica, in palude juxta Suopais-
vaara. 5 Jul. 1897.

leg. I. O. Bergroth.

Cfr n. 491. In Finlandia maxime orientali (Karelia Ladogensis, par.
Suistamo) et in Kuusamo lectus est.

1066. Rhynchospora alba (L.) Vahl

Tavastia australis, par. Iitti, in palude juxta stagnum
Kirkkolampi. 30 Jun. 1919.

leg. M. Puolanne.

Cfr n. 87 a, b.

1067. *Rhynchospora fusca* (L.) Roem. et Schult.

Regio Aboënsis, par. Korpo, Aspö, loco paludoso in rupe
in insula Vidskär. 11 Iul. 1920.

leg. O. Eklund.

Cfr n. 88.

1068. *Scirpus radicans* Schkuhr

Karelia australis, par. Jääski, Sopero, in ripa limosa
fluminis Vuoksen. 9 Iul. 1915.

leg. K. J. Valle.

Tantum in Finlandia maxime austro-orientali crescit: in Karelia
australi, Isthmo Karelico et Karelia Ladogensi lectus est.

**1069. *Eriophorum opacum* (Björnstr.) Fernald
(*E. callithrix* auct. eur. p.m.p., non Cham.)**

Savonia borealis, par. Nilsjä, in declivi silvatico humido.
28 Iun 1915

leg. M. Kotilainen.

Cfr n. 498.

1070 a. *Carex dioeca* L.

Satakunta, par. Björneborg, Kunnäs, in palude prope Lang-
sanda. 13 Iul. 1932.

leg. H. Lagström.

In tota fere territorio occurrit et in nonnullis plagis, præcipue in
media parte Finlandiæ orientalis, ut etiam in multis locis
Laponiæ et Finlandiæ septentrionalis, frequenter sæpeque
copiose crescit; alii autem in plagis præcipue Finlandiæ austr-
lis (ubi tamen plerumque passim occurrit) rara est.

1070 b. *Carex dioeca* L.

Satakunta, par. Björneborg, Kunnäs, Langsanda, in palude.
21 Iul. 1929.

Cfr n. 1070 a.

leg. H. Lagström.

1071. Carex cyperoïdes L.

Savonia australis, par. Kristina, Rantala, in ripa lacus.
10 Iul. 1916.

leg. T. Hannikainen.

Cfr n. 104, 508.

1072. Carex chordorrhiza Ehrh.

Satakunta, par. Karkku, Mäkipää, in sphagneto. 25 Iun. 1882.

leg. Hj. Hjelt.

In Lapponia præcipue austro-occidentali et in Finlandia septentrionali frequenter et sæpe copiose obviam. In Finlandia media plerumque frequenter — satis frequenter crescit, sed in maxime australi rara est.

1073. Carex chordorrhiza Ehrh. f. sphagnicola Læst.

Lapponia Kemensis, Ylimuonio, in sphagneto. 11 Aug. 1916.

leg. J. Montell.

Hæc forma depauperata tantum in Lapponia lecta est.

1074. Carex contigua Hoppe

Satakunta, par. Raumo, Sorkka, in declivi graminoso. 17 Iul. 1916.

legg. Suoma et K. J. Valle.

Cfr n. 106, 511. Tantum in Finlandia maxime australi, ex Alandia usque ad Isthmum Karelicum, dispersa, etiam in Karelia Ladogensi lecta est. *C. Pairæi* F. Schultz in Finlandia australi usque ad provincias Satakunta, Tavastia australis et Karelia Ladogensis crescit, sed in Isthmo Karelico non est.

1075. Carex diandra Schrank.
(*C. teretiuscula* Good.)

S a t a k u n t a, par. Björneborg, Ytterö, in margine stagni exsiccati. 8 Iul. 1932.

leg. H. Lagström.

In Finlandia et Lapponia ± frequenter dispersa.

1076. Carex diandra Schrank
(*C. teretiuscula* Good.)

T a v a s t i a a u s t r a i i s, par. Koski, juxta fontem Kellolanlähde. 27 Iun. 1877.

leg. C. Leopold.

Cfr n. 1075.

1077. Carex macloviana D'Urv.
(*C. festiva* Dewey)

L a p p o n i a K e m e n s i s, par. Muonio, in prato juxta templum. 17 Iul. 1916.

leg. J. Montell.

Tantum locis paucis in Lapponia maxime occidentali rarissime lecta est.

1078. Carex canescens L. × **C. dioeca** L.
(*C. microstachya* Ehrh.)

S a t a k u n t a, par. Hämeenkyrö, Mahnala, in palude prope Kujala. 1 Iul. 1915.

leg. H. A. Printz.

Cfr 108, 516, 517.

1079. Carex canescens L. × C. loliacea L.
(*C. albidula* Holmb.)

Lapponia Kemensis, par. Muonio, in sphagneto juxta lacum Mielmukkajärvi (ad lat. bor. c. 68°). 23 Iul. 1916.

leg. J. Montell.

Cfr n. 515, 520, 521, 522. Forma hybrida tantum locis paucis in Lapponia et Karelia rossica lecta est.

1080. Carex brunnescens Poir. × C. loliacea L.
(*C. Læstadii* Holmb.)

Lapponia Kemensis, par Muonio, Olostunturi, in valle in regione subsilvatica. 31 Iul. 1914.

leg. J. Montell.

Locis paucis in Finlandia septentrionali et in Lapponia occidentali lecta est. Determinationem confirmavit O. R. Holmberg.

1081. Carex brunnescens Poir. × C. Lachenalii Schkuhr

Lapponia Petsamoënsis, Haukilampi, Vuoggoaiv, juxta rivulum inter parentes. 11 Aug. 1933.

leg. N. Söyrinki.

In Lapponia locis nonnullis lecta est.

1082. Carex norvegica Willd.

Satakunta, par. Björneborg, Kumnäs, in litore maris. 7 Iul. 1926.

leg. H. Lagström.

Cfr n. 112, 523.

1083. Carex glareosa Wahlenb.

Ostrobottnia australis, par. Korsnäs, in litore maris. 17 Iun. 1915.

leg. A. Lindfors.

Cfr n. 113.

1084. Carex remota L.

Alandia, par. Hammarland, Kattnäs, in silva frondosa juxta rivulum. 11 Iul. 1920.

legg. Maida et A. Palmgren.

Cfr n. 524.

1085. Carex Hudsonii A. Bennett

(*C. stricta* Good., non Lam.)

Satakunta, par. Karkku, Harvinen, in prato udo ripario. 7 Iul. 1893.

legg. Hj. Hjelt.

In australi et media parte Finlandiæ orientalis frequenter — satis frequenter inveniri dicitur; in Finlandia occidentali autem passim aut rarius occurrit; usque ad Ostrobottniam Kajansensem lecta est.

1086 a. Carex rigida Good.

Lapponia Kemensis, par. Salla, in reg. alp. infer. 22 Iul. 1898.

legg. V. Borg et A. Rantaniemi.

In Lapponia in regione alpina et subalpina frequentissime et sæpe copiosissime crescit.

1086 b. Carex rigida Good.

Lapponia Kemensis, par. Salla, Vaatrimenoiva, in reg. alp. infer. 3 Aug. 1898.

legg. V. Borg et A. Rantaniemi.

Cfr n. 1086 a.

1087. Carex maritima O. F. Müll.

Ostrobottnia borealis, Uleåborg (Oulu), Oulunsalo, in litore maris.

legg. I. Leiviskä.

Cfr n. 119, 527.

1088. Carex magellanica Lam.*(C. irrigua (Wahlenb.))*

S a t a k u n t a, par. Björneborg, Stadsskogen, in margine silvæ.
11 Iul. 1929.

leg. H. Lagström.

Per totum territorium dispersa.

1089. Carex panicea L.

S a t a k u n t a, par. Björneborg, Kumnäs, Langsanda, in prato
paludoso. 21 Iul. 1929.

leg. H. Lagström.

Per totum fere territorium dispersa, tantum in parte orientali Lap-
poniæ rossicæ deest.

1090. Carex sparsiflora (Wahlenb.) Steud.*(C. vaginata Tausch)*

T a v a s t i a a u s t r a l i s, par. Tyrvântö, Mälkiäinen, Kariniemi,
in prato graminoso-herbido subhu-
mido. 26 Iun. 1932.

leg. K. Linkola.

In Lapponia et Finlandia septentrionali et media frequenter (— satis
frequenter) obviam, ad meridiem versus frequentia minuitur,
ut in parte maxime austro-occidentali rara — rarissima sit.

1091. Carex digitata L.

A l a n d i a, par. Jomala, in prato frondoso prope oppidum Marie-
hamn, una cum n. 1092, 1094. 14 Iun. 1909.

leg. A. Palmgren.

Cfr n. 33.

1092. Carex digitata L. × C. ornithopus Willd.
(*C. Dufftii* Hausskn.)

Alandia, par. Jomala, in prato frondoso prope oppidum Mariehamn, inter parentes (n. 1091 et 1094). 14 Iun. 1909.

leg. et. det. A. Palmgren.

Tantum loco supra allato lecta est.

1093. Carex pediformis C. A. Mey.
**C. rhizodes* (Blytt)

Tavastia australis, par Kangasala, in iugo. 28 Iun. 1928.

leg. G. Marklund.

Cfr n. 532, 533.

1094. Carex ornithopus Willd.

Alandia, par. Jomala, in prato frondoso prope oppidum Mariehamn, una cum n. 1091, 1092. 14 Iun. et 26 Iun. 1909.

leg. A. Palmgren.

Cfr n. 534.

1095. Carex flava L. f. dispersa Neum.
(Sveriges flora (1901), p. 696)

Satakunta, par. Birkkala, Pitkäniemi, in prato humido. 12 Iul. 1914.

leg. H. A. Printz.

Species in orientali parte Finlandiæ australis et mediæ sæpe frequenter — frequentissime et copiose — copiosissime obviam, in maxime occidentali parte autem plerumque raro aut non invenitur et tantum in Alandia majore frequentia indicatur. Ad septentrionem versus frequentia minuitur, sed usque ad summum septentrionem indicatur. Forma distributa tantum loco supra indicato in Finlandia lecta est.

1096. Carex rostrata Stokes ap. With.
(*C. ampullacea* Good.)

Nylandia, Tvärminne, Syndalen, in ripa paludosa, 22 Iun. 1933.

leg. E. Häyrén.

Cfr n. 545.

1097. Carex lævirostris (Blytt) Fr.

Satakunta, par. Björneborg, Rosnäs, in palude. 21 Iul. 1932.
leg. H. Lagström.

Per totam Finlandiam dispersa, tantum in Alandia, Ostrobottnia
australi et Lapponia occidentali lecta non est. In partibus
orientalibus Finlandiæ frequentior.

1098. Carex lævirostris (Blytt) Fr.

Karelia Ladogensis, par. Sortavala, Melloinen, Vuorlahti,
juxta rivulum in silva vetusta. 14
Iul. 1932.

legg. H. Pullinen, H. Tulla, A. Tiirikka.

Cfr n. 1097.

1099. Carex filiformis L.

(*C. lasiocarpa* Ehrh.)

Satakunta, par. Björneborg, Kumnäs, Langsanda, in palude.
21 Iul. 1929.

leg. H. Lagström.

Per totum territorium dispersa, sed in regionem alpinam non penetrat.

1100. Lemna gibba L.

Alandia, par. Kökar, in insula parva Fölskär, in aquula in monte
juxta mare. 5 Iul. 1933.

legg. Harald Lindberg et B. Enros.

Cfr n. 553.

1101. Lemna gibba L.

Alandia, par. Föglö, Klåvskär, Östra Gregeskläppen, in aquula
in monte juxta mare. 26 Iul. 1933.

legg. C. Cedercreutz et G. Åberg.

Cfr n. 553, 1100.

1102. *Luzula nemorosa* (Poll.) E. Mey.

Savonia australis, ad fabricam Kaukas prope oppidum Villmanstrand, in nemore per multos annos persistens. 16 Aug. 1917.

leg. Th. Sælan.

Locis nonnullis in Finlandia australi lecta est; introducta, sed per multos annos persistens.

1103. *Allium strictum* Schrad.

Karelia Ladogensis, in insula Haavus in lac. Ladoga prope opp. Sortavala, in monte abrupto Haukkariutta. 23 Iun. 1913.

leg. S. Cantell.

Cfr n. 572.

1104. *Allium strictum* Schrad.

Karelia Ladogensis, par. Jaakkima, in monte abrupto in insula lacus Ladoga. 15 Iul. 1915.

leg. Lyyli Miettinen.

Cfr n. 572, 1103.

1105. *Orehis incarnatus* L.

Ostrobottnia Kajanensis, par. Sotkamo, Korholanmäki, in palude prope Keltamäki. 10 Iul. 1932.

leg. K. Metsävainio.

Per totum fere territorium dispersus, præcipue in partibus orientalibus et in Alandia majore frequentia inveniri indicatur. In Lapponia maxime septentrionali non crescit.

1106. *Platanthera bifolia* (L.) Rchb.

Tavastia australis, par. Teisko, in prato silvatico juxta
prædium Teiskola. 21 Jun. 1920.

leg. R. Idman.

In Finlandia australi et media plerumque satis frequenter aut passim
invenitur, supra 64° plerumque rara et ultra 66° 30' vix occurrit.
In Lapponia deest.

1107. *Coeloglossum viride* (L.) Hartm.

Tavastia australis, par. Teisko, in prato silvatico prope
prædium Teiskola. 9 Jun. 1920.

leg. R. Idman.

In maxime parte Finlandiæ et Lapponiæ usque ad summum septen-
trionem et regionem alpinam passim aut rarius et parce occur-
rit, sed in nonnullis plagis ut in Karelia occidentali et maxima
parte Nylandiæ adhuc omnino non adnotatum.

**1108. *Helleborine latifolia* (L.) Druce
(*Epipactis latifolia* All.)**

Regio Aboënsis, par. Lojo, in insula Storön, in querceto.
8 Aug. 1921.

legg. P. H. et Harald Lindberg.

In Finlandia australi et media usque ad 62° 50' raro vel satis raro
occurrit.

1109. *Salix acutifolia* Willd.

Rossia, Karelia Olonetsensis, Shoksu, in cumulis
arenæ in ripa lacus
Onega. 14 Aug. 1898.

legg. J. I. Lindroth et A. K. Cajander.

Spontanea tantum in ora occidentali lacus Ladoga in Finlandia
occurrit. Etiam ad oras lacus Onega.

1110. Salix nigricans L.

Tavastia australis, par. Laukaa, Leppävesi, in prato.
15 Iun. 1915.

leg. E. Häyrén.

Per totum territorium in diversis formis frequenter dispersa.

1111. Salix phylicifolia L.

Tavastia borealis, par. Laukaa, Leppävesi, in margine
rivuli. 18 Iun. 1915.

leg. E. Häyrén.

Per totum territorium frequenter dispersa. Specimina distributa
ex eodem frutice capta sunt.

1112. Salix phylicifolia L. f. ad f. irrigua Flod.
(teste B. Floderus.)

Lapponia Petsamoënsis, Petsamo, Pummanki, loco gla-
reoso subhumido. 13 Iul. 1925.

leg. E. Häyrén.

Cfr 1111. Specimina distributa ex eodem frutice capta sunt.

1113. Salix phylicifolia L. f. ad f. irrigua Flod.
(teste B. Floderus.)

Lapponia Petsamoënsis Petsamo, Pummanki, loco gla-
reoso subhumido. 24 Iul. 1925.

leg. E. Häyrén.

Cfr 1111, 1112. Specimina distributa ex eodem frutice capta sunt.

1114. Salix phylicifolia L. f. irrigua Flod.
(Forma non plane typica teste B. Floderus.)

Lapponia Petsamoënsis Petsamo, Pummanki, loco gla-
reoso subhumido. 13 Iul. 1925.

leg. E. Häyrén.

Cfr 1111, 1112, 1113. Specimina distributa ex eodem frutice capta
sunt.

1115. *Salix hastata* L.

L a p p o n i a K e m e n s i s par. Muonio in fruticeto prope temp-
lum. 10 Iul. 1915.

leg. J. Montell.

In Lapponia et Finlandia septentrionali haud infrequens—frequenter
invenitur etiam in parte maxime austro-orientali (Karelia
Ladogensi) lecta est.

1116. *Salix caprea* L.

N y l a n d i a Helsingfors, in sepulcreto spontanea. Fl. 25 Maji
1916, fol. 29 Iun. 1916.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 584. Specimina distributa ex eadem arbore capta sunt.

1117. *Salix caprea* L.

N y l a n d i a, par. Helsinge, Åggelby. 20 Mai 1915 et 19 Sept. 1915.

leg. E. Häyrén.

Cfr n. 584, 1116.

1118. *Salix caprea* L × *S. livida* Wg. × *S. xerophila* Flod.
[*S. xerophila* Flod.= *S. cinerascens* (Wg.), non Willd.]

L a p p o n i a I n a r e n s i s, Ivalo, juxta viam publicam. 5 Jul.
1928.

leg. B. Floderus.

In Lapponia et Finlandia septentrionali lecta est. Specimina distri-
buita ex eodem frutice capta sunt.

1119. *Salix livida* Wg. × *S. xerophila* Flod. f. *monstrosa*.

Lapponia Inarensis, Ivalo, in pago Ivalo. 4 Iul. 1928.

leg. B. Floderus.

In Lapponia et Finlandia inter parentes haud infrequens. Specimina distributa ex eodem frutice capta sunt.

1120. *Salix glauca* L. × *S. nigricans* Sm.

Lapponia Kemensis, par. Muonio, in ripa fluminis prope templum. 25 Iun. 1913.

leg. J. Montell.

Inter parentes in Lapponia et Finlandia septentrionali.

1121. *Salix glauca* L. × *S. nigricans* Sm.

Lapponia Kemensis, par. Muonio, in ripa fluminis prope templum. 22 Iun. et 10 Iul. 1917.

leg. J. Montell.

Cfr 1120.

1122. *Salix glauca* L. × *S. nigricans* Sm.

Lapponia Kemensis, par. Muonio, in fruticeto prope templum. 10 Iul. 1915.

leg. J. Montell.

Cfr 1120, 1121.

**1123. *Corylus avellana* L. f. *monstrosa*
(amentis compositis)**

Nylandia, par. Karis, Hällsnäs, frutex unicus una cum fruticibus normalibus in silva frondosa crescens. 25 Aug. 1920.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 589.

1124. *Betula concinna* Gunnarss. × *B. coriacea* Gunnarss. × *B. pubescens* Ehrh. **suecica* Gunnarss. × *B. verrucosa* Ehrh. f. *Palmeri* Gunnarss.

(vide J. G. Gunnarsson, Monografi över Skandinaviens *Betulae* (1925), p. 104, pl. 2 fig. 23, pl. 7 fig. 14 b, pl. 24.)

Alandia, par. Saltvik, Vassböle. Iul. 1933.

legg. Maida et A. Palmgren.

Etiam in par. Padasjoki Tavastiæ australis lecta est. Determinationem confirmavit J. G. Gunnarsson.

1125. *Betula nana* L.

Ostrobottnia media, par. Oulainen, in sphagneto Koira-neva. 26 Iun. 1932.

leg. A. A. Parvela.

Per totum fere territorium dispersa, in Lapponia et Finlandia septentrionali mediaque frequentissime crescit, in australi parte minus frequens aut rara, in Alandia deest.

1126. *Betula nana* L.

Ostrobottnia media, par. Oulainen, in sphagneto Koira-neva. 9 Aug. 1932.

leg. A. A. Parvela.

Cfr n. 1125.

1127. *Betula nana* L. × *B. tortuosa* Ledeb.

Lapponia Kemensis, par. Muonio, loco silvatico prope templum. 4 Sept. 1915.

leg. J. Montell.

1128. *Betula nana* L. × *B. pubescens* Ehrh.

Lapponia Kemensis, par. Muonio, in silva subhumida prope templum. 25 Aug. 1916.

leg. J. Montell.

**1129. *Alnus glutinosa* (L.) Gært. f. *minutifolia*
Lindb. fil. apud Soc. p. F. et Fl. fenn. 1933.**

Alandia, par. Geta, Snäckö, in margine viæ in silva mixta.
27 Iun. 1933 (et 25 Sept. 1933 misit Valborg Söder-
ström).

leg. Harald Lindberg.

Arbor unica in Finlandia, anno 1889 a Ch. Em. Boldt detecta.

**1130. *Alnus glutinosa* (L.) Gært. × *A. incana* (L.) DC.
(*A. pubescens* Tausch)**

Regio Aboënsis, par. Lojo, juxta præd. Ivars in insula
Jalassaari, in ripa lacus. 5 Iul. 1916.

leg. Harald Lindberg.

Raro inter parentes in Finlandia crescit. Specimina distributa ex
eadem arbore capta sunt.

1131. *Alnus incana*. (L.) DC.

Regio Aboënsis, par. Lojo, Ekeberga in insula Jalassaari, in
silva mixta. 18 Iul. 1933.

leg. Harald Lindberg.

In formis diversis per totum territorium dispersa. Specimina distri-
buta ex eadem arbore capta sunt.

1132. *Alnus incana* (L.) Moench f. *lobata* Larss.

Nylandia, par. Sibbo, in insula Löparö. Arbor unica, ab initio
e par. Iitti in Tavastia australi transposita. 10
Aug. 1915.

leg. T. Anttila.

Pauca in diversis partibus Finlandiæ lecta sunt specimina.

1133. *Alnus incana* (L.) DC. var. *borealis* Norrl.

L a p p o n i a K e m e n s i s, par. Muonio, in ripa fluminis juxta pagum Ylimuonio, 27 Aug. 1915.

leg. J. Montell.

Præsertim in Lapponia crescit. Specimina distributa ex eadem arbore capta sunt.

1134. *Quercus robur* L. f. *cuneifolia* Vukot.

R e g i o A b o e n s i s, par. Pargas, in insula Pexor prope præd. Skräbböle. 17 Aug. 1921.

leg. A. F. Nordman.

Arbores duæ in silva inter arbores normales, nunc cæsæ. *Quercus* in Finlandia maxime austro-occidentali, ut etiam in parte maxima austro-orientali imprimis in maritimis passim obvia, sed rarius silvas constituit, in reliqua Finlandia australi raro aut rarissime invenitur.

1135. *Ulmus lævis* Pall.

(*U. pedunculata* Foug.)

R e g i o A b o e n s i s, par. Lojo, juxta ripam lacus in insula Jalas-
saari, haud procul a præd. Ivars. 21 Jun.
1933.

leg. P. H. Lindberg.

Cfr n. 181.

1136. *Ulmus lævis* Pall.

(*U. pedunculata* Foug.)

T a v a s t i a a u s t r a l i s, par. Sääksmäki, Ikkala, Uotila, Matin-
niemi, in silva nemorosa juxta ripam.
26 Jun. 1933.

leg. K. Linkola.

Cfr n. 181, 1135. F. fructibus sterilibus, minoribus.

1137. Asarum europæum L.

Isthmus Karelicus, par. Terijoki, Ollinpää, in silva mixta nemorosa. 16 Jun. 1932.

leg. M. Salokas.

Tantum locis paucis in parte maxime australi Isthmi Karelici lectum est.

1138. Rumex fennicus Murb.

Ostrobottnia australis, par. Korsnäs, Harrström, in litore maris. 26 Jul. 1917 et 15 Aug. 1918.

legg. G. et A. Lindfors.

Ad oras septentrionaliores Sinus Bottnici, etiam in Karelia Rossica et in Lapponia Imandræ lectus est.

1139. Rumex domesticus Hartm. × R. fennicus Murb.

Ostrobottnia australis par. Korsnäs, Harrström, in litore insulæ Södra Björkö, inter parentes. 18 Jul. 1918.

leg. et det. A. Lindfors.

1140. Rumex hydrolapathum Huds.

Satakunta, par. Harjavalta, in ripa limosa lacus Hiisijärvi. 3 Aug. 1932.

leg. L. Pohjala.

In Finlandia australi usque ad c. 61° nunc raro, sed interdum copiose obvenit.

1141. Rumex acetosella L. ♂.

Nylandia, Tvärminne prope oppidum Ekenäs, Krogen, loco arenoso juxta stationem zoologicam. 22 Jun. 1906

leg. J. A. Palmén.

Cfr n. 602 a, b.

1142. Polygonum viviparum L.

Tavastia australis, par. Teisko, in prato humidiusculo juxta praedium Ala-Paavola. 19—21 Jun. 1922.

leg. G. Idman.

In Lapponia, alpina tantum regione excepta, frequentissime obvium, etiam in maxima parte Finlandiae frequens est, sed in plurimis partibus maxime australibus frequentia plus minusve minuitur.

1143. Polygonum viviparum L.

Tavastia australis, par. Sääksmäki, Ikkala, in prato humidiusculo juxta Uotila. 3 Jul. 1932

leg. Hilikka Linkola.

Cfr n. 1142.

1144. Polygonum viviparum L.

Ostrobottnia media, par. Oulainen, in prato humidiusculo juxta amnem Pyhäjoki. 12 Jul. 1932.

leg. A. A. Parvela.

Cfr n. 1142, 1143.

1145. Polygonum amphibium L.

Tavastia australis, par. Teisko, in sinu Levälähti lacus
Kirkkojärvi. 8 Aug. 1917.

leg. R. Idman.

Inmaxime parte Finlandiæ satis frequenter aut passim provenit,
in interiore parte Lapponiæ, ut etiam Finlandiæ maxime
septentrionalis certe aut raro aut omnino non invenitur.

1146. Polygonum minus Huds.

Savonia borealis, par. Maaninka, in ripa limosa in pago
Hyttilänkylä, juxta prædium Tervaranta.
20 Aug. 1918.

leg. O. Kyyhkynen.

In Finlandia australi et media usque ad 62° 30' passim aut rarius
crescit.

1147. Polygonum heterophyllum Lindm.

Satakunta, par. Tyrvää, in muro circa templum. 8 Aug. 1915.

leg. V. Heikinheimo.

Polygonum aviculare L. coll. in diversis formis per totum territorium
dispersum est.

1148. Polygonum æquale Lindm.

Satakunta, par. Kuru, in area in pago Parkkunkylä vegetatio-
nem densissimam formans. 8 Aug. 1933.

leg. H. Edelmann.

Cfr n. 1147.

1149. Polygonum æquale Lindm.

N y l a n d i a, par. Esbo, Bodom, in area arenosa. 15 Aug. 1918.

leg. C. Cedercreutz.

Cfr n. 1147, 1148.

1150. Chenopodium capitatum (L.) Aschers.

S a t a k u n t a, par. Hämeenkyrö, Kukkasmaa, locis cultis in horto efferatum. 14 Aug. 1914.

leg. H. A. Printz.

Tantum locis nonnullis in Finlandia australi et occidentali ut planta efferata lectum est.

1151. Suæda maritima (L.) Dum.

A l a n d i a, par. Sottunga, Stor Sottunga, Kohamn, in litore arenoso nudo maris. 6 Jul. 1933.

legg. B. Enros et Harald Lindberg.

Tantum locis paucis in parte orientali Alandiae crescit.

1153. Silene tatarica (L.) Pers.

K u u s a m o, par. Kuusamo, in ripa arenosa fluminis Oulanka-joki, haud procul ab ostio. 1 Aug. 1929.

leg. U. Saxén.

In Lapponia et Finlandia septentrionali nec non ad fines orientales rarissime invenitur, etiam locis nonnullis in Finlandia australi ut planta adventicia lecta est.

Cfr n. 196 a, 196 b.

1153. *Silene dichotoma* Ehrh.

Regio Aboënsis, par. Korpo, Strömme, in prato culto inter
Trifolium pratense et *Phleum pratense*.
28 Aug. 1920.

leg. O. Eklund.

In Finlandia australi et media in pratis cultis haud raro ut planta
adventicia crescit.

1154. *Gypsophila fastigiata* L.

Savonia australis, par. Taipalsaari, in jugo Salpausselkä
frequens. Iul. 1911.

leg. U. Saxén.

Cfr n. 618. Etiam in Lapponia Kemensi lecta est.

1155. *Dianthus arenarius* L.

Karelia Ladogensis, in jugo prope oppidum Käkisalmi
(Kexholm). 11 Iul. 1915.

leg. S. Cantell.

Cfr n. 202.

1156. *Dianthus superbus* L.

Kuusamo, par. Kuusamo, copiose in prato sicco, arenoso juxta
templum. 31 Iul. 1917.

leg. Edv. af Hällström.

In Lapponia et Finlandia boreali frequenter occurrit, in Finlandia
orientali usque ad Kareliam Ladogensis crescit.

1157. *Dianthus superbus* L. f. *albiflora*.

Kuusamo, par. Kuusamo, copiose in prato sicco, arenoso juxta
templum, una c. forma vulgari lilacina. 31 Iul. 1917.

leg. Edv. af Hällström.

Cfr n. 1156.

1158. Sagina maritima Don.

Regio Aboënsis, par. Nagu, in insula Hjälöpön, in litore maris. 23 Iul. 1930.

leg. O. Eklund.

Cfr n. 622, 623. In taniis maritimis in Alandia et Reg. Aboënsi raro invenitur.

1159. Sagina maritima Don.

Regio Aboënsis, par. Korpo, in insula Jurmo, in litore maris. 11 Iul. 1920 et 14 Iul. 1930.

leg. O. Eklund.

Cfr n. 622, 623, 1158.

1160. Alsine verna (L.) Bartl.

Karelia Ladogensis, par. Impilahti, in monte Raukkii-vuoret, loco aperto in declivi montis. 5 Iul. 1932.

leg. K. Linkola.

Tantum loco supra allato in Fennoscandia lecta est. Anno 1877 in flora Finlandiae a dr. Hj. Neiglick detecta.

1161. Stellaria nemorum L.

Ostrobottnia australis, in alneto prope oppidum Kristinestad. 23 Iun. 1932.

leg. A. Railonsala.

Per totum territorium dispersa; in Alandia tamen non est lecta.

1162. *Stellaria palustris* (Murr.) Retz. f. *parviflora* Klet et Richt. (var. *micropetala* Krok).

Savonia borealis, par. Maaninka, in pago Pöljänkylä, in prato in ripa lacus Pitkänjärvi. 17 Iul. 1918.

leg. O. Kyyhkynen.

Species per totam Finlandiam dispersa est, in Lapponia tantum in Lapponia Kemensi lecta est; f. *parviflora* tantum locis paucis invenitur.

1163. *Stellaria calycantha* (Ledeb.) Bong. × *S. longifolia* Mühlb. (*S. calycantha* Bong. = *S. alpestris* Hartm.)

Lapponia Kemensis, par. Muonio, in prato prope Alamuonio. 26 Iul. 1917.

leg. J. Montell.

Cfr n. 631, 632.

1164. *Cerastium alpinum* L.

Karelia Ladogensis, par. Sortavala, insula Haukkariutta, in declivi saxoso. 3 Iul. 1932.

leg. K. H. Pankakoski.

In altioribus Lapponiae montibus nec non in Lapponia superiore frequenter, in Lapponia inferiore plerumque passim, ceterum in Finlandia orientali raro — rarissime obvium, sed usque ad 61°20' ad meridiem versus occurrit.

1165. *Cerastium caespitosum* Gil. subsp. *C. alpestre* (Lindbl.) Hartm.

Lapponia Kemensis, par. Muonio, in prato juxta templum. 17 Iul. 1915.

leg. J. Montell.

In Lapponia et Finlandia septentrionali passim aut majore frequentia obvium, in parte orientali Finlandiae usque ad lac. Ladoga progreditur, etiam rarissime in Karelia australi crescit.

1166. Cerastium semidecandrum L.

Regio Aboënsis, par. Korpo, Strömman, in colle sicco. 29
Mai 1920.

leg. O. Eklund.

In Finlandia maxime austro-occidentali occurrit, tantum in Alandia,
ubi frequens, in Regione Aboënsi, in tæniis maritimis, sed etiam
in par. Karislojo, et in tæniis maritimis Nylandiæ lectum est.

1167. Malachium aquaticum (L.) Fr.

Regio Aboënsis, par. Lojo, insula Jalassaari, Ekeberga, loco
umbroso juxta ripam lacus. 20 Jul. 1933.

leg. Harald Lindberg.

In parte australi Finlandiæ usque ad 62°5' raro invenitur; in Alandia
non est lecta.

1168. Herniaria glabra L.

Savonia australis, opp. Mikkeli (St. Michel), Tuukkala, in
area sicca juxta castrum. 15 Jul. 1932.

leg. Laimi Pantsar.

In Finlandia australi usque ad 62°5' rara et multis plagis deficiens.

1169. Nuphar luteum L. × N. pumilum (Timm.) Sm.
(*N. intermedium* Ledeb.)

Lapponia Kemensis, par. Muonio, in flumine juxta temp-
lum. 17 Aug. 1915.

leg. J. Montell.

Imprimis in partibus orientalibus et septentrionalibus, ubi ad sum-
mum fere septentrionem procedit, plerumque raro apud nos
invenitur.

1170. Nuphar pumilum (Timm.) Sm.

Savonia borealis, par. Maaninka, in sinu Juurikkalahti
lacus Pöljänjärvi, in fundo limoso. 4
Aug. 1918.

leg. O. Kyyhkynen.

In parte australi Finlandiæ raro invenitur, in septentrionali autem
Finlandia satis raro — passim occurrit. In Lapponia ad sum-
mum fere septentrionem progreditur.

1171. Nymphæa tetragona Georgi
(*N. fennica* Mela).

Savonia borealis, par. Pielavesi, Kuivaniemi, in lacu Joki-
järvi. 25—26 Iul. 1932.

leg. O. Kyyhkynen.

Species orientalis in Finlandia orientali et media sat frequenter
provenit, in australi parte rara, ad occidentem versus ad
41°25' procedit. In Finlandia septentrionali et in Lapponia
deest, etiam in Alandia, Isthmo Karelico et Ostrobottnia
australi lecta non est.

1172. Ceratophyllum demersum L.

Savonia borealis, par. Maaninka, in fossis in palude in
pago Pöljänkylä. 31 Iul. 1918.

leg. O. Kyyhkynen.

In Finlandia australi et media raro, etsi interdum copiose, invenitur
et plerumque sterile occurrit. Ad septentrionem versus usque
ad Ostrobottniam Kajanensem et Ostrobottniam borealem
(Kemi, 65°45') progreditur. Permultis locis subfossile et in
Finlandia et in Lapponia (etiam in Lapponia Enontekiensi
olim fructificans) lectum sit, temporibus pristinis multo majore
frequentia et distributione occurrisse videtur.

1173. Trollius europæus L.

Nylandia, par. Helsinge, Räckhals, in prato. 13 Jun. 1915.

leg. Edit Lindström.

In Lapponia et maxima parte Finlandiæ orientalis frequentissime provenit, in parte maxime occidentali et nonnullis plagis in parte interiore tantum raro invenitur; tamen ex omnibus provinciis, excepta Alandia, adnotatus est. In montibus alpinis supra terminum betulæ procedit.

1174. Thalictrum aquilegifolium L.

Karelia Ladogensis, par. Kurkijoki, Elisenvaara, in nemore juxta Sikiönmäki. 25 Jun. 1932.

leg. V. Räsänen.

Tantum in Karelia Ladogensi rarissime crescit, etiam in Karelia Rossica, ubi frequentior est.

1175. Thalictrum flavum L.

Ostrobottnia australis, par. Korsnäs, in prato. 22 Jul. 1917.

leg. Elli Björkman.

Per totam Finlandiam et Kareliam Rossicam dispersum, in Lapponia deest.

1176. Ranunculus lingua L.

Savonia borealis, par. Maaninka, in ripa limosa stagui Pulasteenlampi in pago Pöljänkylä. 5 Aug. 1918.

leg. O. Kyyhkynen.

In Finlandia australi et media satis raro vel passim invenitur, in parte occidentali rarissime usque ad Lapponiam Kemensem progreditur.

1177. *Ranunculus auricomus* L.

Karelia Ladogensis, par. Sortavala, Hakala, in prato juxta ripam sinus Tuohitiinlahti juxta praedium Suojoki. 19 Jun. 1932.

leg. K. H. Pankakoski.

Per totam Finlandiam et Lapponiam dispersus.

1178. *Ranunculus auricomus* L. var. *jallax* Wimm.

Tavastia australis, par. Sääksmäki, Ikkala, Uotila, in coryleto. 4 Jun. 1932.

leg. K. Linkola.

Cfr n. 221.

1179. *Ranunculus auricomus* L. subsp. *R. sibiricus* (Glehn) Lindb. fil.

Lapponia Kemensis, par. Muonio, in prato humido juxta templum. 26 Jun. 1916 et 22 Jun. 1917.

leg. J. Montell.

Cfr n. 661.

1180. *Ranunculus cassubicus* L.

Tavastia australis, par. Kalvola, Niemi, in nemore prope Kalliomaa. 6 Jun. 1932.

leg. R. Kalliola.

In Finlandia maxime austro-orientali et in Alandia pluribus locis inveniri indicatur, ceterum in Finlandia usque ad 62° raro lectus est, sed usque ad 63°, ubi certe rarissimus, inveniri indicatur.

1181. *Fumaria Vaillantii* Loisel.

Ala n d i a, par. Saltvik. præd. Haga Kungsgård, copiose in agro una cum *F. officinali* L. crescens. 24 Aug. 1885.

leg. Ch. Fm. Boldt.

Planta in Finlandia rarissima, tantum loco supra indicato lecta est, anno 1885 detecta.

1182. *Radicula silvestris* (L.) Druce
(*Nasturtium silvestre* (L.) R. Br.).

S a t a k u n t a, par. Tyrvää, in horto juxta templum. 20 et 25 Jul. 1915.

leg. V. Heikinheimo.

Cfr n. 672.

1183. *Radicula prostrata* (Bergeret) var. *stenocarpha* (Godron)
(*Nasturtium anceps* Rehb.)

N y l a n d i a, Helsingfors, Töölö, juxta viam ferratam adventicia. 7 Aug. 1932.

leg. M. Puolanne.

Tantum in Helsingforsia et in Karelia australi adventicia lecta est.

1184. *Barbaræa vulgaris* R. Br. var. *arcuata* (Opiz) Fr.

T a v a s t i a a u s t r a l i s, par. Lempäälä, Kuokkala, in prato culto. 10 Jun. 1903.

leg. S. Saarnijoki.

Omnibus fere locis primo una cum aliis seminibus introducta est, nunc sæpe frequenter et copiosissime in pratis cultis crescit, etiam locis paucis in Lapponia lecta est. Fere tantum var. *arcuata* (Opiz) Fr. in Finlandia invenitur.

1185. Arabis arenosa Scop.

Karelia australis, opp. Kotka, loco humoso in monte in horto oppidi. 25 Iun. 1918 et 3 Iul. 1919.

legg. K. J. Valle et A. Ulvinen.

Tantum loco supra indicato et in Karelia Ladogensi verisimiliter adventicia lecta est. *A. suecica* Fr. in Finlandia media et australi sat frequenter dispersa est, in Alandia tamen deest.

1186. Sisymbrium volgense M. B.

Ostrobottnia australis, opp. Vasa, Metviken, in ruderalis. 30 Iul. et 21 Aug. 1928.

leg. B. Jurvelius.

Planta adventicia locis paucis in Finlandia lecta est.

1187. Alliaria officinalis Andrz.

Nylandia, Helsingfors, in horto Hesperia, loco umbroso subhumido copiose. 18 Iun. 1917.

leg. Th. Sælan.

Cfr n. 237.

1188. Erysimum hieraciifolium L.

Karelia australis, in litore maris juxta oppidum Kotka. 27 Iun. 1932.

leg. A. Ulvinen.

Imprimis ad oram marium lacuumque Ladoga et Onega passim aut sat raro obvium, etiam in par. Jaala Tavastiæ australis et in Lapponia et Kuusamo in interiore parte occurrit.

1189. Brassica campestris L.

Regio Aboënsis, par. Lojo, in cultis prope villulam Ekeberga in insula Jalassaari. 18 Jul. 1916.

leg. Edit Lindström.

Per totum territorium in cultis dispersa est.

1190. Brassica campestris L.

Tavastia australis, par. Jokioinen, in cultis inter *Solanum tuberosum* juxta templum. Init. Aug. 1917.

leg. S. Salmenlinna.

Cfr n. 1189.

1191. Berteroa incana (L.) DC.

Regio Aboënsis, par. Kimito, Storgården in pago Vreta, inter gramina in colle arenoso. 5 Aug. 1920.

leg. B. Olsoni.

Cfr n. 683.

1192. Berteroa incana (L.) DC.

Nylandia, urb. Helsingfors, Tölö, in colle arenoso ad viam Nervandersgatan copiosissime. 1 Jul. 1917.

leg. Th. Sælan.

Cfr n. 683, 1191.

1193. Draba muralis L.

Regio Aboënsis, par. Korpo, Långviken, loco sicco in colle, inter frutices. 24 Mai 1920.

leg. O. Eklund.

Cfr n. 239. In tæniis Regionis Aboënsis etiam rarissime crescit.

1194. *Draba nemorosa* L. α *gemma* Boiss.

Karelia australis, in aggere juxta oppidum Viburgum.
15 Jun. 1915.

leg. F. Lönnfors.

Cfr n. 240, 684.

1195. *Draba nemorosa* L. β *liocarpa* Boiss.

Karelia australis, in aggere juxta oppidum Viburgum.
12 Jun. 1915.

leg. F. Lönnfors.

Cfr n. 244, 685.

1196. *Draba nemorosa* L. β *liocarpa* Boiss.

Karelia australis, opp. Kotka, in colle sicco. 13 Jun. 1915.

leg. L. Kari.

Cfr n. 244, 685, 1195.

1197. *Draba incana* L. β *contorta* (Ehrh.).

(*Dr. incana* L. var. *legitima* Lindbl.).

Karelia australis, par. Johannes, ins. Tammissaari, loco
sicco juxta mare. 30 Jun. 1915.

leg. F. Lönnfors.

Cfr n. 243.

1198. *Camelina linicola* Sch. et Sp. subsp.

C. macrocarpa (Heuff.).

Tavastia australis, par. Teisko, in agro Lino consito juxta
prædium Teiskola. 4 Aug. 1917.

leg. R. Idman.

In agris Lino vel Avena consitis in Finlandia australi et media
dispersa, usque ad Ostrobotniam borealem crescit.

**1199. *Camelina linicola* Sch. et Sp. subsp.
C. macrocarpa (Heuff.).**

K a r e l i a L a d o g e n s i s, par. Sortavala, in agro. 26 Iul. 1915.

leg. S. Cantell.

Cfr n. 1198.

1200. *Ledpidium ruderales* L.

N y l a n d i a, Helsingfors, in area inculta. 4 Sept. 1915.

legg. J. et T. Anttila.

Cfr n. 694.

1201. *Crambe maritima* L.

R e g i o A b o e n s i s, par. Korpo, Aspö, Vidskär, in litore gla-
reoso maris. 11 Iul. 1920.

leg. O. Eklund.

In maritimis extremis in Finlandia austro-occidentali raro, sed
saepe copiose, invenitur.

**1202. *Drosera longifolia* L. × *D. rotundifolia* L.
(*D. obovata* M. et K.)**

R e g i o A b o e n s i s, par. Lojo, in palude juxta Porla prope
Ojamo. 21 Aug. 1915.

leg. Harald Lindberg.

Per totum territorium raro inter parentes crescit.

**1203. *Drosera longifolia* L. × *D. rotundifolia* L.
(*D. obovata* M. et K.)**

K u u s a m o, par. Kuusamo, in palude Ylimmäinen Ronkalampi.
6 Aug. 1916.

leg. Edv. af Hällström.

Cfr n. 1202.

1204. Ribes nigrum L.

Ostrobothnia media, par. Oulainen, in ripa fluminis Pyhäjoki in insula Alveroisten saari.
20 Iun. 1932.

leg. A. A. Parvela.

In maxima parte Finlandiæ et Lapponiæ passim aut satis frequenter
occurrit et ad summum fere septentrionem progreditur.

1205. Prunus spinosa L.

Regio Aboënsis, par. Korpo, Långvik, in declivi juxta mare
in insula Steugholm. 15 Iun. 1920.

leg. O. Eklund.

Tantum in Alandia et in tæniis Regionis Aboënsis satis raro — raro
occurrit.

1206. Prunus padus L.

f. petalis latioribus.

Regio Aboënsis, par. Lojo, Jalassaari, una c. n:o 1207
in nemore juxta ripam lacus. 2 Iun. 1918.

leg. Harald Lindberg.

In tota Finlandia et in Lapponia occidentali, alpina tantum regione
excepta.

1207. Prunus padus L.

f. petalis angustioribus.

Regio Aboënsis, par. Lojo, Jalassaari, una c. n:o 1206
in nemore juxta ripam lacus. 2 Iun. 1918.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1206.

1208. Rubus pruinosis Arrh.

Alandia, par. Föglö, in insula Jyddö, in fruticeto juxta mare.
2 Jul. 1933.

legg. A. Palmgren et Harald Lindberg.

Cfr n. 713.

1209. Rubus idæus L. f. monstr. *anomalus* Arrh.

Regio Aboënsis, par. Lojo, Storön, in margine viæ in pago
Hermala. 1 Aug. 1928.

leg. P. H. et Harald Lindberg.

Tantum locis nonnullis in Finlandia australi lectus est. Cfr n. 716, 717.

1210. Potentilla impolita Wahlenb.

(*P. argentea* L. var. *incanescens* (Opiz) etc.).

Ostrobottnia australis, par. Övermark, in declivi jugi.
20 Jul. 1915.

leg. Elli Björkman.

Cfr G. Marklund, Über *Potentilla argentea* L. et *P. impolita* Wahlenb.,
Memoranda Soc. p. F. et Fl. Fenn., n. 9 (1933).

In Finlandia australi et media dispersa, rarior quam *P. argentea* L.,
forma sub n. 728 distributa *P. argentea* L. est. *P. argentea* L.
etiam in Finlandia septentrionali crescit, in Lapponia non
lecta est.

1211. Potentilla villosa (Crantz) *a typica* Th. Wolf

Nylandia, par. Borga, in gramiosis siccis. 28 Jun. 1915.

leg. T. Anttila.

Cfr n. 268.

1212. *Potentilla villosa* (Crantz) f. ad formam *ternatam* Blytt
Lapponia Inarensis, par. Utsjoki. 20 Iun. 1915.

leg. C. Fönnilä.

Cfr n. 268, 1211.

1213. *Alchemilla hirsuticaulis* Lindb. fil.

Nylandia, Helsingfors, in horto botanico culta, radices e Savonia australi. 17 Iun. 1916.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 269. Nonnullis adhuc locis Finlandiæ orientali lecta est, sed sæpe copiose crescit.

1214. *Alchemilla hirsuticaulis* Lindb. fil.

Karelia australis, par. Jääski, Kostiala, in colle graminoso siccio juxta Tikankoski. 8 Iul. 1915.

leg. K. J. Valle.

Cfr n. 209, 1213.

1215. *Alchemilla hirsuticaulis* Lindb. fil.

Savonia borealis, par. Joroinen, Lemmetinhaka, in prato siccio. 30 Iun. 1916.

leg. T. J. Hintikka.

Cfr n. 269, 1213, 1214.

1216. *Alchemilla glomerulans* Buser

Karelia Ladogensis, par. Sortavala, Melloinen, Vuorlahti, in prato una c. *Trollio* crescens. 8—13 Iul. 1932.

legg. H. Pullinen, A. Tiirikka et H. Tulla.

Inprimis in Lapponia occurrit, sed etiam quavis rarior vel rarissime usque ad provincias Finlandiæ australes legitur.

1217. Alchemilla obtusa Buser.

Nylandia, par. Kyrkslätt, in subhumido prato inter frutices prope præd. Nygård in pago Österby. 23 Iun 1908.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 746.

1218. Alchemilla alpestris Schmidt

Tavastia australis, par. Birkkala, Rahola, in graminosis. 23 Iun. 1909.

leg. Th. Grönblom.

In Alandia frequenter aut frequentissime provenit, in australi Finlandia raro occurrit et supra $63^{\circ}12'$, ubi jam rarissima, nondum lecta est.

1219. Alchemilla acutangula Buser

Satakunta, par. Karkku, Tulla, in graminosis subhumidis. 8 Iul. 1917.

leg. O. Meurman.

Cfr n. 740.

1220. Alchemilla micans Buser

Nylandia, Helsingfors, in graminosis subumbrosis in horto botanico. 21 Iun. 1915.

leg. Harald Lindberg.

In Finlandia orientali frequenter ad $63^{\circ}10'$, in occidentali autem raro occurrit, ad septentrionem versus usque ad 64° lecta est.

1221. Rosa cinnamomea L.

Tavastia australis, par. Teisko, Annila, in colle silvatico. 27 Iun. et 25 Aug. 1917.

leg. R. Idman.

Per totum territorium dispersa.

1222. Rosa coriifolia Fr.
(*R. virentiformis* Almqu. coll.)

Regio Aboënsis, par. Nagu, ins. Käldö, in prato frondoso.
Iul. 1932.

leg. G. Åberg.

In Finlandia australi dispersa, in parte orientali raro aut rarissime
crescit, ad septentrionem tantum usque ad Savoniam australem
occurrit.

1223. Cotoneaster nigra (Ehrh.) Wahlb.

Karelia Ladogensis, par. Sortavala, Rausku, in declivi
aprico montis. 4 Iul. 1913.

leg. S. Cantell.

Cfr n. 273, 753.

1224. Sorbus aucuparia L. × **S. fennica** (Kalm) Fr.
(*S. Meinichii* (Lindeb.) Hedl.)

Alandia, par. Föglö, Ävjevik in pago Stentorpa by prope De-
gerby, arbor unica inter parentes, una c. n. 1225
crescens. 6 Iul. 1933, fr. Sept. 1933 misit dom. M.
Holmström.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 755.

1225. Sorbus fennica (Kalm) Fr.

Alandia, par. Föglö, Ävjevik in pago Stentorpa by prope De-
gerby, una c. n. 1224 crescens. 6 Iul. 1933.

leg. Harald Lindberg.

In Alandia plerumque satis frequenter provenit, in tæniis maxime
occidentalis Regionis Aboënsis, ubi plerumque videtur disse-
minata, rara est.

1226. Melilotus albus Desr.

N y l a n d i a, Lappvik, in saburra navali. 30 Jun. 1906.

leg. J. A. Palmén.

Per maximam partem Finlandiæ, sed adventicia tantum, legitur,
plerumque per multis annos persistens.

1227. Melilotus albus Desr.

N y l a n d i a, in saburra navali prope urbem Helsingforsiam. 31
Iul. 1932.

leg. M. Puolanne.

Cfr n. 1226.

1228. Trifolium montanum L.

K a r e l i a L a d o g e n s i s, opp. Sortavala, in colle graminoso.
23 Iul. 1915.

leg. S. Cantell.

In Alandia satis frequenter inveniri indicatur, raro aut rarissime
in Regione Aboënsi, Isthmo Karelico et Karelia Ladogensi
crescit.

1229. Trifolium repens L.

T a v a s t i a a u s t r a l i s, par. Teisko, Annila, in area graminosa.
20 Iul. 1917.

leg. R. Idman.

Per totum territorium dispersum.

1230. Vicia sepium L.

N y l a n d i a, par. Helsing, Tammisto, in prato. Jun. 1919.

leg. K. Linkola.

Per totam Finlandiam dispersa, in Lapponia rarissime crescit.

1231. *Oxalis acetosella* L. f. *albovenosa* Lindb. fil.

Karelia Ladogensis, par. Parikkala, Huotikkala, Siko-
harju, in silva umbrosa. 4 Jun. 1916.

leg. T. Hannikainen.

Floribus violascentibus, albo-venosis, Harald Lindberg, Forma
tantum loco supra allato lecta est. Cfr n. 789.

1232. *Linum catharticum* L.

Nylandia, par. Sibbo, ins. Löparö, in prato. 13 Iul. 1916.

leg. T. Anttila.

Cfr n. 283 a, 283 b, 790, 791.

1233. *Mercurialis perennis* L.

Nylandia, par. Esbo, in nemore. 7 Mai 1916.

leg. T. Anttila.

Cfr n. 795.

1234. *Euphorbia virgata* W. K.

Nylandia, Helsingfors, Djurgården, in margine viae ferratae.
10 Iul. 1915.

leg. O. Brander.

Locis nonnullis in parte austro-orientali adventicia lecta est.

1235. *Euphorbia virgata* W. K.

Karelia Ladogensis, in declivi sicco juxta oppidum Käki-
salmi (Kexholm). 1 Iul. 1915.

leg. S. Cantell.

Cfr n. 1234.

1236. Empetrum nigrum L. f. hermaphroditum

Lapponia Petsamoënsis, in ripa fluminis Petsamonjoki
juxta Mattert, in reg. alp. inf.
14 Jul. 1932.

leg. E. Häyrén.

Species per totum territorium dispersa.

1237. Tilia cordata Mill.

Regio Aboënsis, par. Lojo, ins. Jalassaari, in frondea silva
juxta villulam Ekeberga. 20 Jul., 9 et
11 Sept. 1933.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 805. Hæc forma foliis minoribus, obscure viridibus, vivo
subtus glaucis, bracteis pallide viridibus, fructibus minoribus,
subpyriformibus, obscurioribus, apice non impressis, api-
culatis forma vulgaris in Finlandia est. Specimina distri-
buta ex una arbore capta sunt.

1238. Tilia cordata Mill.

Regio Aboënsis, par. Lojo, ins. Jalassaari, in frondea silva
juxta villulam Ekeberga. 22 Aug. 1933.

leg. Signhild Lindberg.

Cfr n. 805, 1237. Specimina distributa ex eadem arbore capta sunt
(ex alia arbore quam n. 1237). Eadem forma ac n. 1237.

1239. Tilia cordata Mill. f. *ekebergensis* Lindb. fil. n. f.

Regio Aboënsis, par. Lojo, ins. Jalassaari, arbor unica in
frondea silva (*Quercus*, *Tilia*, *Betula*, *Cory-
lus*) juxta villulam Ekeberga. 9 et 11 Sept.
1933.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 805, 1237, 1238. Forma foliis majoribus, pallide viridibus,
vivo subtus fere albidoviridibus, bracteis brevioribus obtu-
sioribusque, pallide flavis, fructibus majoribus, subrotundis,
pallide canescentibus, apice impressis a forma vulgari differt.

1240. *Malva pusilla* With.
(*M. borealis* Wallm.)

S a t a k u n t a, par. Rauma, Sorkka, in margine viae. 13 Iul. 1916.

legg. Suoma et K. J. Valle.

In Finlandia maxime australi satis raro — passim invenitur; supra 61°40' vix nisi in saburra navali etc. occurrit.

1241. *Hypericum montanum* L.

R e g i o A b o ò n s i s, par. Lojo, in declivi pinifero juxta praed.
Luusi in pago Jantonieni. 11 Aug. 1915.

leg. Harald Lindberg.

Planta rarissima in Finlandia, tantum loco supra allato lecta est,
ubi apud nos eam anno 1888 detexit, dom. E. Stenberg.

1242. *Hypericum montanum* L.

N y l a n d i a, in horto botanico Helsingforsensi e seminibus in
par. Lojo anno 1915 ab Harald Lindberg collectis
cultum. 14 Iul. 1917.

conservavit Edith Lindström.

Cfr n. 1241.

1243. *Viola palustris* L.

N y l a n d i a, par. Esbo, Tuvkulla, loco humido juxta praed.
Bodom. 12 Iun. 1916.

leg. C. Cedercreutz.

In maxima parte Finlandiae frequenter et saepe copiose provenit;
ad septentrionem versus frequentia minuitur, sed ad summum
septentrionem indicatur.

1244. Viola palustris L.

N y l a n d i a, par. Esbo, Bodom, Tuuskulla, loco humido. 8 Jul.
1917.

leg. C. Cedercreutz.

Cfr n. 1243.

1245. Viola epipsila Ledeb.

O s t r o b o t t n i a K a j a n e n s i s, par. Sotkamo, Jormasjärvi,
Jormala, in paludosis. 18
Jun. 1932.

leg. K. Metsävainio.

In Lapponia frequenter provenit, etiam in Finlandia orientali fre-
quenter occurrit, frequentia diminuta in reliqua Finlandia
legitur, in provinciis austro-occidentalibus rarissime inveniri
videtur.

1246. Viola uliginosa Bess.

A l a n d i a, par. Kökar, Österbygge, Rottenängsmaren, in margine
silvae subpaludoso. 3 Jul. 1933.

legg. Maida et A. Palmgren.
cons. Harald Lindberg.

In Finlandia austro-occidentali rarissime lecta est, etiam loco unico
in Savonia australi crescit.

1247. Viola collina Bess.

K a r e l i a L a d o g e n s i s, par. Ruskeala, in declivi silvatico
juxta marmoris fodinam. 11 Jul. 1933.

leg. A. J. Huuskonen.

Species rarissima in Finlandia, tantum locis paucis in paroeciis
Ruskeala et Sortavala provenit, etiam in Karelia Onegensi
lecta est.

1248. *Viola montana* L. × *V. riviniana* Rehb.

Satakunta, par. Rauma, Sorkka, loco nemoroso. 26 Iun. 1916.

leg. Suoma et K. J. Valle.

In Finlandia australi et media haud raro inter parentes provenit.

1249. *Viola montana* L. × *V. rupestris* Schm. v. *arenaria* (D. C.) Beck.

Karelia australis, par. Jääski, in colle pinifero. 5 Iun. 1915.

leg. K. J. Valle.

Forma rarissima in Finlandia, tantum locis nonnullis in parte australi lecta est.

1250. *Viola stagnina* Kit.

Karelia australis, par. Jääski, Hyppölä, in prato ripario. 1 Iul. 1915.

leg. K. J. Valle.

Cfr n. 811, 812.

1251. *Viola rupestris* Schm. var. *arenaria* (D. C.) Beck.

Tavastia australis, par. Vanaja, Hattelmala, locis apertis siccis in jugo pinifero. 20 Mai 1932.

leg. R. Kalliola.

In Finlandia australi et media raro aut sat frequenter provenit etiam locis paucis in Lapponia lecta est.

1252. *Viola biflora* L.

Lapponia Enontekiensis, par. Enontekiö, Kilpisjärvi, Siilastupa, in prato paludoso, c. 500 m. s. m., reg. subalp. 13 Iul. 1931.

leg. U. B. Segerman.

In regionibus superioribus Lapponiæ plerumque satis frequenter occurrit, sed raro tantum in regionem silvaticam descendit.

1253. *Viola biflora* L.

Lapponia Inarensis, par. Utsjoki, Kevujoki, loco subpaludoso. 15 Iun. 1915.

leg. P. Ekwall.

Cfr n. 1252.

1254. *Hippophaës rhamnoides* L.

Ostrobottnia australis, par. Korsnäs, Harrström, in litore maris. 12 Iun. 1921.

leg. A. Lindfors.

Ad oram et imprimis in taniis exterioribus Maris baltici et Sinus bottnici frequenter aut passim sæpeque copiose provenit, ad oras Sinus finlandici non crescit.

1255. *Hippophaës rhamnoides* L.

Ostrobottnia australis, par. Korsnäs, Harrström, in litore maris. 28 Iul. 1922.

leg. A. Lindfors.

Cfr n. 1254.

1256. Hippophaës rhamnoides L.

Ostrobothnia australis, par. Korsnäs, Harrström, in
litore maris. 3 Iul. 1917.

leg. A. Lindfors.

Cfr n. 1254, 1255.

1257. Chamænerium angustifolium (L.) Scop.

f. *rosea* Lindb. fil.

Satakunta, par. Karkku, Sorja, loco arenoso juxta viam
ferratam. 30 Iul. 1914.

leg. O. Meurman.

Species per totum territorium, reg. alpina ex parte excepta, fre-
quenter vel frequentissime et sæpe copiosissime provenit.
F. *rosea* rara est.

1258. Epilobium hirsutum L.

Nyländia, in ruderatis prope urb. Helsingforsiam. 7 Aug. 1932.

leg. M. Puolanne.

Locus paucis in Finlandia australi ut adventicia planta lectum est.

1259. Epilobium rubescens Rydb.

Regio Aboënsis, par. Lojo, loco paludoso juxta ripam lacus
haud procul a piscinis Porla. 21 Aug. 1915.

leg. Harald Lindberg.

In flora nostra anno 1915 detexit (specimina distributa) Harald
Lindberg. Etiam his annis nonnullis aliis locis in Finlandia
australi lectum est.

1260. Epilobium rubescens Rydb.

N y l a n d i a, e seminibus ab Harald Lindberg in par. Lojo anno 1915 collectis in Horto botanico Helsingforsiensis cultum. 13 Jul. 1917.

conserv. Edit Lindström.

Cfr n. 1259.

1261. Epilobium davuricum Fisch.

L a p p o n i a K e m e n s i s, par. Muonio, loco humido in valle in monte Olostunturi, in reg. sub-silvatica. 11 Aug. 1915.

leg. J. Montell.

In Lapponia et Finlandia septentrionali usque ad Savoniam borealem occurrit.

1262. Epilobium alsinifolium Vill.

L a p p o n i a K e m e n s i s, par. Muonio, loco scaturiginoso prope templum. 4 Aug. 1915.

leg. J. Montell.

In Lapponia et in Finlandia septentrionali usque ad 64°30' rarius lectum est.

1263. Epilobium alsinifolium Vill. = **E. palustre** L.

L a p p o n i a K e m e n s i s, par. Muonio, loco scaturiginoso prope templum. 4 Aug. 1915.

leg. J. Montell.

Planta rarissima, tantum inter parentes locis nonnullis in Lapponia et Finlandia septentrionali lecta est.

1264. Epilobium Hornemanni Rchb.

L a p p o n i a K e m e n s i s, par. Muonio, loco scaturiginoso prope montem Olostunturi. 7 Aug. 1915.

leg. J. Montell.

In Lapponia frequenter crescit, in Finlandia septentrionali etiam occurrit.

1265. Epilobium Hornemanni Rchb. × **E. palustre** L.

L a p p o n i a K e m e n s i s, par. Muonio, loco paludoso prope templum. 9 Aug. 1915 et 1 Aug. 1916.

leg. J. Montell.

Sat raro inter parentes in Lapponia et in Finlandia septentrionali crescit.

1266. Hippuris vulgaris L.

S a t a k u n t a, par. Kokemäki, Sipilä, in fundo limoso stagni. 5 Aug. 1932.

leg. L. Pohjola.

In tota Finlandia et Lapponia, excepta tantum regione alpina, satis frequenter provenit.

1267. Hippuris tetraphylla L. fil.

O s t r o b o t t n i a a u s t r a l i s, par. Korsnäs, in litore limoso maris. 21 Jul. 1917.

leg. A. Lindfors.

In litoribus marium Finlandiæ et Lapponiæ passim — satis raro crescit. Cfr Harald Lindberg in Medd. Soc. p. F. et Fl. Fenn. XXXI, p. 107—110.

1268. Hippuris tetraphylla L. fil. forma

Ostrobottnia australis, par. Korsnäs, Harrström, loco
paludoso juxta mare. 29 Jul.
1921.

leg. A. Lindfors.

Cfr n. 1267.

1269. Cicuta virosa L.

Tavastia australis, par. Teisko, in ripa lacus Näsijärvi,
in sinu Teiskolan lahti. 27 Jul. 1919.

leg. R. Idman.

Per totum territorium dispersa.

1270. Oenathe aquatica (L.) Lam.

Satakunta, par. Rauma, Sorkansalmi, in aqua ripæ. 28 Jul.
1916.

legg. Suoma et K. J. Valle.

Cfr n. 833.

1271. Peucedanum palustre (L.) Moench

Tavastia australis, par. Vesilahti, Alhonselkä, Jouttensuo,
in prato paludoso juxta ripam lacus.
15 Aug. et 10 Sept. 1932.

leg. N. Söyrinki.

Per totam Finlandiam dispersum, in Lapponia verisimiliter lectum
non est.

1272. Pirola uniflora L.

Tavastia australis, par. Teisko, in silva acerosa sub-
humida in insula Koljonsaari. 18 Jun.
1919.

leg. R. Idman.

Per totum territorium dispersa.

1273. Vaccinium uliginosum L.

Ostrobothnia australis, par. Lappfjärd, loco turfoso in
 margine paludis Holmmossen.
 17 Jun. 1932.

leg. A. Railonsala.

Per totam Finlandiam et Lapponiam frequenter sæpeque copiose,
 septentrionalibus in partibus frequentissime provenit.

1274. Centunculus minimus L.

Regio Aboënsis, par. Korpo, Strömna, Långvik, loco are-
 noso, graminoso juxta litus. 6 Sept. 1922.

leg. O. Eklund.

Tantum locis nonnullis in tenuis Regionis Aboënsis provenit.

1275. Centunculus minimus L.

Regio Aboënsis, par. Korpo, Rumar, copiosissime in grami-
 nosis juxta mare. 16 Aug. 1932.

leg. O. Eklund.

Cfr n. 1274

1276. Lysimachia nummularia L.

Karelia Ladogensis, par. Kurkijoki, in prato ripario. 25
 Jul. et 4 Aug. 1932.

leg. Laina Räsänen.

In Finlandia australi usque ad 61° 15' raro aut rarissime invenitur,
 verisimiliter tantum in Karelia Ladogensi spontanea.

1277. Androsaces septentrionale L.

Savonia borealis, par. Jorois, Huutokoski, loco graminoso sicc. 15 Iun. 1916.

leg. Maja Arvonen.

Cfr n. 320, 851, 852.

1278. Primula sibirica Jacq.

Ostrobottnia borealis, par. Haukipudas, Kellonkylä, in insula Kraaseli, in prato litorali. 20 Iun. 1932.

leg. O. Seppänen.

Ad litora septentrionalis Sinus bottnici partis et Maris albi passim — satis frequenter, ad Mare glaciale rarior occurrit, ad meridiem versus usque ad circ. 64° descendit, ubi rarissima est.

1279. Samolus Valerandi L.

Alandia, par. Geta, Löknäs, in litore arenoso humido. 28 Iun. 1933.

legg. B. Enros, Maida Palmgren et Harald Lindberg.

Ad australem Finlandiæ oram rarissime occurrit, tantum in Alandia, Nylandia orientali et Karelia australi crescit.

1280. Statice armeria L. var. *elongata* (Hoffm.) DC.

Karelia australis, par. Vehkalahti, Ristiniemi, Hietaniemi, in litore maris. 2 Iul. 1932.

leg. Inkeri Taube.

Ad litus australe Finlandiæ occurrit; tantum in Reg. Aboënsi, Nylandia et Karelia australi crescit.

1281. *Gentiana amarella* L. subsp. *G. lingulata* (C. A. Agardh) Aresch.

Regio Aboënsis, par. Lojo, ins. Storön, in prato juxta ripam.
9 Iul. 1916.

leg. Harald Lindberg.

Per totam Finlandiam passim — satis raro dispersa, in Lapponia tantum in parte rossica lecta est.

1282. *Cynanchum vincetoxicum* (L.) Pers.

Regio Aboënsis, loco saxoso prope oppidum Nådendal (Naantali). 15 Iul. 1915.

leg. L. Luotola.

In vicinitate maris in Alandia frequenter provenit, in Regione Abcënsi et parte occidentali Nylandiæ passim — satis raro occurrit, supra 60° 40' ad septentrionem nondum est visum.

1283. *Diapensia lapponica* L.

Lapponia Inarensis, par. Utsjoki. 22 Iun. 1915.

legg. P. Ekwall et C. Finnilä.

In montibus alpinis Lapponiæ frequenter occurrit.

1284. *Asperugo procumbens* L.

Ostrobottnia australis, par. Korsnäs, loco culto. 2 Iul. 1917.

leg. Elli Björkman.

Imprimis in vicinitate oræ occidentalis et in Lapponia occidentali satis frequenter provenit, ceterum in Finlandia interiore et in Lapponia plerumque raro occurrit, in Fennoscandia maxime orientali (Karelia rossica et Lapponia rossica) lecta non est.

1285. Lappula echinata Gilib.

Karelia Ladogensis, opp. Käkisalmi (Kexholm), in vallo.
3 Iul. 1915.

leg. S. Cantell.

Per totam fere Finlandiam dispersa, fere semper adventicia. His annis plurimis plagis frequentior. Etiam in Lapponia Kemensi lecta est.

1286. Myosotis scorpioides L.

[*M. palustris* (L.) With.]

Tavastia australis, par. Teiskö, in ripa lacus juxta vilululam Annila. 17 Aug. 1917.

leg. R. Idman.

In parte australi plerumque frequenter, sed nonnullis plagis raro tantum occurrit, ad septentrionem rarescit, sed usque ad c. 67° lecta est.

1287. Myosotis laxa Lehm.

(*M. baltica* Samuelsson)

Nylandia, Tvärminne, in litore in insula parva Brändskär, in margine aquæ aream magnam densissime tegens. 18 Iun. et 3 Iul. 1925.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 875.

1288. Myosotis micrantha Pall.

(*M. stricta* Link)

Tavastia australis, par. Vesilahti, Alhonselkä, Korpi-
saari, in declivi sicco. 6 Iun. 1932.

leg. N. Söyrinki.

In Finlandia australi et media occurrit, in parte occidentali usque ad c. 65° crescit.

1289. *Myosotis collina* Hoffm.
(*M. hispida* Schlecht.)

K a r e l i a a u s t r a l i s, par. Johannes, ins. Pitkäsaari, in colle
sicc. 23 Iun. 1915.

leg. F. Lönnfors.

Cfr n. 876. Etiam in prov. Satakunta lecta est.

1290. *Myosotis collina* Hoffm. f. *albiflora*

N y l a n d i a, in declivi sicco in insula Degerö prope Helsingforsiam.
13 Iun. 1915.

leg. J. Kivenheimo.

Cfr n. 876, 1289.

1291. *Myosotis sparsiflora* Mikan

K a r e l i a a u s t r a l i s, Pantsarlahti, in horto. 12 Iul. 1916.

leg. P. Myhrberg.

In Finlandia paucis locis adventicia lecta est, etiam in Karelia
et Lapponia rossica occurrit.

1292. *Myosotis sparsiflora* Mikan

I s t h m u s K a r e l i c u s, par. Terijoki, in horto. 22 Iul. 1932.

leg. T. Kontuniemi.

Cfr n. 1291.

1293. *Myosotis sparsiflora* Mikan

T a v a s t i a a u s t r a l i s, par. Tyrvöntö, Lahdentaka, in horto.
29 Iun. 1932.

leg. S. S. Salmenlinna.

Cfr n. 1291, 1292.

1294. Dracocephalum thymiflorum L.

Karelia australis, opp. Viborg (Viipuri), in vallis. 24 Jun.
1915.

leg. F. Lönnfors.

In Finlandia imprimis australi raro vel sat raro et forsitan cum
seminibus e Rossia introductum occurrit.

1295. Lamium intermedium Fr.

Regio Aboënsis, par. Lojo, ins. Jalassaari, copiose in horto
villulæ Ekeberga (tantum hæc species ge-
neris *Lamii* in horto crescit). 22 Jul. 1933.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 893.

1296. Lamium purpureum L.

Satakunta, par. Tyrvää, in horto prope templum. 26 Jul. 1915.

leg. V. Heikinheimo.

Cfr n. 892.

1297. Lamium purpureum L.

Tavastia australis, par. Teisko, in horto villulæ Anrila
prope prædium Teiskola. 2 Jul. 1919.

leg. R. Idman.

Cfr n. 892, 1296.

1298. *Lamium galeobdolon* (L.) Crantz

Isthmus Karelicus, par. Terijoki, Ollinpää, in margine viæ
in mixta silva umbrosa. 13 Iun. 1932.

leg. M. Salokas.

Tantum locis paucis in parte australi Isthmi Karelici occurrit.

1299. *Stachys paluster* L. f. *agrestis* F. Aresch.

Tavastia australis, par. Jokioinen, inter *Solanum tuberosum*
in cultis. 22 Aug. 1917.

leg. S. S. Salmenlinna.

Cfr n. 341, 900.

1300. *Ajuga reptans* L.

Karelia Ladogensis, par. Käkisalmi (Kexholm), in remore
in insula Heinäsaari. 20 Iun. 1915.

leg. S. Cantell.

Cfr n. 343, 903.

1301. *Hyoseyamus niger* L.

Regio Aboënsis, par. Lojo, Kauria prope pagum Biskops-
näs, in ruderatis. 5 Iul. 1916.

leg. Harald Lindberg.

In Finlandia australi passim — satis frequenter occurrit; ad sep-
tentrionem versus rarescit et ultra 63° vix visus est nisi in
saborra etc.

1302. *Verbascum thapsus* L.

Regio Aboënsis, par. Lojo, ins. Storön, in colle sicco arido.
14 Iul. 1916.

leg. Harald Lindberg.

In Finlandia australi usque ad 62° 10' ad septentrionem.

1303. *Verbascum nigrum* L. × *V. thapsus* L.

Regio Aboënsis, par. Lojo, ins. Storön, in colle sicco arido
una c. *V. thapsus* L. (n. 1302) et *V. nigrum* L.
14 Iul. 1916.

leg. Harald Lindberg

Rarissime inter parentes in Finlandia australi lectum est.

1304. *Veronica chamædrys* L. f. *albiflora*.

Karelia Ladogensis, Vuorlahti prope opp. Sortavala, in
prato. 25 Iun. 1938.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 914.

1305. *Veronica peregrina* L.

Nylandia, Helsingfors, in Horto botanico efferata. 9 Iun. 1934.

leg. K. Linkola.

1306. *Veronica arvensis* L.

Regio Aboënsis, par. Lojo, insula Jalassaari, loco humoso
in rupe prope Ekeberga. 22 Iun. 1942.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 918.

1307. Veronica verna L.

Regio Aboënsis, par. Lojo, insula Jalassaari, loco humoso
in rupe prope Ekeberga. 10 Iun. 1942.

leg. Harald Lindberg.

In parte australi Finlandiæ frequenter provenit; ad septentrionem
versus usque ad 64° 20' non tamen omnibus plagis progreditur.
Ulterius in saburra etc. lecta est.

1308. Bartschia alpina L.

Kuusamo, par. Kuusamo, in palude juxta cataractam Kiukaan-
korva in flumine Kuusinkijoki. 26 Iun. 1936.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 922.

1309. Odontites serotina (Lam.) Rchb.

Regio Aboënsis, par. Lojo, Gerknäs, in graminosis in campo
arenoso. 13 Aug. 1933.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 923, 924.

1310. Odontites serotina (Lam.) Rchb.

Alandia, par. Jomala, insula Möckelö, in litore maris grami-
noso juxta insulam Ramsholmen. 23 Aug. 1942.

leg. Harald Lindberg.

Cfr. n. 923, 924, 1309, 1312 a.

1311. *Odontites verna* (Bell.) Dum.

N y l a n d i a, par. Borgå, Pellinge, insula Delholmen, in litore maris. 29 Iul. 1934.

leg. G. Marklund.

In litoribus maris in Finlandia australi et occidentali.

1312 a. *Odontites verna* (Bell.) Dum.

A l a n d i a, par. Jomala, insula Möckelö, in litore maris graminoso juxta »Plagen». 23 Aug. 1942 (fruct.), 20 Iul. 1943 (flor.)

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1310, 1311.

1312 b. *Odontites verna* (Bell.) Dum.

A l a n d i a, par. Lemland, Espholm, in litore maris. 20 Iul. 1943 (flores); 17 Aug. 1943 (fruct.), leg. A. Södergård.

leg. Harald Lindberg.

Cfr 1311, 1312 a.

1312 c. *Odontites verna* (Bell.) Dum.

A l a n d i a, par Ekerö, Skag, in litore maris. 13 Iul. 1943.

leg. Harald Lindberg.

Cfr 1311, 1312 a, b.

1313. *Odontites verna* (Bell.) Dum., forma.

Ostrobottnia australis, par. Korsnäs, Harrström, in litore maris. 19 Iul. 1917 et 25 Aug. 1918.

legg. Göta et A. Lindfors.

Cfr n. 1311, 1312 a, b, c.

1314. *Odontites verna* (Bell.) Dum., forma.

Ostrobottnia australis, par. Korsnäs, in litore maris. 9 Aug. 1915.

leg. Elli Björkman.

Cfr n. 1311, 1312 a, b, c, 1313.

1315. *Odontites litoralis* Fr.

(*O. simplex* [Hartm.] Krok).

Alandia, par. Sottunga, Stackvik, in litore maris. 6 Iul. 1933.

leg. Harald Lindberg.

In litoribus maris in Finlandia maxime austro-occidentali.

Formæ esthonicæ:

1. *Odontites brevifolia* Lindb. fil. n. sp.

Ab *O. litorali* Fr. colore obscuriore, foliis multo brevioribus, 9×5 mm— 15×7 mm, pilis in caule patentibus, nec reflexis, optime differt.

Esthonia occ., Werder, in litore maris una cum *O. litorali* crescens. 5 Iul. 1912. leg. Harald Lindberg.

2. *Odontites litoralis* Fr.

Ab *O. brevifolia* Lindb. fil. n. sp. colore pallidiore, foliis longioribus angustioribusque, 40×3.5 mm— 20×5.5 mm, pilis in caule reflexis optime differt.

Esthonia occ., Werder, in litore maris una cum *O. brevifolia* crescens. 5 Iul. 1912. leg. Harald Lindberg.

3. *Odontis litoralis* Fr.

Esthonia occ., i.r.s. Ormsö, Magnushof, Holmen, in litore maris. 1 Iul. 1912. leg. Harald Lindberg.

1316. Euphrasia brevipila Burnat et Greml
f. *glandulosa*.

Regio Aboënsis, par. Lojo, ins. Jalassaari, in graminosis
juxta villulam Ekeberga. 11 Aug. 1936.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 349.

1317. Euphrasia brevipila Burnat et Greml
f. *glandulosa* (glandulis uberrimis)

Ostrobottnia Kajanensis, par. Suomussalmi, in graminosis
juxta templum. 6 Aug. 1936.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 349, 1316.

1318. Euphrasia brevipila Burnat et Greml
f. *glandulosa*, elongata.

Regio Aboënsis, par. Karis, Hällsnäs, in declivibus in silva
mixta, aperta. Aug. 1920.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 349, 1316, 1317.

1319. Euphrasia brevipila Burnat et Greml
f. *glandulosa*, ad subsp. *tenuis* Brenn. vergens.

Kuusamo, par. Kuusamo, Paanajärvi, Rajala, in graminosis.
12 Iul. 1936.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 349, 1316, 1317, 1318.

1320. Euphrasia brevipila Burnat et Gremlı
f. *eglandulosa*

N y l a n d i a, par. Esbo, Mårtensby, in campo olim deusto. 8
Aug. 1897.

leg. A. O. Kihlman.

»*E. stricta* Host var. *pilijera* Kihlmi.» Kihlman det. Occurrunt formæ ±
glanduliferæ eodem loco mixtæ. Cfr Acta Soc. p. F. et Fl. Fenn.,
XIII, n:o 5, p. 8. — H a r a l d L i n d b e r g.

Cfr n. 348, 349 a, b, 1316—1319.

1321. Euphrasia brevipila Burnat et Gremlı
f. *eglandulosa*

S a v o n i a b o r e a l i s, Kuopio, Suovu, Hukkamäki, in prato
sicc. 3 Aug. 1906.

leg. K. Linkola.

Cfr n. 348, 349 a, b, 1316—1320.

1322. Euphrasia brevipila Burnat et Gremlı
f. *eglandulosa*

S a v o n i a b o r e a l i s, Kuopio, Suovu, in silva mixta ad mar-
ginem viæ. 8 Aug. 1906.

leg. K. Linkola.

Cfr n. 348, 349 a, b, 1316—1321.

1323. Euphrasia brevipila Burnat et Gremlı
f. *eglandulosa*, foliis angustioribus, floribus minoribus.

K u u s a m o, par. Kuusamo, Paanajärvi, Ruskeakallio, in declivi-
bus apricis, lapidosis. 14 Iul. 1936.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 348, 349 a, b, 1316—1322.

1324. Euphrasia brevipila Burnat et Grenli * **tenuis** Brenn.

N y l a n d i a, Tvärminne, Krogen, in campo graminoso. a. 12
Iul. 1904, b. 15 Iul. 1904.

leg. I. A. Palmén.

Cfr n. 350.

1325. Euphrasia curta Fr. var. *glabrescens* Wettst.

N y l a n d i a, Tvärminne, Krogen, in graminosis siccis. 24 Aug.
1904.

leg. Inga Ström.

Cfr n. 351 a, 351 b.

1326. Euphrasia frigida Pugsley f. *eglandulosa* (Wettst.)
(*E. latifolia* auctor.).

K u u s a m o, par. Kuusamo, Paanajärvi, Kauppila, in ripa. 25
Iul. 1936.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 352, 925, 926.

1327. Euphrasia frigida Pugsley f. *eglandulosa* (Wettst.)
(*E. latifolia* auctor.).

K u u s a m o, par. Kuusamo, Paanajärvi, Rajala, in colle sicco,
muscoso. 17 Iul. 1936.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 352, 925, 926, 1326.

1328. Euphrasia frigida Pugsley f. *subglabra*

Kuusamo, par. Kuusamo, Paanajärvi, Räjälä, in prato humido
juxta fl. Märtyjoki. 15 Jul. 1936.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 352, 925, 926, 1326, 1327.

1329. Euphrasia frigida Pugsley var. *paludosa* Towns.

Lapponia Petsamoënsis, Pitkäjärvi, Kelguoav, in prato.
1 Aug. 1933.

leg. N. Söyrinki.

1330. Euphrasia hirtella Jord. * *fennica* (Kihlm.).

Tavastia borealis, par Viitasaari, Ruuhijärvi, in campo
humidiusculo. 20 Aug. 1897.

leg. A. O. Kihlman.

Cfr n. 354, 931, 932.

1331. Alectorolophus major (Ehrh.) Rehb.

Ostrobottnia australis, par. Korsnäs, in prato. 21
Jul. 1917.

leg. A. Lindfors.

In maxima parte Firiandiae ad c. 65° aut 66° frequenter provenit,
supra 67° plerumque rarius legitur, ultra 67° 50' incertus est.

1332. Alectrolophus major (Ehrh.) Rchb. ***montanus**
(Sauter) Fritsch

Karelia borealis, par. Juuka, in colle sicco juxta praedium
Tahkovaara. 6 Aug. 1942.

leg. Harald Lindberg.

Planta in Finlandia rara videtur. Distributio in Finlandia non
explorata est.

1333. Alectorolophus minor (Ehrh.) Wimm. et Grab.
f. *vittulatus* Gremler

Laponia Kemensis, par. Muonio, in campo graminoso
prope templum. 17 Jul. 1915.

leg. J. Montell.

Cfr n. 933, 934.

1334. Alectrolophus minor (Ehrh.) Wimm. et Grab. ***stenophyllus**
(Schur) Sterneck f. *maculiferus* Lindb. fil.

Regio Aboënsis, par. Lojo, ins. Jalassaari, in prato sil-
vatico juxta villulam Ekeberga. 15 Aug.
1927.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 935.

1335. Pedicularis palustris L.

Karelia borealis, par. Juuka, prope templum, in litore
lacus Pielisjärvi. 3 Aug. 1942.

Una cum **opsiantha* (E. L. Ekman) (n. 1338) crescens.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 936.

1336. Pedicularis palustris L. var. *borealis* J. W. Zett.

K u u s a m o, par. Kuusamo, Toranki, in prato humido juxta lac.
Kuusamonjärvi. 23 Iun. 1936.

leg. Harald Lindberg.

In Finlandia boreali et in Lapponia dispersa.

1337. Pedicularis palustris L. var. *borealis* J. W. Zett.

L a p p o n i a K e m e n s i s, par. Muonio, in sphagneto prope
templum. 18 Iul. 1916.

leg. J. Montell.

Cfr n. 1336.

1338. Pedicularis palustris L. * *opsiantha* (E. L. Ekman).

K a r e l i a b o r e a l i s, par. Juuka, prope templum, in litore
lacus Pielisjärvi, 3 Aug. 1942.

leg. Harald Lindberg.

Parce inter *P. palustris* f. *typica* (n. 1335) crescens.

1339. Pedicularis sceptrum Carolinum L.

K u u s a m o, par. Kuusamo, Toranki, in prato humido juxta
lac. Kuusamonjärvi. 23 Iun. 1936.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 939.

1340. *Melampyrum nemorosum* L. f. *albidum* Svanl.

Regio Aboënsis, par. Lojo, insula Jalassaari, in graminosis
in silva frondosa juxta villulam Ekeberga,
parce inter f. vulgarem crescens. 21 Iul.
1938 et 6 Iul. 1941.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 944.

1341. *Melampyrum silvaticum* L.

Lapponia Kemensis, par. Muonio, inter frutices in prato
juxta templum. 12 Iul. 1916.

leg. J. Montell.

Cfr n. 947, 948.

1342. *Utricularia intermedia* Hayne

Savonia borealis, par. Pielavesi, Taipale, Pieniniemi, in
fossa. 8 Iul. 1935.

leg. O. Kyyhkynen.

Per totam Finlandiam et Lapponiam plerumque passim occurrit,
ad septentrionem versus sæpe sterilis.

1343. *Utricularia intermedia* Hayne

Kuusamo, par. Kuusamo, Toranki, loco paludoso prope temp-
lum, 24 Iun. 1936.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1342.

1344. Litorella uniflora (L.) Aschers.

Alandia, par. Saltvik, in ripa lacus Lavsböle träsk. 19 Iul. 1933.

legg. C. Cedercreutz et G. Åberg.

Cfr n. 950.

1345. Litorella uniflora (L.) Aschers.

Regio Aboënsis, par. Lojo, Outamo, in ripa lacus. 2 Aug. 1901.

leg. O. Sundvik.

Cfr n. 950, 1344.

1346. Plantago intermedia Gil.

(*P. major* L. var. *scopulorum* Fr.)

Ostrobottnia australis, par. Korsnäs, Harrström, in litore maris. 22 Iul. 1920.

leg. A. Lindfors.

In litoribus marium Finlandiae plerumque satis frequenter crescit

1347. Plantago media L.

Isthmus Karelicus, par. Terijoki, Tulokas, in graminosis. 19 Iun. 1938.

leg. L. Fagerström.

In Alandia propria frequenter aut satis frequenter inveniri indicatur; in Finlandia australi rara est, sed cum aliis seminibus introducta plus minus adventicia usque ad summum fere septentrionem legitur.

1348. *Plantago ramosa* (Gil.) Aschers.

Isthmus Karelicus, par. Terijoki, Keskikylä, adventicia
juxta stationem viæ ferreæ. 25 Iul.
1934 et 17 Iul. 1935.

leg. L. Fagerström.

In saburra etc. raro occurrit.

1349. *Asperula odorata* L.

Regio Aboënsis, par. Kustavi, ins. Finnholm, in coryleto.
29 Iun. 1932.

leg. V. L. Luotola.

In Finlandia australi et media raro aut rarissime occurrit.

1350. *Asperula tinctoria* L.

Satakunta, par. Raumo, Sorkka, in colle nemoroso (61°10').
23 Iul. 1916.

legg. Suoma et K. J. Valle.

Tantum loco supra allato et loco unico in Alandia in Finlandia lecta
est.

1351. *Galium palustre* L. * *elongatum* Presl.

Nylandia, par. Pernå, Hardom, Bengts, juxta rivulum fqq.
19 Iul. 1942.

leg. F. W. Klingstedt.

Cfr n. 956. Distributio *G. *elongati* in Finlandia non rite explorata est.

1352. Galium trifidum L.

Nylandia, par. Kyrkslätt, Österby, Näset, in prato humido
juxta lac. Humaljärvi. 24 Iul. 1908.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 361 a, b.

1353. Galium saxatile L.

Isthmus Karelicus, par. Terijoki, Kellomäki, loco mus-
coso in silva acerosa humida. 23
Iun. 1938.

leg. L. Fagerström.

Cfr n. 363.

1354. Galium verum L.

Regio Aboënsis, par. Lojo, ins. Storön, Paavola, in margine
viæ. 15 Iul. 1940.

leg. Harald Lindberg.

Specimina distributa e radicibus duabus capta sunt.

Cfr n. 365.

1355. Galium mollugo L.

Regio Aboënsis, par. Lojo, ins. Jalassaari, in margine viæ
juxta villulam Ekeberga. 10 Iul. 1933.

leg. Harald Lindberg.

Specimina distributa ex una radice capta sunt.

Cfr n. 958.

1356. Galium mollugo L. × G. verum L.

Isthmus Karelicus, par. Rautus, in campo arenoso juxta stationem viæ ferreæ Rautu. 6 Jul. 1934.

leg. Harald Lindberg.

Specimina distributa ex una radice capta sunt. Inter parentes non raro crescit.

1357. Lonicera xylosteum L.

Tavastia australis, par. Tyrvântö, Mälkiäinen, Kariniemi, in margine silvæ frondosæ. 14 Jun. 1932.

leg. Hilikka Linkola.

In Finlandia australi plerumque — satis frequenter ad 62° aut 63° provenit, in Finlandia media plerumque raro usque ad 64° 50' occurrit.

1358. Lonicera coerulea L.

Kuusamo, par. Kuusamo, Kulmakkapuro ad Sovajoki, juxta rivulum in silva subumbrosa. 26 Jun. 1936.

leg. Harald Lindberg.

In Finlandia tantum in Kuusamo et orientali parte Lapponiæ Kemensis raro crescit. In media parte Kareliæ orientalis frequenter provenit.

1359. Valeriana sambucifolia Mikan fil.

Tavastia australis, par. Teisko, in margine fossæ agri juxta prædium Teiskola. 1 Jul. 1917.

leg. R. Idman.

In magna parte Finlandiæ provenit.

1360. *Jasione montana* L.

Isthmus Karelicus, par. Sakkola, in colle arenoso sicco
juxta Suvantola. 9 Iul. 1934.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 966.

1361. *Campanula trachelium* L.

Isthmus Karelicus, par. Valkjärvi, Pähkinämäki, in cory-
leto. 10 Iul. 1934.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 373.

1362. *Campanula aparinoides* Pursh

Tavastia australis, par. Pälkäne, in prato humido in ripa
lac. Tyköljänjärvi, adventicia, fq. 3^o
Iul. 1933.

leg. K. Linkola.

Planta ex America bor., tantum loco supra allato in Finlandia lecta
est.

1363. *Campanula cervicaria* L.

Regio Aboënsis, par. Lojo, Routio, in colle graminoso.
23 Iul. 1915.

leg. Harald Lindberg.

In Finlandia australi passim — satis raro usque ad 63° 30' occurrit.

1364. Eupatorium cannabinum L.

Alandia, par. Finström, ins. Bergö, Husö, in fruticeto juxta mare. 1 Sept. 1942.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 377.

1365. Aster sibiricus L. var. subintegerrimus Trautv.

Kuusamo, par. Kuusamo, Paanajärvi, in insula Hietasaari juxta pag. Kauppila, copiose in ripa arenosa. 11 Jul. 1936

leg. Harald Lindberg.

Tantum raro in prov. Kuusamo lecta est.

1366. Erigeron canadense L.

Isthmus Karelicus, par. Terijoki, ad viam ferream adventicium. 9 Aug. 1936.

leg. L. Fagerström.

In Finlandia tantum in saburra etc. lectum est.

1367. Erigeron acre L.

Nylandia, loco arenoso juxta viam ferream prope opp. Ekenäs. 11 Jul. 1942.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 971.

1368. Erigeron acre L.

Regio Aboënsis, par. Lojo, ins. Storön, Hermala, in colle sicco. 4 Jul. 1942.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 971, 1367.

1369. Erigeron acre L.

K u u s a m o, par. Kuusamo, Paanajärvi, Kauppila, in colle sicco.
29 Iul. 1936.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 971, 1367, 1368.

1370. Erigeron acre L.

K u u s a m o, par. Kuusamo, Paanajärvi, loco humidiusculo juxta
rivulum prope fl. Mäntyjoki. 20 Iul. 1936.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 971, 1367, 1368, 1369.

1371. Erigeron acre L.

I s t h m u s K a r e l i c u s, par. Metsäpirtti, Taipale, in campo
arenoso sicco, graminoso una cum
E. brachycephalo (n. 1372) crescens.
26 Iun. 1934.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 971, 1367—1370.

1372. Erigeron brachycephalum Lindb. fil. n.sp. apud Soc. p.
F. et Fl. Fenn. 2. IV. 1938 (Mem. Soc. p. F. et Fl. Fenn. 14, p. 127).

I s t h m u s K a r e l i c u s, par. Metsäpirtti, Taipale, in campo
arenoso sicco, graminoso una cum
E. acri (n. 1371) crescens. 26 Iun.
1934.

leg. Harald Lindberg.

Ab *E. acri* inflorescentia paniculata, ramulis brevioribus, suberectis,
capitulis nonnullis gerentibus, capitulis minoribus breviori-
busque differt; tota planta vulgo glabrior, tempus floris multo
serius. — Harald Lindberg.

Distributio in Finlandia non rite explorata, probabiliter in parte
orientali Finlandiæ non rarum.

1373. Erigeron brachycephalum Lindb. fil. n.sp.

K a r e l i a L a d o g e n s i s, par. Salmi, in campo graminoso
siccò juxta annem prope templum.
13 Iul. 1938.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1372.

1374. Erigeron brachycephalum Lindb. fil. n.sp.

f. *pilosior*.

K a r e l i a L a d o g e n s i s, Kirjavalahi, in colle sicco. 9 Iul.
1938.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1372, 1373.

1375. Erigeron brachycephalum Lindb. fil. n.sp., var.

R e g i o A b o e n s i s, par. Tenala, Trollshovda, in rupibus apri-
cis juxta mare. 13 Iul. 1942.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1372, 1373, 1374.

1376. Erigeron decoloratum Lindb. fil. n.sp. apud Soc. p. F. et
Fl. Fenn. 2. IV. 1938 (Mem. Soc. p. F. et Fl. Fenn. 14, p. 127).

K u u s a m o, par. Kuusamo, Paanajärvi, Ruskeakallio, in declivi-
bus lapidosis apricis, una cum *E. politico* Fr. crescens.
14 Iul. 1936.

leg. Harald Lindberg.

Ab *E. acris* tota planta luteo-viridi, foliis caulinis latioribus, squamis
latioribus et mirus acuminatis, ligulis brevioribus, albis, ache-
neis majoribus apice truncato optime differt. — H a r a l d
L i n d b e r g.

Tantum locis nonnullis in prov. Kuusamo lectum est.

1377. Erigeron decoloratum Lindb. fil. n.sp.

Kuusamo, par. Kuusamo, Paanajärvi, ins. Hietasaari prope
pag. Kauppila, in campo arenoso, graminoso. 11 Jul.
1936.

leg. Harald Lindberg.

Cfr. n. 1376.

1378. Filago arvensis L.

Isthmus Karelicus, par. Valkjärvi, Pasuri, in campo
arenoso. 14 Aug. 1934.

leg. Harald Lindberg.

Cfr. n. 380.

1379. Antennaria dioeca (L.) Grtn. ♂.

Nylandia, Tvärminne, Krogen, Storängsberget, loco sicco in
rupe. 8 Jun. 1906.

leg. Inga Ström.

Per totam Finlandiam et Lapponiam frequentissime provenit. Usque
in regionem alpinam quamvis minore frequentia progreditur.

1380. Antennaria dioeca (L.) Gærtu.

Tavastia australis, par. Teisko, in silva acerosa. 13 Jun.
1919.

leg. R. Idman.

Cfr. n. 1379.

1381. Gnaphalium norvegicum Gunn.

Kuusamo, par. Kuusamo, in monte Nuorunen. 25 Iul. 1936.

leg. Edv. af Hällström.

In primis in regionibus subalpinis et subsilvaticis Lapponiae frequenter aut satis frequenter provenit. In Finlandia maxime septentrionali usque ad c. 65° descendit.

1382. Inula salicina L. *u glabra* Beck

Nylandia, par. Sibbo, Löparö, Furuholmen, in fruticeto juxta mare. 25 Iul. 1916.

leg. T. Anttila.

Cfr n. 383.

1383. Inula salicina L. *u glabra* Beck

Tavastia australis, par. Tyrvántö, Mälkiäinen, Kariniemi, in declivibus graminosis in margine silvæ. 20 Iul. 1933.

leg. K. Linkola.

Cfr n. 383, 1382.

1384. Bidens radiatus Thuill.

Isthmus Karelicus, par. Valkjärvi, Pasuri, in ripa fluminis. 14 Aug. 1934.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 385, 973.

1385. *Bidens cernuus* L.

Isthmus Karelicus, par. Valkjärvi, Pähkinämäki, in fossa.
10 Aug. 1934.

leg. Harald Lindberg.

In plagis maritimis et in Tavastia australi passim — satis raro, ceterum in parte australi Finlandiæ rarius ad c. 61° 45' invenitur, ad septentrionem versus ad oram Sinus bottnici 65° superat, interiore in parte 63° non transit.

1386. *Bidens cernuus* L. f. *minima* (L.).

Isthmus Karelicus, par. Valkjärvi, Pasuri in ripa arenosa fluminis. 14 Aug. 1934.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1385.

**1387. *Chrysanthemum vulgare* (L.) Bernh.
f. *tenuisectum* Beck.**

Nylandia, opp. Hangö, in margine viæ lapidoso una c. f. typica crescens. 29 Iul. 1934.

leg. H. Buch.

Cfr H. Buch in Memoranda Soc. p. F. et Fl. Fenn. 11, p. 214.
Cfr n. 977.

**1388. *Chrysanthemum inodorum* L.
(*Matricaria inodora* L.).**

Regio Aboënsis, par. Lojo, ins. Jalassaari, in agro inter
Triticum sativum. 25 Iul. 1934.

leg. Harald Lindberg.

In tota Finlandia usque ad 66° frequenter et copiose provenit, ulterius ad septentrionem versus plerumque minus copiose occurrit.

**1389. *Chrysanthemum inodorum* L., forma.
(*Matricaria inodora* L., forma).**

Isthmus Karelicus, par. Sakkola, in ripa arenosa lac.
Suvanto, infra pag. Mönkö. 17 Aug.
1934.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1388.

1390. *Artemisia campestris* L.

Alandia, opp. Mariehamn, in campo arenoso sicco juxta mare
22 Aug. 1942.

leg. Harald Lindberg.

Omnia specimina distributa ex eadem radice capta sunt.
Cfr n. 981, 982.

1391. *Artemisia campestris* L.

Nylandia, par. Tenala, Lappvik, in litore arenoso maris.
30 Aug. et 10 Sept. 1907.

leg. K. Holmberg.

Cfr n. 981, 982, 1390.

1392. *Artemisia campestris* L.

Isthmus Karelicus, par. Nykyrka, Vammelsuu, in campo
arenoso sicco. 21 Aug. 1934.

leg. Harald Lindberg.

Omnia specimina distributa ex eadem radice capta sunt.
Cfr n. 981, 982, 1390, 1391

1393. Tussilago farfara L.

Nylandia, Helsingfors, in Horto botanico. 5 Mai 1920.

leg. Edit Lindström.

In parte australi Finlandiæ ad c. $62^{\circ} 30'$ plerumque passim — satis frequenter provenit, in parte septentrionali raro vel rarissime invenitur.

1394. Arnica alpina (L.) Olin

Lapponia Enontekiensis, Tollhoppu ad terminum, in glareosis schistaceis. 13 Jul. 1920.

leg. M. J. Kotilainen.

In montibus Lapponiæ et Finlandiæ maxime septentr.-orientalis raro vel rarissime quamvis nonnunquam copiose crescit

1395. Senecio vulgaris L.

Tavastia australis, par. Teisko, Annila juxta prædium Teiskola, inter *Solanum tuberosum*. 21 Jul. 1919.

leg. R. Idman.

In parte australi frequenter provenit, paulatim deminuta frequentia usque ad $65^{\circ} 50'$, ubi rarissimus, procedit; in orientali parte et multis plagis Finlandiæ interioris raro occurrit.

1396. Senecio viscosus L.

Satakunta, par. Birkala, juxta viam ferream ad stationem Siuro. 17 Sept. 1915.

leg. H. A. Printz.

Cfr n. 393, 983.

1397. Aretium lappa L.

Tavastia australis, ad viam publicam juxta opp. Tavasteburgum. 18 Aug. 1935.

leg. K. Linkola.

In parte australi saltem usque ad 62° rarissime occurrit.

1398. Aretium tomentosum Mill.

Nylandia, urb. Helsingforsæ, loco ruderato ad sinum Tölöensem. 20 Jul. 1932.

leg. M. Puolanne.

In Finlandia australi satis frequenter vel frequenter inprimis in vicinitate oræ australis occurrit, quamquam rara $64^{\circ} 15'$ attingit; in saburra cet. usque ad $65^{\circ} 45'$ indicatur.

1399. Carduus crispus L.

Isthmus Karelicus, par. Pyhäjärvi, in ruderatis juxta præd. Taubila. 18 Aug. 1934.

leg. P. H. Lindberg.

Per totum fere territorium occurrit, inprimis in Lapponia occidentali frequenter, in maxima parte passim legitur, sed multis plagis inprimis in media Finlandia raro tantum invenitur.

1400. Cirsium oleraceum (L.) Scop.

Isthmus Karelicus, par. Valkjärvi, Pähkinämäki, in declivibus humidis. 10 Aug. 1934.

leg. Harald Lindberg.

In Finlandia rarissime solum in parte maxime orient.-australi occurrit; in Karelia rossica satis frequenter in parte australi provenit.

1401. *Cirsium oleraceum* (L.) Scop.

Isthmus Karelicus, par. Rautu, loco paludoso juxta rivulum prope pag. Raasuli. 10 Iul. 1934.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1400.

1402. *Cirsium arvense* (L.) Scop.

var. *incanum* (Fischer) Ledeb.

Nylandia, urb. Helsingforsicæ, Sandudd, in ruderatis adventicium. 30 Iul. 1913.

leg. J. Kivenheimo.

Cfr n. 989 a, b. Var. *incanum* (Fischer) tantum adventicium.

1403. *Centaurea jacea* L.

Regio Aboënsis, par. Lojo, ins. Jalassaari, in margine viæ juxta villulam Ekeberga. 29 Iul. 1933.

leg. Harald Lindberg.

Specimina omnia distributa ex una radice capta sunt.

Cfr n. 991.

1404. *Saussurea alpina* (L.) DC.

Kuusamo, par. Kuusamo, Paanajärvi, in prato humido juxta fl. Mäntyjoki. 15 Iul. 1936.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 990.

1405. Hypochoeris maculata L.

Tavastia borealis, par. Teisko, in colle graminoso juxta
prædium Poukka. 7 Jul. 1917.

leg. R. Idman.

In Finlandia australi plerumque passim — satis frequenter occurrit,
ad septentrionem versus usque ad c. $63^{\circ} 20'$ progreditur, ubi
jam rarissima.

1406. Leontodon autumnalis L.

Tavastia australis, par. Längelmäki, Länkipohja, in prato
ripe. 26 Jul. 1932.

leg. T. Kontuniemi.

In tota Finlandia usque ad $66^{\circ} 30'$ frequentissime vel frequenter
provenit, unde ulterius ad septentrionem frequentia minuitur.

1407. Picris hieracioides L.

Regio Aboënsis, par. Lojo, ins. Jalassaari, in margine viæ
graminosa; ab initio adventicia. 19 Jul.
1938.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 997.

1408. Picris hieracioides L.

Karelia borealis, par. Juuka, in colle graminoso betuli-
fero inter Polvela et Tahkovaara, fqq.
6 Aug. 1942.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 997, 1407.

1409. Scorzonera humilis L.

Regio Aboënsis, par. Lojo, ins. Jalassaari, loco graminoso aperto in margine silvæ juxta villulam Ekeberga. 15 Iun. 1936.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 998.

1410. Lactuca alpina (L.) A. Gray

Kuusamo, par. Kuusamo, Paanajärvi, in abieigno humido prope alpem Mäntytunturi. 26 Iul. 1936.

leg. Harald Lindberg.

In Lapponia et in Finlandia septentrionali passim — satis raro occurrit; ad meridiem versus usque ad $64^{\circ} 25'$ procedit.

1411. Sonchus arvensis L. var. uliginosus (M.B.).

Tavastia australis, par. Längelmäki, Länkipohja, in agro. 10 Aug. 1932.

leg. T. Kontuniemi.

Cfr n. 999.

1412. Crepis tectorum L., forma I.

Regio Aboënsis, par. Lojo, ins. Jalassaari, loco aprico in monte prope villulam Ekeberga. 8 Iul. 1942.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1000.

1413. *Crepis tectorum* L., forma II.

Regio Aboënsis, par. Lojo, ins. Jalassaari, loco humoso in rupe juxta villulam Ekeberga. 13 Jun. 1937.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1000, 1412.

1414. *Taraxacum angustisectum* Lindb. fil.

(*T. angustum* Lindb. fil. olim.)

Sectio *Erythrosperma*.

Nyländia, in Horto botanico Helsingforsiae cultum. Semina ex Isthmo Karelico, Perkjärvi, leg R. Cederharf. 2 Jun. 1912.

leg. Harald Lindberg.

Humile; folia angustisecta, petiolis angustis, non coloratis; calathium leviter convexum, 32 mm latum; involucrium c. 16 mm altum, glaucescens, squamæ exteriores 12 mm longæ, 3—5 mm latæ, irregulariter patulæ, anguste albomarginatæ, violascentes, ± corniculatæ, interiores apice atrovioleæ, ± corniculatæ; ligulæ pallide luteæ, marginales 2 mm latæ, subtus stria atrovioleæ ornata; antheræ non polliniferæ; stigmata obscura; achenium olivaceum. Cfr Acta bot. fenn., 17, Tab. 1, 1—2. — Harald Lindberg.

Tantum in Karelia australi et in Isthmo karelico lectum est.

1415. *Taraxacum brachycranum* Dahlst.

(*T. fallax* Petterss. in sched.)

Sectio *Erythrosperma*.

Nyländia, par. Ekenäs, Tvärminne, Krogen, in graminosis. 19 Jun. 1908.

leg. E. Häyrén.

In tota fere Finlandia dispersum est. Cfr Acta bot. fenn. 17, Tab. 2, 10—12.

1416. *Taraxacum dissimile* Dahlst.
 (*T. conjugens* Lindb. fil.)
 Sectio *Erythrosperma*.

Regio Aboënsis, par. Lojo, ins. Jalassaari, in colle sicco
 juxta villulam Ekeberga. 14 Jun. 1916.

leg. Harald Lindberg.

In Finlandia tantum in Reg. Aboënsi et in Nylandia lectum est
 Cfr Acta bot. fenn. 17, Tab. 1, 7—9.

1417. *Taraxacum fulvum* Raunk.
 Sectio *Erythrosperma*.

Nylandia, par. Kyrklätt, Österby, in graminosis siccis juxta
 Nygård. 15 Jun. 1908.

leg. Harald Lindberg.

In tota fere Finlandia frequenter obvium. Cfr Acta bot. fenn. 17,
 Tab. 2, 13—14.

1418. *Taraxacum fulvum* Raunk.
 Sectio *Erythrosperma*.

Savonia borealis, par. Jorois, Järvikylä, in graminosis
 siccis. 7 Jun. 1911.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1417.

1419. *Taraxacum marginatum* Dahlst.
 Sectio *Erythrosperma*.

Nylandia, par. Ekenäs, Tvärminne, ins. Björkskär, in colle
 sicco.

leg. E. Häyrén.

Cfr n. 396. In Finlandia australi et media usque ad Ostrob. austr.
 et Savoniam bor. dispersum. Cfr Acta bot. fenn. 17, Tab. 3,
 21—22.

1420. *Taraxacum marginatum* Dahlst.
Sectio *Erythrosperma*.

N y l a n d i a, par Tenala. Lappvik, in colle sicco. Iun. 1907.

leg. F. Häyrén.

Cfr n. 396, 1419.

1421. *Taraxacum marginatum* Dahlst.
Sectio *Erythrosperma*.

N y l a n d i a, urb. Helsingfors, in colle sicco in Horto Sinebrychoff.
6 Iun. 1909.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 396, 1419, 1420.

1422. *Taraxacum obscurans* (Dahlst.) Hagl.
(*T. latum* Dahlst. * *obscurans* Dahlst.)

A l a n d i a, par. Föglö, Degerby, ins. Gripö, in colle sicco. 7 Iun.
1907.

leg. A. Palmgren.

In partibus austro-occidentalibus usque ad Ostrob. austr. in Fin-
landia dispersum est. Cfr Acta bot. fenn. 17, Tab. 3, 19—20.

1423. *Taraxacum obscurans* (Dahlst.) Hagl.
(*T. latum* Dahlst. * *obscurans* Dahlst.)
Sectio *Erythrosperma*.

N y l a n d i a, par. Ekenäs, Tvärminne, ins. Björkskär, in arena
nuda. 13 Iun. 1908.

leg. E. Häyrén.

Cfr n. 1422.

1424. *Taraxacum proximum* Dahlst.
Sectio *Erythrosperma*.

S a t a k u n t a, par. Eura, Panelia, in graminosis siccis. 11 Iun.
1909.

leg. Harald Lindberg.

Plurimis in partibus Finlandiæ usque ad Ostrobot. bor. obvium.
Cfr Acta bot. fenn. 17, tab. 3, 25—27.

1425. *Taraxacum pseudofulvum* Lindb. fil.
Sectio *Erythrosperma*.

R e g i o A b o ò n s i s, par. Lojo, ins. Jalassaari, in colle sicco
juxta villulam Ekeberga. 12 Iun. 1916.

leg. Harald Lindberg.

Humile; folia fere glabra, angustisecta, petiolis angustis obscure
brunneo-violaceis; involucrium 15—16 mm altum, obscure vi-
ride; squamæ exteriores angustæ, 10—12 mm longæ, 1.5—2 mm
latæ, subreflexæ vel vulgo laxè patulæ, ± corniculatæ, anguste
albomarginatæ; ligulæ pallide lutæ, subtus stria lata fere atra
ornatæ; antheræ non polliniferæ; stigmata atroviridia; achenium
stramineo-olivaceum. Cfr Acta bot. fenn. 17, Tab. 4,
28—29. — H a r a l d L i n d b e r g.

In Finlandia australi et media, usque ad Savoniam bor. dispersum.

1426. *Taraxacum rubicundum* Dahlst.
Sectio *Erythrosperma*.

A l a n d i a, par. Lemland, ins. Nåtö, in colle sicco. 10 Iun. 1907.

leg. A. Palmgren.

In Alandia sat multis locis occurrit. Cfr Acta bot. fenn. 17, Tab.
4, 30—31.

1427. *Taraxacum balticum* Dahlst.
Sectio *Palustria*.

Alandia, par. Föglö, ins. Gripö, in litore maris. 28 Iun. 1907.

leg. A. Palmgren.

Cfr n. 397. Etiam in Nylandia lectum est. Cfr Acta bot. fenn. 17, Tab. 6, 46—48.

1428. *Taraxacum balticum* Dahlst.
Sectio *Palustria*.

Alandia, par. Lemland, ins. Jersö, in litore maris. 11 Iun. 1907.

leg. A. Palmgren.

Cfr n. 397, 1427.

1429. *Taraxacum balticum* Dahlst.
Sectio *Palustria*.

Alandia, par. Ekerö, Storbyn, in litore maris. 15 Iun. 1906.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 397, 1427, 1428.

1430. *Taraxacum crocodes* Dahlst.
Sectio *Palustria*.

Ostrobottnia Kajanensis, par. Suomussalmi (Kianta),
in ripa lac. Kiantajärvi, ad
Vasoniemi, sat copiose 15—
17 Iul. 1909.

leg. O. Kyyhkynen.

In Finlandia tantum hoc loco (c. 64° 55') repertum est. Cfr Acta
bot. fenn. 17, Tab. 6, 49—50.

1431. *Taraxacum simulum* Brenner
 (*T. melanostylum* Th. Fr. jun.).
 Sectio *Ceratophora*.

Lapponia Kemensis, par. Muonio, in prato juxta templum. 6 Jul. 1913.

leg. J. Montell.

Paucis locis in Finlandia maxime septentrionali et in Lapponia inveniri indicatur. Cfr Acta bot. fenn. Tab. 5, 44—45.

1432. *Taraxacum croceum* Dahlst.
 Sectio *Spectabilia*.

Kuusamo, par. Kuusamo, inter frutices in prato humido juxta sinum Taivallahti lacus Kuusamonjärvi, haud procul a templo. 23 Jun. 1936.

leg. Harald Lindberg.

In Lapponia et Finlandia maxime septentrionali plus minusve frequenter invenitur. In multis formis diversis occurrit. Cfr Acta bot. fenn. 17, Tab. 7, 55—59.

1433. *Taraxacum præstans* Lindb. fil.
 Sectio *Spectabilia*.

Regio Aboënsis, par. Lojo. ins. Jalassaari, loco graminoso inter frutices juxta ripam lacus, haud procul a prædio Ahtiala. 6 Jun. 1938.

leg. Harald Lindberg.

Nonnullis plagis, imprimis in vicinitate marium occidentalium satis frequenter occurrere indicatur, ceterum raro in parte occidentali Finlandiæ australis et mediæ. Ad septentrionem versus usque ad c. 64° lectum est. Cfr Acta bot. fenn. 17, Tab. 8, 64—66 et Dahlstedt, K. Svenska Vet. akadem. Handl., Ser. 3, B. 9, N:o 2, p. 34.

1434. *Taraxacum præstans* Lindb. fil.
Sectio *Spectabilia*.

Regio Aboënsis, par. Lojo, Syd-Lojo, Biskopsnäs, in graminosis subumbrosis inter frutices juxta ripam lacus. 7. Jun. 1938.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1433.

1435. *Taraxacum præstans* Lindb. fil.
Sectio *Spectabilia*.

Tavastia australis, par. Jokioinen, in graminosis nemorosis ad rivulum Koivusoja. 24 Mai 1910.

leg. S. Sælmerlinna.

Cfr n. 1433, 1434.

1436. *Taraxacum sagittifolium* Lindb. fil.
(*T. sagittatum* Lindb. fil. olim).
Sectio *Spectabilia*.

Ostrobottnia Kajanensis, par. Suomussalmi, Ylinäljänkä, Nivavaara, loco humidiusculo. 23 Jun. 1911.

leg. O. Kyyhkynen.

In Finlandia septentrionali et Lapponia australi occurrit. Cfr Acta bot. fenn., 17, Tab. 8, 67—68 et Dahlstedt, K. Svenska Vet. Akadem. Handl., Ser. 3, B. 9, N:o 2, p. 74.

1437. *Taraxacum sagittifolium* Lindb. fil.
(*T. sagittatum* Lindb. fil. olim).
Sectio *Spectabilia*.

Kuusamo, par. Kuusamo, in margine fossæ in agro juxta templum. 21 Jun. 1936.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1436.

1438. Taraxacum sagittifolium Lindb. fil.*(T. sagittatum* Lindb. fil. olim).Sectio *Spectabilia*.

Kuusamo, par. Kuusamo, in prato humido juxta ripam lacus
Torankijärvi, in *Sphagnis*. 24 Jun. 1936.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1436, 1437.

1439. Taraxacum sagittifolium Lindb. fil.*(T. sagittatum* Lindb. fil. olim).Sectio *Spectabilia*.

Nyländia, in Horto botanico Helsingforsiae cultum. Semina
e Lapponia Kemensi, par. Sodankylä, Puolakka.
14 Jul. 1910, leg. Harald Lindberg.

conservavit H. Buch.

Cfr n. 1436, 1437. 1438.

1440. Taraxacum cochleatum Dahlst. et Lindb. fil.Sectio *Boreigena*.

Kuusamo, par. Kuusamo, in prato juxta templum. 21 Jun. 1936.

leg. Harald Lindberg.

In Lapponia et Finlandia septentrionali sat raro occurrit. Cfr Acta
bot. fenn. 17, Tab. 14, 114. et Dahlstedt, Arkiv för botanik,
B. 12, N:o 2, p. 73.

1441. Taraxacum cochleatum Dahlst. et Lindb. fil.Sectio *Boreigena*.

Nyländia, in Horto botanico Helsingforsiae cultum. 18 Jun.
1915. Semina ex Ostrob. Kajauensi, par. Suomus-
salmi, 1911, leg. O. Sorsakoski.

conserv. Harald Lindberg.

Cfr n. 1440.

1442. *Taraxacum galeatum* Dahlst.
 (*T. molle* Lindb. fil.)
 Sectio *Boreigena*.

Ostrobottnia Kajanensis, par. Suomussalmi, in prato
 subhumido. 6 Jul. 1911.

leg. O. Kyyhkynen.

Paucis plagis in Finlandia septentrionali frequenter provenire
 indicatur. Cfr Acta bot. fenn. 17, Tab. 20, 165.

1443. *Taraxacum galeatum* Dahlst.
 (*T. molle* Lindb. fil.)
 Sectio *Boreigena*.

Kuusamo, par. Kuusamo, in graminosis prope templum. 21
 Jun. 1936.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1442.

1444. *Taraxacum kuusamoëns* Lindb. fil et Palmgr.
 Sectio *Boreigena*.

Ostrobottnia Kajanensis, opp. Kajana, in prato juxta
 fluminem. 15 Jun. 1912.

leg. Maja Arvonen.

In Finlandia septentrionali et Lapponia australi inter $67^{\circ} 50'$ et 64°
 $12'$ rarius occurrit. Cfr Acta bot. fenn. 17, Tab. 23, 200.

1445. *Taraxacum kuusamoëns* Lindb. fil. et Palmgr.
 Sectio *Boreigena*.

Kuusamo, par. Kuusamo, in graminosis prope templum. 21
 Jun. 1936.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1444.

1446. *Taraxacum perattenuatum* Lindb. fil. n.sp.
Sectio *Boreigena*.

Kuusamo, par. Kuusamo, in graminosis prope templum. 21 Jun. 1936.

leg. Harald Lindberg.

Folia obscure viridia, apice attenuato, acuto, supra pilis articulatis sat dense vestita, petiolis angustis, obscure purpureo-violaceis; calathidium 40—50 mm latum; involucrium 2 cm altum, pallide viride; squamæ pallide virides, exteriores latæ, reflexæ, apice purpureo, marginibus anguste albomarginatis; ligulæ marginales angustæ, pallide luteæ, subtus sæpe vitta albida notatæ; antheræ non polliniferæ; stylus luteus, brevis, stigmatibus luteis; achenium apice tuberculatum, 3.5—4 mm longum, supra medium 1 mm latum, olivaceo-brunneum, sæpe in parte superiore \pm violascens, abrupte in pyramiden subcylindricam, 0.5 mm longam abiens, rostro 11—13 mm longo. — Harald Lindberg.

In par. Kuusamo sat frequens.

1447. *Taraxacum rubrolineatum* Lindb. fil.
Sectio *Boreigena*.

Nylandia, in Horto botanico Helsingforsiae cultum. 20 Jun. 1916. Semina e Lapponia Petsamoënsi, 5 Aug. 1909, leg. F. V. Klingstedt.

conserv. Harald Lindberg.

Folia læte coeruleo-viridia, supra pilis articulatis parce vestita, petiolis angustis, viridibus; calathidium 45—55 mm latum; involucrium 2 cm altum, pallide viride; squamæ exteriores 2—3 mm latæ, \pm patulæ, pallide virides, apice purpureo; ligulæ marginales laxæ, planæ, sat angustæ, subtus rubroviolaceæ; antheræ abundanter polliniferæ; stylus luteus, stigmatibus luteis; achenium (cfr Acta bot. fenn. 17, Tab. 34, 290—292). — Harald Lindberg.

In Lapponia et Finlandia septentrionali raro occurrit.

1448. *Taraxacum uberilobum* Lindb. fil. n.sp.
Sectio *Boreigena*.

N y l a n d i a, in Horto botanico Helsingforsiae cultum. 16 Jun.
1915. Semina ex Ostrobotnia Kajanensi, par.
Suomussalmi, 1911, leg. O. Sorsakoski.

conserv. Harald Lindberg.

Folia mollia, pallide viridia, supra pilis articulatis sat dense vestita
petiolis angustis \pm rubroviolaceis; calathidium 50 mm latum,
sat obscure luteum, densiflorum; involucrium 20—23 mm altum,
pruinatum; squamæ exteriores patulae, 17 mm longae, 3—4(6)
mm latae, valde pruinatae, apice paululo colorato; ligulae margi-
nales 2 mm latae, planae, subtus striis tribus angustissimis, saepe
sat indistinctis, violaceo-brunneis notatae; ligulae interiores
tubulosae; antherae obscurae, polliniferae; stylus luteus, stigmati-
bus luteis. — H a r a l d L i n d b e r g.

1449. *Taraxacum aculeatum* Hagl.
(*T. Puolannei* Markl.).
Sectio *Vulgaria*.

N y l a n d i a, par. Esbo, in prato juxta praedium Esbo gård. 9 Jun.
1933.

leg. G. Marklund.

Tantum in Nylandia et Satakunta lectum est.

1450. *Taraxacum acutidens* Lindb. fil.
in Medd. Soc. p. F. et Fl. Fenn. XXXVII, p. 35 (1910).
Sectio *Vulgaria*.

N y l a n d i a, in Horto botanico Helsingforsiae cultum. 11 Jun.
1916. Semina e Lapponia Kemensi, par. Muonio,
Kutuniva, 5 Jul. 1910, leg. Harald Lindberg.

conserv. Harald Lindberg.

Folia dilute viridia, acute dentata, supra pilis articulatis parce vestita, nervis et petiolis angustis \pm intense violaceis; calathidium 40—50 mm latum, sat obscure luteum, densiflorum, valde convexum; involucrium 23—25 mm altum; squamæ exteriores laxè patulæ — subreflexæ, 16 mm longæ, 4 mm latæ, supra glaucescentes et \pm violascentes, apice colorato; ligulæ marginales angustæ, 2 mm latæ, canaliculatæ et \pm curvatæ, subtus stria violaceo-brunnea distincta notatæ; antheræ pallidæ, abundanter polliniferæ; stigmata sordide et \pm obscure virescentia; achenium angustum, parvum, apice breve et acute spinulosum, 3,5 mm longum et supra medium 0.7 mm latum, sensim in pyramiden brevem abiens, olivaceo-stramineum. Cfr Acta bot. fenn. 17, Tab. 9, 72. — Harald Lindberg. Tantum in Ostrobottnia media, Ostrobottnia boreali et in partibus occidentalibus Lapponiæ Kemensis lectum est.

1451. Taraxacum acutidens Lindb. fil.

in Medd. Soc. p. F. et Fl. Fenn. XXXVII, p. 35 (1910).

Sectio *Vulgaria*.

N y l a n d i a, in Horto botanico Helsingforsicæ cultum, 12 Iun. 1915. Semina e Lapponia Kemensi, par. Muonio, Paloselkä, 5 Iul. 1910, leg. Harald Lindberg.

conserv. Harald Lindberg.

Cfr n. 1450.

1452. Taraxacum acutisectum Markl.

Sectio *Vulgaria*.

N y l a n d i a, Helsingfors, Djurgården, 5 Iun. 1933.

leg. G. Marklund.

Tantum loco supra allato in Finlandia lectum est.

1453. Taraxacum æquilobum Dahlst.

Sectio *Vulgaria*.

O s t r o b o t t n i a K a j a n e n s i s, opp. Kajana, in graminosis. 15 Iun. 1912.

leg. Maja Arvonen.

In Finlandia usque ad Ostrobottniam borealem dispersum. Cfr acta Bot. fenn. Tab. 9 74—75

1454. *Taraxacum alatum* Lindb. fil.

in Acta Soc. p. F. et Fl. Fenn. 29, No 9, p. 20 (1908).

Sectio *Vulgaria*.

N y l a n d i a, Helsingfors, Djurgården, Fågelsång, in colle graminoso. 28 Mai 1913.

leg. Harald Lindberg.

Folia dilute viridia, supra parce pilosa, petiolis viridibus, \pm alatis; calathidium 50—60 mm latum, sat laxiflorum, planum vel fere planum, sat obscure luteum; involucrium obscure viride, post anthesin 20—25 mm altum; squamæ exteriores 15 mm longæ, 4 mm latæ, supra glaucescentes, patulæ, post anthesin apicibus \pm sursum curvatis; ligulæ marginales 2—3 mm latæ, planæ, subtus stria lata, distincta, schistacea notatæ; antheræ abundanter polliniferæ; stylus et stigmata sublutea; achenium griseo-olivaceum, 3—3.2 mm longum, supra medium 1 mm latum, apice spinulosum, abrupte in pyramidem conicam, 0.6—0.8 mm longam abiers. Cfr Acta Bot. fenn., 17 Tab. 9, 76—77, Tab. 10, 78. — Harald Lindberg.

In Reg. Aboënsi, Nylandia, Satakunta, Savonia austr., Karelia Ladog. et Ostrob. bor. lectum est.

1455. *Taraxacum albicollum* Dahlst. (+ pollen).*(T. bifformatum Lindb. fil.)*Sectio *Vulgaria*.

S a t a k u n t a, par. Eura, Nuorante, in gramiriosis. 15 Iun. 1909.

leg. Harald Lindberg.

In Finlandia australi et media multis locis et nonnullis saltem plagis satis frequenter occurrit. Ad septentrionem usque ad Lapp. Petsam. indicatur, ubi plus minusve adventicium apparet. Cfr Acta Bot. Fenn. 17, Tab. 10, 8^o—81.

1456. *Taraxacum albicollum* Dahlst. (+ pollen).*(T. bifformatum Lindb. fil.)*Sectio *Vulgaria*.

S a t a k u n t a, par. Karkku, Linnais, in graminosis. 16 Iun. 1909.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1455.

**1457. *Taraxacum albicollum* Dahlst. (— pollen).
(*T. bifformatum* Lindb. fil.)
Sectio *Vulgaria*.**

Satakunta, par. Eurca, Panelia, in graminosis. 9 Jun. 1909.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1455, 1456.

**1458. *Taraxacum albicollum* Dahlst. (— pollen).
(*T. bifformatum* Lindb. fil.)
Sectio *Vulgaria*.**

Savonia borealis, par. Jorois, Järvikylä, in graminosis.
11 Jun. 1911.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1455, 1456, 1457.

**1459. *Taraxacum altissimum* Lindb. fil.
in Acta Soc. p. F. et Fl. Fern., 29, N:o 9, p. 20 (1908).
Sectio *Vulgaria*.**

Nylandia, in Horto botanico Helsingforsiae, in graminosis fqq.
25 Mai 1913. Locus classicus.

leg. Harald Lindberg.

C. 60 cm altum; folia longa, angusta, obscure viridia, petiolis plerumque latiusculis, anguste—sat late alatis, \pm roseo-violaceis; calathidium 55—68 mm latum, planum, densiflorum, sat obscure luteum; involucrium obscure viride, post anthesin 20—23 mm altum, 20 mm latum; squamæ exteriores patulae, 4—7 mm latae, 15—17 mm longae, subtus olivaceae, nitidae, supra glaucescentes, marginibus planis; ligulae exteriores sat obscure luteae, 2—2.5 mm latae, planae, interiores canaliculatae; antherae abundanter polliniferae; stylus et stigmata longa, lutea; achenium brunneo-griseum — olivaceo-brunneum, 3.2—3.6 mm longum, supra medium 1 mm latum, apice breviter spinulosum, in pyramidem coricam, 0.3 mm longam, c. 0.4 mm latam sat sensim abiens. Cfr Acta Bot. Fenn. 17, Tab. 10, 82—84. — Harald Lindberg.

Ex Alandia usque ad Savoniam borealem dispersum est.

1460. *Taraxacum altissimum* Lindb. fil.

in Acta Soc. p. F. et Fl. Fenn., 29, N:o 9, p. 20 (1908).

Sectio *Vulgaria*.

Regio Aboënsis, par. Lojo, ins. Jalassari, in margine fossæ
in horto ad villulam Ekeberga. 9 Iun. 1942.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1459.

1461. *Taraxacum angustisquameum* Dahlst.apud Harald Lindb., Acta Soc. p. F. et Fl. Fenn., 29, N:o 9, p. 23
(1908).Sectio *Vulgaria*.

Nylandia, in Horto botanico Helsingforsæ, in graminosis.
2 Iun. 1908.

leg. Harald Lindberg.

In tota Finlandia usque ud 65° septentrionem versus (Ostrob. bor.,
Kuusamo), sed sat raro lectum est. Cfr Acta Bot. Fenn. 17,
Tab. 11, 88—89.

1462. *Taraxacum assurgens* Markl.Sectio *Vulgaria*.

Karelia Ladogensis, opp. Sortavala, in horto seminarii.
20 Iun. 1938. Locus classicus.

leg. Harald Lindberg.

Tantum in Karelia Ladogensi lectum est.

1463. *Taraxacum atrimarginatum* Lindb. fil.
in sched. 1911. (+ pollen).
Sectio *Vulgaria*.

Savonia borealis, par. Jorois, Järvikylä, in prato juxta
Nivuranta. 13 Jun. 1911.

leg. Harald Lindberg.

Folia coeruleo-viridia, sat firma, atrimarginata, supra pilis articu-
latis sat parce vestita, petiolis angustis, arachnoideis, obscure
vinoso-violaceis; calathidium 45 mm latum, sat densiflorum,
planum, læte luteum; involucrium 15—18 mm altum; squamæ
exteriores 14—15 mm longæ, 3 mm latæ, laxè patulæ — laxè
reflexæ, glaucescentes et ± violascentes, anguste albo-margi-
natae, apice non colorato; ligulæ marginales 2 mm latæ, denique
canaliculatae (fere ut in *T. Dahlstedtii*), subtus stria pallide
schistacea ornatae; antheræ polliniferæ vel polline carentes;
stylus et stigmata sublutea; achenium 3 mm longum, supra
medium 0.7 mm latum, olivaceo-stramineum, sensim in
pyramiden cylindricam abiens. Cfr Acta Bot. Fenn. 17, Tab.
11, 92—93. — Harald Lindberg.

In Finlandia australi et media usque ad Ostrob. Kajanensem sat
frequenter dispersum.

1464. *Taraxacum atripictum* Markl.

Nylandia, par. Helsinge, Marudd, in prato culto. 9 Jun. 1934.

leg. G. Marklund.

Tantum rarissime in prov. Nylandia crescit.

1465. *Taraxacum aurosulum* Lindb. fil.
in Medd. Soc. p. F. et Fl. Fenn. 35, p. 14 (1908).
Sectio *Vulgaria*.

Nylandia, Helsingfors, in Horto Sinebrychoff, in graminosis
frequens. 2 Jun. 1908. Locus classicus.

leg. Harald Lindberg.

Planta crassa, 30—40 cm alta, infra vulgo paululo vinoso-violacea.

Folia magna, crassa, firma, obscure viridia, supra nitida et parcissime pilis articulatis vestita, petiolis vulgo latis; calathidium valde convexum, fere semiglobosum, denique fere planiusculum, 50—60 mm latum, densiflorum, obscure aureum; involucrium breve; squamæ exteriores patulæ, 15 mm longæ, 4—5 mm latæ, supra glaucescentes et paululo violascentes, infra obscure virides, nitidiusculæ, non glaucescentes, violascentes; ligulæ marginales planæ, 3 mm latæ, infra stria distincta, schistacea ornata; antheræ abundanter polliniferæ; stylus et stigmata obscura; achenium magnum, 3.9—4.2 mm longum, supra medium 1.4 mm latum, fusco-viride, sat subito in pyramidem breviter conicam, 0.5 mm longam abiens. Cfr Acta Bot. Fenn. 17, Tab. 12, 96. — Harald Lindberg.

Species rara in Finlandia, tantum in opp. Åbo et in par. Korpo in Reg. Aboënsi et duobus locis in urbe Helsingfors lecta est.

1466. Taraxacum Boldtii Lindb. fil.

in sched. 1918.

Sectio *Vulgaria*.

Regio Aboënsis, par. Lojo, ins. Huhtsaari juxta Ahtiala in insula Jalassaari, in prato juxta ripam lacus. 18 Jun. 1918.

leg. Harald Lindberg.

Folia pallide viridia, angusta, longa, lobis distantibus, immaculata vel parce maculata, supra pilis articulatis parce vestita, petiolis longis, angustis, vulgo intense violaceis; calathidium 45 mm latum, planum, obscure luteum; involucrium obscurum, 15—18 mm altum; squamæ exteriores reflexæ, angustæ, longe acuminatæ, 14 mm longæ, 2 mm latæ, pallide virides, supra glaucescentes, apice paululo coloratæ; ligulæ marginales 2 mm latæ, ± canaliculatæ, infra stria distincta pallide schistacea coloratæ; antheræ abundanter polliniferæ vel polline carentes; stylus et stigmata sordida; achenium olivaceo-stramineum, 3—3.5 mm longum, supra medium 0.8—0.9 mm latum, angustum, sensim in pyramidem, subcylindricam, 0.5—0.6 mm longam, sæpe 2-spinulosam abiens. Cfr Acta Bot. Fenn. 17, Tab. 12, 99—100. — Harald Lindberg.

Species rara in Finlandia, tantum in Alandia, Reg. Aboënsi, Nylandia et Tavastia australi lecta est.

1467. *Taraxacum boreophilum* Lindb. fil n.sp.
Sectio *Vulgaria*.

N y l a n d i a, in Horto botanico Helsingforsiae cultum. 2 Iun. 1913.
Semina e par. Suomussalmi Ostrobottniae Kajanensis,
1911, leg. O. Sorsakoski.

leg. Harald Lindberg.

Folia obscure viridia, firma, margiribus crispis, supra pilis articulatis sat dense vestita, petiolis \pm alatis, \pm rubro-violaceis; calathidium 65—70 mm latum, planum, sat laxiflorum, pallide luteum; involucrem obscurum, 20—23 mm altum; squamæ exteriores patulæ, 17 mm longæ, 5 mm latæ, supra glaucescentes, infra obscure virides; ligulæ marginales planæ, 3 mm latæ, infra stria distincta, pallide schistacea ornata; antheræ abundanter polliniferæ; stylus et stigmata obscura. — H a r a l d L i n d b e r g.

Tantum e paroecia Suomussalmi in Ostrobottnia Kajanensi cognitum est.

1468. *Taraxacum caloschistum* Dahlst.
Sectio *Vulgaria*.

R e g i o A b o ò e n s i s, par. Lojo, ins. Jalassaari, in margine fossæ in agro. 5 Iun. 1938.

leg. Harald Lindberg.

Species in Finlandia rara, tantum in Reg. Aboënsi, Nylandia, Satakunta et Ostrob. Kajanensi lectum est. Cfr Acta Bot. Fenn. 17, Tab. 13, 104—105.

1469. *Taraxacum caloschistum* Dahlst.
Sectio *Vulgaria*.

N y l a n d i a, in Horto botanico Helsingforsiae cultum. 13 Iun. 1916. Semina ex opp. Åbo, 1910, leg. K. Linkola.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1468.

- 1470. *Taraxacum canaliculatum*** Lindb. fil. (— pollen).
in Acta Soc. p. F. et Fl. Fenn., 29, N:o 9, p. 39 (1908).
Sectio *Vulgaria*.

N y l a n d i a, Kyrkslätt, in margine viæ ferratæ. 5 Iun. 1908.

leg. Harald Lindberg.

Folia obscure viridia, longa, angusta, marginibus anguste atroviolaceis, ambis paginis pilis articulatis sat longis sat dense vestita, petiolis angustis vulgo paululo violaceis; calathidium 45—50 mm latum, densiflorum, pallide luteum; involucrium 20—25 mm altum, obscure viride; squamæ exteriores magnæ, latæ (5—7 mm), fere semper ± violaceæ, laxè reflexæ, post anthesin laxè patulæ; ligulæ marginales pallide luteæ, angustæ (2 mm latæ), canaliculatæ, subtus stria angusta, pallide schistacea, sat distincta ornata; antheræ polliniferæ vel polline carentes; achenium angustum, olivaceum vel griseo-viride, 2.8 mm longum, supra medium 0.8—0.9 mm latum, apice breve et acute spinulosum, sensim in pyramidem angustam, cylindricam, 0.7—1 mm longam, sæpe 2-spinulosam abiens. Cfr Acta Bot. Fenn. 17, Tab. 13, 106—108. — Harald Lindberg.

Species in tota Finlandia usque ad prov. Kuusamo frequenter obviam.

- 1471. *Taraxacum canaliculatum*** Lindb. fil. (— pollen).
in Acta Soc. p. F. et Fl. Fenn., 29, N:o 9, p. 39 (1908).
Sectio *Vulgaria*.

S a t a k u n t a, par. Eura, in prato sicco. 15 Iun. 1909.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1470.

- 1472. *Taraxacum canaliculatum*** Lindb. fil. (+ pollen).
in Acta Soc. p. F. et Fl. Fenn., 29, N:o 9, p. 39 (1908).
Sectio *Vulgaria*.

S a v o n i a b o r e a l i s, par. Jorois, Järvikylä, in campo graminoso sicco. 10 Iun. 1911.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1470, 1471.

1473. *Taraxacum canentifolium* Markl.
Sectio *Vulgaria*.

Nylandia, par. Esbo, in prato culto juxta prædium Esbo gård.
9 Jun. 1933.

leg. G. Marklund.

In Finlandia tantum loco supra allato lectum est.

1474. *Taraxacum canoviride* Lindb. fil.
Sectio *Vulgaria*.

Nylandia, Helsingfors, Brunnsparken, in colle graminoso. 10
Jun 1908.

leg. Harald Lindberg.

Folia angustisecta, canoviridia, supra sat dense pilis articulatis vestita, petiolis angustis \pm violaceis; calathidium 45—50 mm latum, paululo convexum, sat pallide luteum, densiflorum; involucrium 18—20 mm altum, squamæ exteriores laxè reflexæ, post anthesin laxè patulæ, pallide virentes, supra glaucescentes, 12 mm longæ, 2—3 mm latæ, apice angusto, rubro; ligulæ marginales 1.5—2 mm latæ, subtus stria schistacea distincta notatæ; antheræ polliniferæ; stylus et stigmata sublutea; achenium 3 mm longum, supra medium 0.8—0.9 mm latum, apice breve et acute spinulosum, sensim in pyramidem cylindricam abiens. Cfr Acta Bot. Fenn. 17, Tab. 12, 109. — Harald Lindberg.
Tantum in Nylandia, Karelia australi et Ostrob. australi lectum est.

1475. *Taraxacum caudatulum* Dahlst.
Sectio *Vulgaria*.

Nylandia, par. Ingå, Täkter, in graminosis. 7 Jun. 1912.

leg. Harald Lindberg.

In Finlandia usque ad Ostrob. borealem dispersum. Cfr Acta Bot. Fenn., 17, Tab. 14, 112—113.

1476. *Taraxacum caudatum* Dahlst.
Sectio *Vulgaria*.

N y l a n d i a, in Horto botanico Helsingforsiae cultum. 7 Jun.
1912. Semina e Reg. Abocensi, par. Luonnonmaa,
1909, leg. Laura Högman.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1475.

1477. *Taraxacum concolor* Lindb. fil.

in Medd. Soc. p. F. et Fl. Fenn., 36, p. 5 (1910).

Sectio *Vulgaria*.

N y l a n d i a, in Horto botanico Helsingforsiae cultum. 16 Jun
1915. Semina e specim. spont. in graminosis in
Horto botanico parcissime crescentibus, 1912, leg.
Harald Lindberg.

leg. Harald Lindberg.

Folia obscure viridia, angusta, supra glabra, petiolis angustis paulo violaceis; calathidium 40—45 mm latum, planum, densiflorum, pallide luteum; involucrium post anthesin 20 mm altum; squamæ exteriores pallide virides, anguste acuminatae, apice rubro, supra glaucescentes, 11—13 mm longae, 2—3 mm latae, reflexae; squamæ intimae apice ambis paginis concolori, purpureo, extra curvato; ligulae marginales planae, angustae, 1.5—2 mm latae, in apice dentibus purpureis, subtus stria distincta griseo-violacea notatae; antherae polline carentes; stylus et stigmata brevia, lutea; achenium olivaceo-stramineum, 3 mm longum, supra medium 0.9 mm latum, in apice breve spinulosum, sensim in pyramidem cylindricam abiens. Cfr Acta Bot. Fenn., 17, Tab. 14, 115. — Harald Lindberg.

Species in Finlandia rarissima, tantum locis paucis in prov. Nylandia et Satakunta lecta est.

1478. *Taraxacum copidophyllum* Dahlst.
Sectio *Vulgaria*.

Ostrobottnia media, par. Pedersöre, Västersund, in graminosis. 17 Iun. 1913.

leg. Maja Arvonen.

In Finlandia raro usque ad Ostrob. mediam occurrit. Cfr Acta Bot. Fenn. 17, Tab. 14, 119—120.

1479. *Taraxacum crassipes* Lindb. fil.
in Acta Soc. p. F. et Fl. Fenn., 29, N:o 9, p. 37 (1908).
Sectio *Vulgaria*.

Nylandia, par. Kyrkslätt, in margine viæ ferratæ. 5 Iun. 1908.
leg. Harald Lindberg.

Planta crassa, vulgo 15—25 cm alta; folia magna, lata, pallide viridia, ambis paginis sat dense pilis articulatis vestita, petiolis foliorum exteriorum \pm alatis, viridibus vel paululo violaceis; scapi crassi; calathidium magnum, 60—70 mm latum, planum, densiflorum, sat obscure luteum; squamæ exteriores 4—7 mm latæ, 15—17 mm longæ, glauco-virides vel deinde violascentes, laxè reflexæ, apice concolori, anguste albo-marginatæ; ligulæ marginales angustæ, 2 mm latæ, canaliculatæ, subtus stria rubro-violacea notatæ, interiores fere tubulosæ; antheræ polline carentes; stylus et stigmata brevia, lutea; achenium olivaceo-stramineum, 3—3.6 mm longum, supra medium 0.9 mm latum, in apice breviter spinulosum, sat subito in pyramidem brevem, subcylindricam abiens. Cfr Acta Bot. Fenn., 17, Tab. 15, 125—126. — Harald Lindberg.

In Finlandia spontaneum et usque ad Ostrobottniam borealem dispersum, in Alandia deest.

1480. *Taraxacum crassipes* Lindb. fil.
in Acta Soc. p. F. et Fl. Fenn., 29, N:o 9, p. 37 (1908).
Sectio *Vulgaria*.

Savonia borealis, par. Jorois, Järvikylä, in prato humidiusculo. 15 Iun. 1911.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1479.

1481. *Taraxacum crebridens* Lindb. fil.

in Acta Soc. p. F. et Fl. Fenn., 29, N:o 9, p. 31 (1908).

Sectio *Vulgaria*.Regio Aboënsis, par. Lojo, ins. Jalassaari, in margine viæ
prope villulam Ekeberga. 13 Iun. 1942.

leg. Harald Lindberg.

Folia pallide viridia, tenuia, vulgo angustisecta et vulgo creberrime
dentata, in ambis paginis sat dense pilis articulatis vestita,
petiolis longis, argustis, \pm intense violaceis; calathidium 40—45
mm latum, subplarum, densiflorum; involucrium 20—24 mm
altum, pallide viride; squamæ exteriores 15 mm longæ, 2—3
mm latæ, apice curvato, rubro, sæpe \pm corniculato, laxè reflexæ,
extremæ longæ, angustissimæ; ligulæ marginales argustæ,
1.5—2 mm latæ, subtus stria violaceo-grisea rotatæ; antheræ
polliniferæ; stylus et stigmata subobscura; acherium obscure
olivaceo-stramineum, 2.5—2.7 mm longum, supra medium
0.7—0.9 mm latum, apice acute spinulosum, subito in pyra-
miden subcylindricam 0.5—0.7 mm longam, sæpe 2-spinulosam
abiers. Cfr Acta Bot. Fenn. 17, Tab. 15, 127—129. — H a -
r a l d L i n d b e r g.

Species in Finlandia rara, in prov. Reg. Aboënsi, Nylandia, Sata-
kunta, Tavastia austr., Ostrob. austr. et Savonia bor. lecta
est.

1482. *Taraxacum crebridens* Lindb. fil.

in Acta Soc. p. F. et Fl. Fenn. 29, N:o 9, p. 31 (1908).

Sectio *Vulgaria*.

Nylandia, par. Kyrkslätt, Getberg, in graminosis. 6 Iun. 1912.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1481.

1483. *Taraxacum crebridens* Lindb. fil.

in Acta Soc. p. F. et Fl. Fenn. 29, N:o 9, p. 31 (1908).

Sectio *Vulgaria*.Nylandia, par. Kyrkslätt, Österby, Tera, in graminosis. 3 Iun.
1908.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1481, 1482.

1484. Taraxacum crebridens Lindb. fil.

in Acta Soc. p. F. et Fl. Fenn. 29, N:o 9, p. 31 (1908).

Sectio *Vulgaria*.

Nylandia, in Horto botanico Helsingforsiae cultum. 19 Mai
1910. Semina ex opp. Tavastehus Tavastiae australis,
1907, leg. Harald Lindberg.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1481, 1482, 1483.

1485. Taraxacum crebridens Lindb. fil.

in Acta Soc. p. F. et Fl. Fenn., 29, N:o 9 p. 31 (1908).

Sectio *Vulgaria*.

Savonia borealis, par. Jorois, Järvikylä in prato. 17
Iun. 1911.

leg. Harald Lindberg

Cfr n. 1481, 1482, 1483, 1484.

1486. Taraxacum crispifolium Lindb. fil.

in Acta Soc. p. F. et Fl. Fenn. 29 N:o 9, p. 27 (1908).

Sectio *Vulgaria*.

Nylandia, par Kyrkslätt, Nygård in pago Österby, in prato
siccio. 10 Iun. 1907.

leg. Harald Lindberg.

Folia sat firma et nitida, marginibus distincte crispis, in ambis paginis parce pilis brevibus articulatis vestita, petiolis, praesertim in foliis exterioribus et mediis late alatis, violaceis; calathidium sat laxiflorum, c. 50 mm latum, sat pallide luteum; involucreum sat altum et angustum, 20—22 mm altum; squamæ exteriores patulae, 16—17 mm longae, 4—5 mm latae, supra pulchre glaucae; ligulae marginales 2.5 mm latae, planae, subtus stria griseo-violacea, distincta notatae; antherae polliniferae; stylus et stigmata sat obscura; achenium olivaceo-stramineum, 3.1—3.4 mm longae, supra medium 1 mm latum, apice breviter spinulosum, sat subito in pyramiden conicam 0.4—0.5 mm longam abiens. Cfr Acta Bot. Fenn., 17, Tab. 16, 130—133. — Harald Lindberg.

In Finlandia tantum in Reg. Aboënsi, Nylandia, Isthmo Karelico et Savonia boreali lectum est.

1487. Taraxacum crispifolium Lindb. fil.

in Acta Soc. p. F. et Fl. Fenn., 29, N:o 9, p. 27 (1908).

Sectio *Vulgaria*.Savonia borealis, par. Jorois, Järvikylä, in graminosis.
20 Iun. 1911.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1486.

1488. Taraxacum croceiflorum Dahlst.Sectio *Vulgaria*.Nylandia, in Horto botanico Helsingforsiae cultum. 9 Iun.
1916. Semina ex opp. Björneborg, 1910, leg. B. Flor-
ström.In Finlandia australi raro occurrit. Cfr Acta Bot. Fenn. 17, Tab.
16, 134.

conserv. Harald Lindberg.

1489. Taraxacum cuspidatum Markl.Sectio *Vulgaria*.Savonia borealis, par. Jorois, Järvikylä, in prato juxta
Rantahovi. 12 Iun. 1911.

leg. Harald Lindberg.

In Karelia Ladogensi et loco supra allato in Savonia boreali rarissime
lectum est. Cfr Acta Bot. Fenn. 17, Tab. 16, 135.**1490. Taraxacum cyanolepis** Dahlst.Sectio *Vulgaria*.Ostrobottnia media, opp. Jakobstad, in graminosis. 3
Iun. 1911.

leg. Maja Arvonen.

Perpaucis locis in Finlandia australi et media lectum est. Cfr Acta
Bot. Fenn. 17, Tab. 16, 136—137.

1491. *Taraxacum cyanolepis* Dahlst.
Sectio *Vulgaria*.

Ostrobottnia media, opp. Jakobstad, in graminosis juxta templum, 16 Jun. 1913.

leg. Maja Arvonen.

Cfr n. 1490.

1492. *Taraxacum cyanolepis* Dahlst.
Sectio *Vulgaria*.

Nylandia, in Horto botanico Helsingforsiae, in graminosis quosp.
Ab initio cultum, semina ex Ostrobottnia media.
31 Mai 1938.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1490, 1491.

1493. *Taraxacum Dahlstedtii* Lindb. fil.
in Acta Soc. p. F. et Fl. Fenn., 29, N:o 9, p. 27 (1908).
Sectio *Vulgaria*.

Nylandia, in Horto botanico Helsingforsiae, in graminosis.
2 Jun. 1908.

leg. Harald Lindberg.

Folia vulgo obtusilobata, obscure viridia, in ambis paginis sat dense pilis brevibus articulatis vestita, petiolis angustis \pm intense rubroviolaceis; calathidium primo valde convexum, deinde sat planum, 40—45(50) mm latum, densiflorum, sat obscure luteum; involucrium post anthesin 14—17 mm altum, squamæ exteriores 15—16 mm longæ, 4 mm latæ, laxè reflexæ; ligulæ marginales 1.5—2 mm latæ, deinde parte inferiore marginibus inflexis, subtus striâ griseo-violacea distincta notatæ; antheræ polliniferæ, stylus et stigmata sat obscura; achenium olivaceo-viride, 2.7—3 mm longum, in parte media 0.7 mm latum, apice breviter acute spinulosum, sensim in pyramidem cylindricam, 0.7 mm longam abiens. Cfr Acta Bot. Fenn. 17, Tab. 17, 123—140. — Harald Lindberg.

In Finlandia australi et nonnullis plagis Finlandiæ mediæ frequenter — frequentissime provenit, ad septentrionem usque ad Ostrobottniam borealem crescit.

1494. *Taraxacum Dahlstedtii* Lindb. fil.

in Acta Soc. p. F. et Fl. Fenn., 29, N:o 9, p. 27 (1908).

Sectio *Vulgaria*.

N y l a n d i a, Tvärminne, in graminosis in fundo arenoso in insula Björkskär. 13 Iun. 1907.

leg. E. Häyrén.

Cfr n. 1493.

1495. *Taraxacum distantilobum* Lindb. fil.

in Acta Soc. p. F. et Fl. Fenn., 29, N:o 9, p. 33 (1908).

Sectio *Vulgaria*.

N y l a n d i a, in Horto botanico Helsingforsiae, in graminosis. 2 Iun. 1908.

leg. Harald Lindberg.

Folia distantilobata, subglauca, mollia, in ambis paginis parce pilis brevibus, articulatis vestita, petiolis angustis, longis, pallide rubroviolaceis; calathidium valde densiflorum, c. 40 mm latum, obscure luteum; involucrium 20 mm altum, pallide viride, squamæ exteriores 12—15 mm longæ, 3 mm latæ, acutæ, supra pallide glaucescentes, anguste albo-marginatæ, apice obscure rubro, laxè reflexæ; ligulæ marginales canaliculatæ, angustæ, 1—1.5 mm latæ, subtus primo pallidæ, deinde stria schistacea sat indistincta notatæ; antheræ polliniferæ; stylus et stigmata fere pallida; achenium olivaceo-viride, 2.8—3.2 mm longum, 0.6—0.7 mm latum, angustum, apice breviter sat obtuse spinulosum, sensim in pyramidem, 0.7 mm longam, anguste cylindricam abiens. Cfr Acta Bot. Fenn. 17, Tab. 17, 144—146. — H a r a l d L i n d b e r g.

In Finlandia usque ad Ostrobottniam borealem crescit.

1496. *Taraxacum distantilobum* Lindb. fil.

in Acta Soc. p. F. et Fl. Fenn., 29, N:o 9, p. 33 (1908).

Sectio *Vulgaria*.

N y l a n d i a, par. Kyrkslätt, in graminosis siccis. 31 Mai 1908.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1495.

1497. Taraxacum duplidens Lindb. fil.

in Acta Soc. p. F. et Fl. Fenn., 29, N:o 9, p. 38 (1908).

Sectio *Vulgaria*.N y l a n d i a, in Horto botanico Helsingforsiae, in graminosis.
6 Iun. 1907.

leg. Harald Lindberg.

Folia angusta, obscure viridia, in ambis paginis parce pilis brevibus articulatis vestita, petiolis angustis \pm rubroviolaceis; calathidium planum, 35—40 mm latum, sat densiflorum, sat obscure luteum; involucreum post anthesin 18—20 mm altum, squamæ exteriores 12—15 mm longæ, 2.5—3 mm latæ, reflexæ; ligulæ marginales 2 mm latæ, subtus stria schistacea obscura, distincta notatæ; antheræ polline carentes; stylus et stigmata pallida; achenium olivaceo-viride, 2.8—3.2 mm longum, in parte superiore 0.7—1 mm latum, apice breviter spinulosum, sat subito in pyramiden anguste conicam, 0.9 mm longam abiens. Cfr Acta Bot. Fenn. 17, Tab. 18, 149—150. — H a r a l d L i n d b e r g.

In Finlandia usque ad Ostrobotniam borealem dispersum.

1498. Taraxacum duplidens Lindb. fil.

in Acta Soc. p. F. et Fl. Fenn., 29, N:o 9, p. 38 (1908).

Sectio *Vulgaria*.N y l a n d i a, in Horto botanico Helsingforsiae, in graminosis.
28 Mai 1908.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1497.

1499. Taraxacum Ekmanii Dahlst.Sectio *Vulgaria*.R e g i o A b o ò e n s i s, par. Lojo, ins. Storön, Paavola, in margine
graminoso viæ. 5 Iun. 1938.

leg. Harald Lindberg.

In Finlandia australi et media raro usque ad Savoniam borealem
crescit. Cfr Acta Bot. Fenn., 17, Tab. 18, 151—152.

1500. *Taraxacum epaeroides* Markl.Sectio *Vulgaria*.

N y l a n d i a, ins. Brändö prope urb. Helsingfors, in prato culto.
4 Iun. 1933.

leg. G. Marklund.

In Finlandia tantum in prov. Nylandia occurrit. Cfr Acta Bot.
Fenn. 17, Tab. 18, 153.

1501. *Taraxacum falciferum* Markl.Sectio *Vulgaria*.

N y l a n d i a, par Esbo, in prato culto juxta prædium Träskända
gård. 7 Iun. 1933.

leg. G. Marklund.

In Finlandia tantum in prov. Nylandia crescit. Cfr Acta Bot. Fenn.
17, Tab. 19, 159.

1502. *Taraxacum fasciatum* Dahlst.Sectio *Vulgaria*.

R e g i o A b o ò e n s i s, par. Lojo, ins. Jalassaari, in margine viæ
graminoso. 13 Iun. 1942.

leg. Harald Lindberg.

In Finlandia usque ad Ostrobottniam borealem plus minusve fre-
quenter provenit. Cfr Acta Bot. Fenn., 17, Tab. 19, 160—162.

1503. *Taraxacum fasciatum* Dahlst.Sectio *Vulgaria*.

N y l a n d i a, par. Helsinge, Malm, in graminosis juxta prædium
Träsvedja. 9 Iun. 1908.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1502.

1504. *Taraxacum Gelertii* Raunk.Sectio *Vulgaria*.

Nylandia, opp. Ekenäs, in graminosis subumbrosis. 16 Mai 1910.

leg. E. Häyrén.

In Finlandia rarissime occurrit, cum distributione occidentali, tantum in provinciis Reg. Aboëns., Nylandia et Satakunta lectum est. Cfr Acta Bot. Fenn. 17, Tab. 20, 166—167.

1505. *Taraxacum Gelertii* Raunk.Sectio *Vulgaria*.

Nylandia, opp. Ekenäs, in graminosis subumbrosis. 29 Mai 1910.

leg. E. Häyrén.

Cfr n. 1504.

1506. *Taraxacum gibberum* Markl.Sectio *Vulgaria*.

Nylandia, urb. Helsingfors, in Horto Sinebrychoff, in graminosis. 6 Iun. 1933.

leg. G. Marklund.

In Finlandia tantum in urb. Helsingfors lectum est. Cfr Acta Bot. Fenn., 17, Tab. 20, 168.

1507. *Taraxacum gibberum* Markl.

Sectio *Vulgaria*.

Nylandia, in graminosis in Horto botanico Helsingforsæ.
31 Mai 1938.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1506.

1508. *Taraxacum gracilentum* Lindb. fil.

Sectio *Vulgaria*.

Nylandia, in Horto botanico Helsingforsæ cultum. Semina
ex Imatra in Savonia australi, leg. Harald Lindberg.
19 Iun. 1916.

leg. Harald Lindberg.

Planta spontanea gracilis, 10—20 cm altum; folia angusta, mollia, in ambis paginis parce pilis brevibus articulatis vestita, petiolis angustis, rubroviolaceis; calathidium convexum, densiflorum, 30—35 mm latum, sat obscure luteum; involucrium post anthesin c. 18 mm altum; squamæ exteriores angustæ, acutæ, tenues, glaucescentes vel \pm violascentes, anguste albomarginatæ, 10—12 mm longæ, 2 mm latæ, laxè patulæ — laxè reflexæ; ligulæ marginales breves, 1.5—1.8 mm latæ, subtus stria schistacea distincta notatæ; antheræ polliniferæ; stylus et stigmata obscura; achenium olivaceo-viride, angustum, 4 mm longum, 0.8 mm latum, apice acute spinulosum, sensim in pyramiden angustam, cylindricam, sæpe 2-spirulosam, 1 mm longam abiens. Cfr Acta Bot. Fenn. 17, Tab. 20, 169—171. — Harald Lindberg.

In partibus orientalibus Finlandiæ australis et mediæ raro—rarisime crescit, tantum in prov. Nylandia (1 loc.), Karelia australi, Isthmo Karelico, Savonia australi et boreali lectum est.

1509. Taraxacum hæmatopus Lindb. fil.

in Acta Soc. p. F. et Fl. Fenn., 29, N:o 9, p. 25 (1908).

Sectio *Vulgaria*.Nylandia, in Horto botanico Helsingforsiae, in graminosis.
16 Iun. 1907 et 10 Iun. 1908.

leg. Harald Lindberg.

Folia firma, obscure viridia, fere glabra, petiolis angustis, intense rubroviolaceis; calathidium subplanum vel vulgo planum, 45—50 mm latum, laxiflorum, sat pallide luteum; involucrium post anthesin c. 20 mm altum, angustum, squamæ interiores 14 mm longæ, exteriores 12—13 mm longæ, 3—4 mm latæ, laxe patulæ, supra vulgo \pm violascentes; ligulæ marginales planæ, 2 mm latæ, subtus stria schistacea distincta notatæ; antheræ polliniferæ; stylus et stigmata sordida — sat obscura; achenium olivaceo-viride, 2.8—3.5 mm longum, in parte superiore 1 mm latum, apice breviter spinulosum, sat subito in pyramiden conicam, c. 0.5 mm longam abiens. Cfr Acta Bot. Fenn. 17, Tab. 21, 176—178. — Harald Lindberg.

In Finlandia multis locis in Reg. Aboensi et in partibus occidentalibus Nylandiæ crescit.

1510. Taraxacum hamatiforme Dahlst.Sectio *Vulgaria*.

Regio Aboënsis, par. Lojo, ins. Jalassaari, in graminosis juxta villulam Ekeberga. 8 Iun. 1933.

leg. Harald Lindberg.

In Finlandia australi et media usque ad Ostrobotniam mediam occurrit. Cfr Acta Bot. Fenn., 17, Tab. 21, 180—182.

1511. Taraxacum hamatiforme Dahlst.Sectio *Vulgaria*.

Nylandia, in Horto botanico Helsingforsiae cultum. 15 Iun. 1915.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1510.

1512. *Taraxacum hamatum* Raunk.Sectio *Vulgaria*.

Nylandia, urb. Helsingfors, Djurgården, in graminosis. 3 Iun.
1908.

leg. Harald Lindberg.

Perpaucis locis in Finlandia occidentali, usque ad Ostrobottniam
mediam crescit. Cfr Acta Bot. Fenn., 17, Tab. 22, 183—185.

1513. *Taraxacum hamatum* Raunk.Sectio *Vulgaria*.

Nylandia, in Horto botanico Helsingforsiae, in graminosis.
13 Iun. 1913.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1512.

1514. *Taraxacum Haraldii* Markl.Sectio *Vulgaria*.

Savonia borealis, par. Jorois, Järvikylä, Rantahovi, in
prato. 12 Iun. 1911.

leg. Harald Lindberg.

In Finlandia species rarissima, tantum in Nylandia et in Savonia
boreali lecta est.

1515. *Taraxacum järvikylense* Lindb. fil.
Sectio *Vulgaria*.

Savonia borealis, par. Jorois, Järvikylä, in graminosis.
10 Iun. 1911.

leg. Harald Lindberg.

Folia pallide viridia, mollia, in ambis paginis parce pilis articulatis vestita, petiolis angustis, rubroviolaceis; calathidium plarum, densiflorum, 40 mm latum, sat obscure luteum; squamæ exteriores 12 mm longæ, 3 mm latæ, sensim longe attenuatæ, virides, apice pallide rubro, reflexæ; ligulæ marginales 2 mm latæ, subtus stria distincta obscure schistacea notatæ; antheræ polliniferæ; stylus et stigmata sordida; achenium olivaceo-viride, argustum, 3.5 mm longum, 0.8—0.9 mm latum, apice spinulosum, sensim in pyramidem subcylindricam, 0.8—1.0 mm longam, sæpe 2-spinulosam abiens. Cfr Acta Bot. Fenn., 17, Tab. 23, 193—194.
— Harald Lindberg.

In Finlandia a prov. Reg. Aboëns. usque ad Ostrobottniam bor. dispersum.

1516. *Taraxacum järvikylense* Lindb. fil.
Sectio *Vulgaria*.

Savonia borealis, par. Jorois, Järvikylä, in prato. 17 Iun. 1911.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1515.

1517. *Taraxacum karelicum* Lindb. fil. & Markl.
Sectio *Vulgaria*.

Nylandia, in Horto botanico Helsingforsicæ cultum. 7 Iun. 1912.
Semina e Karelia Ladogensi, Helylä, leg. Maja Arvonen.

leg. Harald Lindberg.

In Finlandia tantum in parte austro-orientali raro occurrit. Cfr Acta Bot. Fenn., 17, Tab. 23. 195.

1518. Taraxacum kittilense Lindb. fil.

in Medd. Soc. p. F et Fl. Fenn. XXXVII, p. 35 (1910).

Sectio *Vulgaria*.Ostrobottnia Kajanensis, opp. Kajana, in graminosis.
10 Jun. 1912.

leg. Maja Arvonen.

Folia obscure viridia, mollia, acutisecta, in ambis paginis parcissime pilis articulatis, brevibus vestita, petiolis argustis \pm rubroviolaceis; calathidium subplurimum, densiflorum, 40—45 mm latum, obscure luteum; involucrium post anthesin 20 mm altum, squamæ exteriores patulæ, 11—12 mm longæ, 2—3 mm latæ, albomarginatæ, glaucescentes, apice \pm rubro; ligulæ marginales 2 mm latæ, planæ, subtus stria distincta griseo-violacea notatæ; antheræ polline carentes; stylus et stigmata obscura; achenium olivaceo-stramineum, 4.5—5 mm longum, 1 mm latum, apice sat longe et sæpe subarcuate spinulosum, sensim in pyramidem subcylindricam, 0.8 mm longam abiens. Cfr Acta Bot. Fenn., 17, Tab. 23, 196—197. — Harald Lindberg.

In Lapponia non infrequens esse indicatur; in Finlandia septentrionali quoque occurrit et usque ad 64° 12' ad meridiem versus lectum est.

1519. Taraxacum kittilense Lindb. fil.

in Medd. Soc. p. F. et Fl. Fenn. XXXVII, p. 35 (1910).

Sectio *Vulgaria*.Lapponia Kemensis, par. Muonio, in prato juxta templum.
7 Jul. 1917.

leg. J. Montell.

Cfr n. 1518.

1520. Taraxacum Kjellmanii Dahlst.Sectio *Vulgaria*.Nylandia, in Horto botanico Helsingforsiae, in graminosis.
6 Jun. 1907.

leg. Harald Lindberg.

Multis locis in Finlandia australi et media indicatum est, usque ad Ostrobottniam mediam lectum est. Cfr Acta Bot. Fenn. 17, 198—199.

1521. *Taraxacum Kjellmanii* Dahlst.Sectio *Vulgaria*.

Nylandia, in Horto botanico Helsingforsiae, in graminosis.
29 Mai 1913.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1520.

1522. *Taraxacum latisectum* Lindb. fil.

Acta Soc. p. F. et Fl. Fenn., 29, N:o 9, p. 26 (1908).

Sectio *Vulgaria*.

Nylandia, in Horto botanico Helsingforsiae, in graminosis.
7 Jun. 1908.

leg. Harald Lindberg.

Folia obscure viridia, firma, nitidula, latisecta, in ambis paginis pilis articulatis parcissime vestita, petiolis angustis vel subangustis, paululo—sat intense rubro-violaceis; calathidium convexum, 50 mm latum, sat obscure luteum; involucrium post anthesin c. 20 mm altum, squamæ exteriores 12—15 mm longæ, 3—4 mm latæ, subpatulæ, anguste albomarginatæ, supra glaucescentes; ligulæ marginales 2 mm latæ, planæ, subtus stria distincta schistacea notatæ; antheræ polliniferæ, stylus et stigmata fere lutea; achenium olivaceo-viride, magnum, 3.9—4.2 mm longum, 1—1.3 mm latum, apice breviter spinulosum, sat subito in pyramiden brevem, coricam, 0.4—0.5 mm longam abiens. Cfr Acta Bot. Fenn., 17, Tab. 24, 207—209. — Harald Lindberg.

In Finlandia australi raro occurrit, in Nylandia, Karelia australi, Isthmo Karelico, Savonia australi et Karelia Ladogensi lectum est.

1523. *Taraxacum latisectum* Lindb. fil.

Acta Soc. p. F. et Fl. Fenn., 29, N:o 9, p. 26 (1908).

Sectio *Vulgaria*.

Nylandia, in Horto botanico Helsingforsiae, in graminosis umbrosis. 7 Jun. 1908.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1522.

1524. *Taraxacum linguicuspis* Lindb. fil.

Medd. Soc. p. F. et Fl. Fenn., h. 35, p. 16, (1909).

Sectio *Vulgaria*.

Regio Aboënsis, par. Karislojo, ins. Storön, in pago Böle,
Niku, in prato. 7 Iun. 1918.

leg. Harald Lindberg.

Folia pallide viridia, distantilobata, linguicuspidata, in ambis pagini sat parce pilis articulatis vestita, petiolis angustis, paululo rubro-violaceis; calathidium c. 40 latum, sat obscure luteum; involu-
rum post anthesin 18—20 mm altum, squamæ exteriores angustis-
sime albomarginatæ, 3—4 mm latæ, supra glaucescentes vel ±
violascentes, laxè patulæ; ligulæ marginales 1.6—1.8 mm latæ,
planæ, subtus stria schistacea distincta notatæ; antheræ pollini-
feræ; stylus et stigmata sordidiuscula; achenium olivaceo-viride,
angustum, 3.3—3.5 mm longum, 0.8 mm latum, apice spi-
nulosum, sensim in pyramiden subcylindricam, 0.6 mm longam
abiens. Cfr Acta Bot. Fenn., 17, Tab. 25, 214—216. —
Harald Lindberg.

Species in Finlandia rara, tantum e provinciis Reg. Aboënsi, Nylandia
et Tavastia boreali notata est.

1525. *Taraxacum lingulatum* Markl.Sectio *Vulgaria*.

Nylandia, par. Kyrkslätt, Torsvik, in graminosis. 23 Iun. 1909.

leg. Harald Lindberg.

In Finlandia non lectum nisi paucis locis in Regione Aboënsi, Ny-
landia, Karelia australi, Isthmo Karelico et Satakunta. Cfr
Acta Bot. Fenn., 17, Tab. 25, 217—218.

1526. *Taraxacum litorale* Raunk.Sectio *Vulgaria*.

Regio Aboënsis, par. Lojo, Syd-Lojo, Biskopsnäs, in ne-
more. 10 Iun. 1938.

leg. Harald Lindberg.

In Alandia frequenter inveniri indicatur, ceterum in Finlandia
australi et media sat raro — raro usque ad Ostrobottniam me-
diam occurrit. Cfr Acta Bot. Fenn., 17, Tab. 26, 219—221.

1527. *Taraxacum litorale* Raunk.Sectio *Vulgaria*.

Nylandia, par. Ingå, Täkter, in graminosis. 7 Iun. 1912.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1526.

1528. *Taraxacum livonicum* Markl.Sectio *Vulgaria*.Regio Aboënsis, par. Lojo, ins. Jalassaari, in graminosis
juxta villulam Ekeberga. 1 Iun. 1918.

leg. Harald Lindberg.

In Finlandia rarum, tantum in Reg. Aboënsi, Nylandia et in Isthmo
Karellico lectum est. Cfr Acta Bot. Fenn., 17, 222- 223.**1529. *Taraxacum livonicum* Markl.**Sectio *Vulgaria*.Regio Aboënsis, par. Lojo, ins. Jalassaari, in graminosis
juxta viam prope villulam Ekeberga. 13
Iun. 1942.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1528.

1530. *Taraxacum lojoëense* Lindb. fil.
Sectio *Vulgaria*.

Regio Aboënsis, par. Lojo, in graminosis in oppidulo Lojo köping. 7 Iun. 1912.

leg. Harald Lindberg.

Folia obscure viridia, nitidiuscula, in ambis paginis parce pilis articulatis vestita, petiolis angustis, intense et obscure fusco-violeceis; calathidium 40—45 mm latum, planum, densiflorum, luteum; involucrem ante evolutionem valde obscurum, post anthesin 15—17 mm altum, squamæ exteriores laxè reflexæ, glaucescentes, 17 mm longæ, 3—4 mm latæ; ligulæ marginales 2—2.5 mm latæ, subtus stria distincta, obscure violaceo-fusca notatæ; antheræ polline carentes; stylus et stigmata valde obscura, fere nigra; achenium magnum, olivaceo-stramineum, 4—4.5 mm longum, 0.9 mm latum, apice spinulosum, sensim in pyramidem subcylindricam, 0.5—0.7 mm longam, sæpe bidentatam abiens. Cfr Acta Bot. Fenn., 17, Tab. 26, 224—225. — Harald Lindberg.

In Finlandia rarum, tantum in prov. Reg. Aboënsi et in Nylandia lectum est.

1531. *Taraxacum lojoëense* Lindb. fil.
Sectio *Vulgaria*.

Regio Aboënsis, par. Lojo, ins. Jalassaari, in margine graminoso viæ juxta villulam Ekeberga. 14 Iun. 1942.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1530.

1532. *Taraxacum lojoëense* Lindb. fil.
Sectio *Vulgaria*.

Nylandia, in Horto botanico Helsingforsicæ cultum. 8 Iun. 1915. Semina e par. Lojo, Lojo köping (7 Iun. 1912), leg. Harald Lindberg.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1530, 1531.

1533. *Taraxacum longisquameum* Lindb. fil.

in Acta Soc. p. F. et Fl. Fenn., 29, N:o 9, p. 21 (1908).

Sectio *Vulgaria*.N y l a n d i a, in Horto botanico Helsingforsiae, in graminosis fqq.
7 Iun. 1907.

leg. Harald Lindberg.

Folia obscure viridia, interlobiis brunneis, in ambis paginis parce pilis articulatis vestita, petiolis angustis, \pm rubro-violaceis; calathidium plarum — sat convexum, 45—55(60) mm latum, dorsiflorum, sat obscure luteum; involucrium viride, post anthesin 20—22 mm altum, squamæ exteriores 14—15 mm longæ, 3—4 mm latæ, patulæ, vulgo violascentes; ligulæ marginales 2 mm latæ, planæ, subtus stria distincta obscure schistacea notatæ; antheræ polliniferæ; stylus et stigmata sordidiuscula; achenium griseo-brunneum, 2.7—2.9 mm longum, in parte media 0.8 mm latum, apice spinulosum, sensim in pyramidem brevem, 3—5 mm longam, subconicam abiens. Cfr Acta Bot. Fenn., 17, Tab. 26, 226—227. — Harald Lindberg. In Firlandia ab Alandia usque ad Ostrobottniam borealem occurrit.

1534. *Taraxacum Marklundi* Palmgr.Sectio *Vulgaria*.

A l a n d i a, in prato muscoso juxta opp. Mariehamn. 7 Iun. 1911.

leg. A. Palmgren.

In Firlandia tantum in Alandia lectum est. Cfr Acta Bot. Fenn., 17, Tab. 27, 232.

1535. *Taraxacum mauranthes* Markl.Sectio *Vulgaria*.

N y l a n d i a, Helsingfors, Brändö, in prato culto. 4 Iun. 1933.

leg. G. Marklund.

In Finlandia tantum locis paucis in Nylandia lectum est. Cfr Acta Bot. Fenn., 17, Tab. 27, 233.

1536. *Taraxacum mimulum* Dahlst.Sectio *Vulgaria*.

Nylandia, par. Helsinge, Träsvedja, in graminosis. 9 Iun. 1908.

leg. Harald Lindberg.

In Finlandia in prov. Nylandia, Satakunta, Ostrobothnia australi et Tavastia boreali lectum est. Cfr Acta Bot. Fenn., 17, Tab. 27, 236.

1537. *Taraxacum mucronatum* Lindb. fil.

in Acta Soc. p. F. et Fl. Fenn., 29, N:o 9, p. 24 (1908).

Sectio *Vulgaria*.

Satakunta, par. Karkku, in graminosis prope villulam Linnais. 16 Iun. 1909.

leg. Harald Lindberg.

Folia griseo-viridia, mucronata, vulgo sat abundantior pilis articulatis vestita, petiolis angustis, \pm rubroviolaceis; calathidium paululo convexum, densiflorum, 40 mm latum, sat obscure luteum; involucrium post anthesin c. 18 mm altum, squamæ exteriores tenues, manifeste albomarginatæ, violascentes, laxè patulæ, 14—16 mm longæ, 2.5—3.5 mm latæ; ligulæ marginales 1.5—2 mm latæ, subcanaliculatæ, subtus stria rubroviolacea notatæ; antheræ abundanter polliniferæ; stylus et stigmata lutea; acherium parvum, 2.5—2.8 mm longum, 0.8 mm latum, olivaceo-viride, apice spinulosum, in pyramiden sat anguste conicam, 0.7—0.8 mm longam, sæpe bidentatam abiens. Cfr Acta Bot. Fenn., 17, Tab. 28, 237—238. — Harald Lindberg.

In Finlandia sat frequenter — frequenter usque ad Ostrobothniam borealem et prov. Kuusamo occurrit.

1538. *Taraxacum mucronatum* Lindb. fil.

in Acta Soc. p. F. et Fl. Fenn., 29, N:o 9, p. 24 (1908).

Sectio *Vulgaria*.

Savonia borealis, par. Jorois, Järvikylä, in graminosis. 10 Iun. 1911.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1537.

1539. *Taraxacum obliquilobum* Dahlst.

(*T. tortisquamum* Lindb. fil, *T. unguiculosum* Lindb. fil. & Palmgr.)
Sectio *Vulgaria*.

Savonia borealis, par. Jorois, Järvikylä, in prato. 13 Iun. 1911.

leg. Harald Lindberg.

In Firlandia ab Alandia usque ad Ostrobottniam borealem haud raro occurrit. Cfr Acta Bot. Fenn., 17, Tab. 28, 240—241.

1540. *Taraxacum obtusulum* Lindb. fil.

in Medd. Soc. p. F. et Fl. Fenn., 35, p. 21 (1909).
Sectio *Vulgaria*.

Nylandia, in Horto botanico Helsingforsiae, in graminosis. 20 Iun. 1909.

leg. Harald Lindberg.

Folia obscure viridia, obtusa, subglabra, petiolis \pm alatis, \pm rubro-violaceis; calathidium 45—50 mm latum, paululo convexum, densiflorum, pallide aureum; involucrium post anthesin c. 20 mm altum, squamæ exteriores arcte reflexæ, 15—18 mm longæ, 3—5 mm latæ; ligulæ marginales 2.5—3 mm latæ, marginibus \pm reflexis, subtus stria distincta, violaceo-grisea notatæ; antheræ polline carentes; stylus et stigmata brevia, pallide lutea; achonium olivaceo-viride, 3.6—3.8 mm longum, 1 mm latum, spinulosum, sensim in pyramidem subcylindricam, 0.6—0.8 mm longam, bidentatam abiens. Cfr Acta Bot. Fenn., 17, Tab. 28, 242. — Harald Lindberg.

In Firlandia e provinciis Reg. Aboënsi, Nylandia, Karelia australi, Savonia australi et Ostrobottnia boreali cognitum est.

1541. *Taraxacum obtusulum* Lindb. fil.

in Medd. Soc. p. F. et Fl. Fenn., 35, p. 21 (1909).
Sectio *Vulgaria*.

Nylandia, in Horto botanico Helsingforsiae, in graminosis. 30 Mai 1910.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1540.

1542. *Taraxacum obtusulum* Lindb. fil.
in Medd. Soc. p. F. et Fl. Fenn., 35, p. 21 (1909).
Sectio *Vulgaria*.

Savonia australis, par. Lappvesi, Melkiä, in prato. 5 Jun.
1908.

leg. H. Buch.

Cfr n. 1540, 1541.

1543. *Taraxacum pallidipes* Markl.
Sectio *Vulgaria*.

Nylandia, in Horto botanico Helsingforsiae, in graminosis.
8 Jun. 1937.

leg. Martta Vällä.

In Finlandia rarum, tantum in Nylandia et in Tavastia australi
crescit. Cfr Acta Bot. Fenn., 17, Tab. 29, 248.

1544. *Taraxacum pallidulum* Lindb. fil.
in Acta Soc. p. F. et Fl. Fenn., 29, N:o 9, p. 40 (1908).
Sectio *Vulgaria*.

Nylandia, in Horto botanico Helsingforsiae, in graminosis. 29
Mai 1908.

leg. Harald Lindberg.

Planta vulgo 20—25 cm alta. Folia obscure viridia, tenuia, sub-
glabra vel ambis paginis pilis articulatis parce vestita, petiolis
angustis vel anguste alatis, paululo rubro-violaceis; calathidium
convexiusculum, parvum, (25)—30—35 mm latum, densiflorum,
pallide luteum; involucrium post anthesin c. 15 mm altum,
squamae exteriores 12—13 mm longae, 2.5—3 mm latae, laxe
reflexae, post anthesin laxe patulae; ligulae marginales planae,
2 mm latae, subtus stria distincta, obscure schistacea notatae;
antherae sordidae, polline carentes; stylus et stigmata pallide
lutea, brevia; achenium olivaceo-viride, 2.7—2.9 mm longum,
0.8—0.9 mm latum, spinulosum, sat subito in pyramidem sub-
cylindricam, 0.7 mm longam, saepe bidentatam abiens. Cfr
Acta Bot. Fenn., 17, Tab. 29, 249. — Harald Lindberg.

In Finlandia raro occurrit, tantum e Reg. Aboënsi et e parte occi-
dentali Nylandiae cognitum est.

1545. *Taraxacum paradoxum* Palmgr.
Sectio *Vulgaria*.

Alandia, par. Finström, Emnäs, in prato litorali. 8 Jun. 1912.

leg. A. Palmgren.

In Finlandia raro in Alandia occurrit.

1546. *Taraxacum parvuliceps* Lindb. fil.
in Medd. Soc. p. F. et Fl. Fenn., 36, p. 5—6 (1910).
Sectio *Vulgaria*.

Satakunta, par. Eura, Nuorante, in graminosis. 15 Jun. 1909.

leg. Harald Lindberg.

Planta parva, gracilis. Folia obscure viridia, subglabra, petiolis angustis, rubro-violaceis; calathidium 25—28 mm latum, densiflorum, convexiusculum, sat obscure luteum; involucrium post anthesin 11—13 mm altum, squamæ exteriores laxè patulæ, 10—12 mm longæ, 1.5—2 mm latæ, subtus obscure virides, supra glaucescentes, apice ferrugineo, anguste attenuato, post anthesin in ambis paginis ferrugineæ; ligulæ marginales planæ vel subcanaliculatæ, 1.5—2 mm latæ, subtus stria violaceo-brunnea notatæ; antheræ polline carentes; stylus et stigmata lutea; achenium olivaceo-viride, 2.8—3.3 mm longum, 0.6—0.8 mm latum, spinulosum, sensim in pyramidem subconicam — subcylindricam, sæpe bidentatam abiens. Cfr Acta Bot. Fenn. 17, Tab. 30, 254—255. — Harald Lindberg.

In Finlandia fere tota dispersum, a Reg. Aboënsi usque ad Lapponium Kemensem occurrit.

1547. *Taraxacum pectinatiforme* Lindb. fil.
in Acta Soc. p. F. et Fl. Fenn., 29, N:o 9, p. 30 (1908).
Sectio *Vulgaria*.

Nylandia, in Horto botanico Helsingforsicæ, in graminosis fq. 10 Jun. 1907.

leg. Harald Lindberg.

Folia canoviridia, pectinatiformia, in ambis paginis parce pilis articulatis vestita, petiolis angustis, \pm rubro-violaceis; calathidium initio subconvexum, deinde planum, 50—60 mm latum, densiflorum, sat obscure luteum; involucrum post anthesin c. 20 mm altum, squamæ exteriores 16—17 mm longæ, 4.5 mm latæ, \pm arcte reflexæ, post anthesin laxè patulæ — laxè reflexæ; ligulæ marginales 2—2.5 mm latæ, planæ, subtus stria distincta, schistacea notatæ; antheræ polliniferæ; stylus et stigmata sat obscura; achenium olivaceo-viride, 3.5—4.5 mm longum, 1—1.2 mm latum, spinulosum, sat subito in pyramidem subconicam, 0.5 mm longam abiens. Cfr Acta Bot. Fenn., 17, Tab. 30, 259—260. — **H a r a l d L i n d b e r g.**
In Finlandia a Reg. Aboënsi usque ad prov. Kuusamo occurrit.

1548. Taraxacum pectinatiforme Lindb. fil.

in Acta Soc. p. F. et Fl. Fenn., 29, N:o 9, p. 30 (1908).

Sectio *Vulgaria*.

N y l a n d i a, in Horto botanico Helsingforsiaë, in graminosis fq.
29 Mai 1913.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1547.

1549. Taraxacum penicilliforme Lindb. fil.

in Acta Soc. p. F. et Fl. Fenn., 29, N:o 9, p. 36 (1908).

Sectio *Vulgaria*.

N y l a n d i a, in Horto botanico Helsingforsiaë, in graminosis. 10
Iun. 1907.

leg. Harald Lindberg.

Folia canoviridia, mollia, acutilobata, in ambis paginis pilis articulatis sat parce, in foliis interioribus in statu juvenali sat dense, vestita, petiolis, præsertim foliorum exteriorum \pm late alatis, paululo rubroviolaceis; calathidium valde convexum — fere semiglobosum, valde densiflorum, 45—50 mm latum, sat obscure luteum; involucrium post anthesin 18—20 mm altum, squamæ exteriores 15—17 mm longæ, 4 mm latæ, manifeste albomarginatæ, supra glaucescentes, laxè reflexæ; ligulæ marginales 2 mm latæ, planæ, subtus stria distincta violaceo-schistacea rotatæ; antheræ poline carentes; stylus et stigmata sordidiuscula; achenium fuscoviride, argustum, 2.8—3.5 mm longum, 0.7—0.8 mm latum, spirulosum, sensim in pyramidem subcylindricam, 0.4—0.6 mm longam abiens. Cfr Acta Bot. Fenn., 17, Tab. 30, 261—262. — Harald Lindberg.

In Finlandia a Reg. Aboënsi usque ad Ostrobottniam borealem occurrit.

1550. *Taraxacum polyodon* Dahlst.

Sectio *Vulgaria*.

Nylandia, urb. Helsingfors, in Horto Sinebrychoff, in graminosis. 18 Jun. 1909.

leg. Harald Lindberg.

In Finlandia a Reg. Aboënsi usque ad Ostrobottniam borealem raro occurrit. Cfr Acta Bot. Fenn., 17, Tab. 31, 266—270.

1551. *Taraxacum præcox* Dahlst.

Sectio *Vulgaria*.

Regio Aboënsis, par. Karislojo, ins. Storön, in graminosis juxta Niku in pago Böle. 7 Jun. 1918.

leg. Harald Lindberg.

In Finlandia tartum e Reg. Aboënsi, Nylandia, Isthmo Karelico et Ostrobottnia boreali cognitum est.

1552. *Taraxacum pulcherrimum* Lindb. fil.
in Acta Soc. p. F. et Fl. Fenn., 29, N:o 9, p. 35 (1908).
Sectio *Vulgaria*.

Nylandia, Helsingfors, Brunnsparken, in graminosis. 10 Iun.
1908.

Folia nitida, firma, crassiuscula, subglabra, patula, petiolis angustis vel \pm alatis, paululo rubroviolaceis; calathidium plarum, pallide luteum, 45—50 mm latum, non densiflorum; involucrem post arthesin 18—22 mm altum, squamæ exteriores 15—19 mm longæ, 4—7 mm latæ, supra pulchre pruinosæ, patulæ; ligulæ marginales 2.5—3 mm latæ, planæ, subtus stria distincta violaceo-schistacea rotatæ; antheræ obscuræ, polline carentes; stylus et stigmata brevia, fere pallida; acherium magnum, olivaceo-viride, c. 4 mm longum, 1.2—1.4 mm latum, breviter spinulosum, sensim in pyramidem breviter conicam, 0.3—0.4 mm longam abiers. Cfr Acta Bot. Fenn., 17, Tab. 32, 277—278.

In Finlandia raro occurrit, tantum e Nylandia, Karelia australi et Ostrobotnia Kajanensi lectum est.

1553. *Taraxacum pulchrifolium* Markl.
Sectio *Vulgaria*.

Nylandia, par. Esbo, in prato culto prope prædium Träskända gård. 7 Iun. 1933.

leg. G. Marklund.

In Finlandia tantum in prov. Nylandia raro occurrit. Cfr Acta Bot. Fenn., 17, Tab. 32, 279.

1554. *Taraxacum recurvum* Dahlst.
(*T. intricatum* Lindb. fil. in Medd. Soc. p. F. et Fl. Fenn., 36, p. 5, 1910).
Sectio *Vulgaria*.

Nylandia, par. Esbo, Alberga, in graminosis. 6 Iun. 1909.

leg. Harald Lindberg.

In tota Finlandia sat frequenter occurrit, etiam in Læpporia Kemensi lectum est. Cfr Acta Bot. Fenn., 17, Tab. 22, 190—191.

1555. *Taraxacum reflexilobum* Lindb. fil.

in Acta Soc. p. F. et Fl. Fenn., 29, N:o 9, p. 31 (1908).

Sectio *Vulgaria*.

Nylandia, in Horto botanico Helsingforsiae cultum. 13 Jun. 1908.

leg. Harald Lindberg.

Folia obscure viridia, in ambis paginis pilis articulatis sat parce, in foliis interioribus in statu juvenali dense vestita, reflexilobata, petiolis angustis, \pm rubroviolaceis; calathidium planum, 45 mm latum, non densiflorum, obscure luteum; involucrium post anthesin 20 mm altum, squamæ exteriores 12—13 mm longæ, 3 mm latæ, pallide virides, acuminatæ, apice pallide rubro, reflexæ, etiam post anthesin reflexæ; ligulæ marginales 2 mm latæ, subtus stria distincta pallide schistacea; antheræ polliniferæ; stylus et stigmata sordidiuscula; achenium olivaceo-viride, parvum, 2.5—2.8 longum, 0.8—1 mm latum, subito in pyramidem, anguste conicam, 0.5 mm longam abiens. Cfr Acta Bot. Fenn., 17, Tab. 33, 282—283. — Harald Lindberg.

In Finlandia australi et media dispersum, a Reg. Aboënsi usque ad Savoniam borealem lectum est.

1556. *Taraxacum remotijugum* Lindb. fil.

in Medd. Soc. p. F. et Fl. Fenn., 35, p. 20 (1909).

Sectio *Vulgaria*.

Satakunta, par Eura, Panelia, in graminosis. 11 Jun. 1909.

leg. Harald Lindberg.

Planta pumila. Folia obscure viridia, tenuia, distantilobata, in ambis paginis parce pilis articulatis vestita, petiolis longis, angustis, viridibus vel paululo rubroviolaceis; calathidium planum, densiflorum, (35)—40—50 mm latum, pallide luteum; involucrium post anthesin 18—20 mm altum, squamæ exteriores longæ, tortuosæ, laxè patulæ — laxè reflexæ, 18 mm longæ, 3 mm latæ, pallide virides apice rubro; ligulæ angustæ, canaliculatæ, dentibus in apice rubris, marginales 1—1.5 mm latæ, subtus stria pallide griseo-violacea notatæ; antheræ polline carentes; stylus et stigmata pallida vel sordidiuscula; achenium olivaceo-viride, 3.5—4 mm longum, 0.8 mm latum, apice spinulosum, sensim in pyramidem cylindricam, 0.5—0.7 mm longam, sæpe bidentatam abiens. Cfr Acta Bot. Fenn., 17, Tab. 33, 284—285. — Harald Lindberg.

In Lapponia et Finlandia septentrionali frequenter inveniri indicatur, usque ad provincias australes lectum est, in Alandia deest.

1557. *Taraxacum remotijugum* Lindb. fil.
in Medd. Soc. p. F. et Fl. Fenn., 35, p. 20 (1909).
Sectio *Vulgaria*.

Savonia borealis, par. Jorois, Järvikylä, in graminosis.
10 Iun. 1911.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1556.

1558. *Taraxacum retroflexum* Lindb. fil.
in Medd. Soc. p. F. et Fl. Fenn., 35, p. 18 (1909).
Sectio *Vulgaria*.

Regio Aboënsis, par Lojo, ins. Jalassaari, in graminosis
juxta villulam Ekeberga. 4 Iun. 1933.

leg. Harald Lindberg.

Folia obscure viridia, in ambis paginis parce pilis articulatis vestita vel subglabra, petiolis angustis, sat intense rubro violaceis; calathidium convexum, 55—60 mm latum, densiflorum, sat obscure luteum; involucrium post anthesin 20 mm altum, squamæ exteriores arcte reflexæ, 17—18 mm longæ, 4 mm latæ, supra pulchre glaucescentes, subito in apicem pallide rubrum abientes, anguste albo-marginatæ; ligulæ marginales 2—2.5 mm latæ, planæ, subtus stria distincta pallide violaceo-grisea notatæ; antheræ polliniferæ; stylus et stigmata sordida; achenium olivaceo-viride, 3.8—4 mm longum, 1 mm latum, spinulosum, sat subito in pyramidem cylindricam, 0.7 mm longam abiens. Cfr Acta Bot. Fenn., 17, Tab. 33, 286—288. — Harald Lindberg.

In tota fere Finlandia crescit, etiam in Lapponia Kemensi, in Alandia deest.

1559. *Taraxacum retroflexum* Lindb. fil.
in Medd. Soc. p. F. et Fl. Fenn., 35, p. 18 (1909).
Sectio *Vulgaria*.

Nylandia, in Horto botanico Helsingforsæ, in graminosis.
3 Iun. 1908.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1558.

1560. Taraxacum semiglobosum Lindb. fil.

in Acta Soc. p. F. et Fl. Fenn., 29, N:o 9, p. 33 (1908).

Sectio *Vulgaria*.N y l a n d i a, in Horto botanico Helsingforsiae, in graminosis.
19 Iun. 1909.

leg. Harald Lindberg.

Folia pallide griseo-viridia, in ambis paginis pilis articulatis parce vestita, mollia, longa, petiolis longis, argustis, pallide rubro-violaceis; calathidium valde convexum — semiglobosum, valde densiflorum, 40—45 mm latum, obscure luteum; involucrium post anthesin 20 mm altum, squamæ exteriores 13—15 mm longæ, 3—4 mm latæ, reflexæ; ligulæ marginales angustæ, fere 2 mm latæ, subtus stria distincta, violaceo grisea notatæ; antheræ polliniferæ; stylus et stigmata obscura; achenium olivaceo viride, parvum, 2.3—2.5 mm longum, 0.7 mm latum, spinulosum, subito in pyramiden cylindricam, 0.5 mm longam abiens Cfr Acta Bot. Fenn., 17, Tab. 34, 295—296. — Harald Lindberg.

Species in Finlandia rara est, in Nylandia, Satakunta et Ostrobothnia boreali lecta est.

1561. Taraxacum semiglobosum Lindb. fil.

in Acta Soc. p. F. et Fl. Fenn., 29, N:o 9, p. 33 (1908).

Sectio *Vulgaria*.

N y l a n d i a, Helsingfors, Djurgården, in graminosis. 5 Iun. 1909.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1560.

1562. Taraxacum septentrionale Dahlst.(T. *guttulatum* Lindb. fil. in Medd. Soc. p. F. et Fl. Fenn., 37, p. 35, 1911).Sectio *Vulgaria*.

S a v o n i a b o r e a l i s, par. Jorois, Järvikylä, in prato. 7 Iun. 1911.

leg. Harald Lindberg.

In tota fere Finlandia adnotatum est. Etiam in Lapponia lectum est. In Alandia deest. In nonnullis plagis inprimis Finlandiæ septentrionalis frequenter inveniri indicatur. Cfr Acta Bot. Fenn., 17, Tab. 20, 172—173.

1563. *Taraxacum septentrionale* Dahlst.

(*T. guttulatum* Lindb. fil. in Medd. Soc. p. F. et Fl. Fenn., 37, p. 35, 1911).

Sectio *Vulgaria*.

Savonia borealis, par. Jorois, Järvikylä, in prato. 17 Iun. 1911.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1562.

1564. *Taraxacum septentrionale* Dahlst.

(*T. guttulatum* Lindb. fil. in Medd. Soc. p. F. et Fl. Fenn., 37, p. 35 1911).

Sectio *Vulgaria*.

Nylandia, in Horto botanico Helsingforsiae cultum. Semina e par. Suomussalmi in Ostrobottnia Kajanensi, leg. O. Kyyhkynen. 25 Mai 1911.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1562, 1563.

1565. *Taraxacum subalatum* Lindb. fil.

Sectio *Vulgaria*.

Ostrobottnia media, par. Pedersöre, Västersund, in graminosis. 10 Iun. 1913.

leg. Maja Arvonen.

Folia pallide griseo-viridia, brevilobata, in ambis paginis parce pilis articulatis vestita, petiolis vulgo \pm alatis, viridibus vel paululo rubro-violaceis; calathidium 50—60 mm latum, subplanum, non densiflorum; involucrum post anthesin 20 mm altum, squamæ exteriores laxè reflexæ, glaucescentes, apice purpureo, 15 mm longæ, 3—4 mm latæ; ligulæ marginales planæ, 2 mm latæ, subtus stria distincta, schistacea notatæ; antheræ polliniferæ; stylus et stigmata sordida; achenium olivaceo-viride, 4—4,5 mm longum, 1 mm latum, spinulosum, in pyramidem 0.6—0.8 mm longam, subcylindricam, sæpe bidentatam abiens. Cfr Acta Bot. Fenn., 17, Tab. 35, 302. — Harald Lindberg.

In Finlandia rarum, tantum in Ostrobotnia media et loco unico in prov. Satakunta lectum est.

leg. Harald Lindberg.

1566. *Taraxacum submaculosum* Markl.

(*T. savonicum* Lindb. fil.)

Sectio *Vulgaria*.

Savonia borealis, par. Jorois, Järvikylä, in graminosis.
15 Iun. 1911.

leg. Harald Lindberg.

In orientali parte Finlandiæ multis locis occurrit. In parte occidentali rarum est. Usque ad prov. Savoniam borealem et Kareliam borealem crescit. Cfr Acta Bot. Fenn., 17, Tab. 36, 309—310.

1567. *Taraxacum submaculosum* Markl.

(*T. savonicum* Lindb. fil.)

Sectio *Vulgaria*.

Savonia borealis, par. Jorois, Järvikylä, in graminosis.
10 Iun. 1911.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1566.

1568. Taraxacum submaculosum Markl.*(T. savonicum* Lindb. fil.)Sectio *Vulgaria*.

Savonia borealis, par. Maaninka, Kinnulan hovi, in graminosis. 28 Mai 1911.

leg. O. Kyyhkynen.

Cfr n. 1566, 1567.

1569. Taraxacum subpenicilliforme Lindb. fil.Sectio *Vulgaria*.

Savonia borealis, par. Jorois, Järvikylä, in prato. 10 Jun. 1911.

leg. Harald Lindberg.

Folia obscure griseo-viridia, sat firma, in ambis paginis sat abundanter pilis articulatis vestita, petiolis argustis, sat intense rubro-violaceis, arachnoideis; calathidium 40—45 mm latum, densiflorum, pallide luteum; involucrium post anthesin 20 mm latum, squamæ exteriores \pm arcte reflexæ, virides, sensim in apicem acutum, pallide rubrum attenuatæ, 14 mm longæ, 3 mm latæ; ligulæ marginales 2 mm latæ, planæ, subtus stria distincta, schistacea notatæ; antheræ polline carentes; stylus et stigmata lutea; achenium olivaceo-viride, 3.8—4 mm longum, 0.8—1 mm latum, apice acute et sat longe spinulosum, sensim in pyramiden cylindricam, 0.5—0.7 mm longam, sæpe bidentatam abiens. Cfr Acta Bot. Fenn., 17, Tab. 36, 311—313. — Harald Lindberg.

In Finlandia e Regione Aboënsi usque ad Savoniam borealem non raro occurrit.

1570. Taraxacum Sundbergii Dahlst.Sectio *Vulgaria*.

Ostrobottnia Kajanensis, opp. Kajana, in prato juxta fluminem. 18 Jun. 1912.

leg. Maja Arvonen.

In Finlandia rarum, e Regione Aboënsi usque ad Ostrobottniam Kajanensem dispersum est. Cfr Acta Bot. Fenn., 17, Tab. 37, 315.

1571. *Taraxacum tenebricans* Dahlst.Sectio *Vulgaria*.

N y l a n d i a, in Horto botanico Helsingforsiae, in graminosis.
5 Iun. 1907.

leg. Harald Lindberg.

In Finlandia frequenter ex Alandia usque ad prov. Kuusamo provenit. Cfr Acta Bot. Fenn. 17, Tab. 37, 317—318.

1572. *Taraxacum tenebricans* Dahlst.Sectio *Vulgaria*.

N y l a n d i a, par. Ekenäs, Tvärminne by, in graminosis. 18 Iun.
1907.

leg. E. Häyrén.

Cfr n. 1571.

1573. *Taraxacum triangulare* Lindb. fil.

in Medd. Soc. p. F. et Fl. Fenn., 35, p. 19 (1909).

Sectio *Vulgaria*.

N y l a n d i a, par. Kyrkslätt, Österby, Nygård, in prato juxta
lac. Humaljärvi. 15 Iun. 1908.

leg. Harald Lindberg.

Folia obscure viridia, angusta, acutilobata, in ambis paginis parce pilis articulatis vestita vel subglabra, petiolis angustis, \pm intense rubro-violaceis; calathidium plarum, 35—42 mm latum, non densiflorum, pallide luteum, involucrium post anthesin 18—20 mm altum, squamæ exteriores arcte reflexæ, pallide virides, 13—15 mm longæ, 2—3 mm latæ, sensim longe et anguste cuspidatæ, apice fere decolori, sæpe corniculato; ligulæ marginales 1.5—2 mm latæ, planæ, subtus stria distincta, schistacea notatæ; antheræ polline carentes; stylus et stigmata sordidiuscula; achenium obscure griseo-viride, 3.4—3.6 mm longum, 0.8—1 mm latum, apice spinulis angustis, longis, acutis dense instructo, subito in pyramidem cylindricam, 1 mm longam abiers. Cfr Acta Bot. Fenn., 17, Tab. 37, 320—322. — Harald Lindberg.

In Finlandia sat frequenter occurrit, ex Alandia usque ad Östrobottniam borealem dispersum est.

1574. Taraxacum triangulare Lindb. fil.

in Medd. Soc. p. F. et Fl. Fenn., 35, p. 19 (1909).

Sectio *Vulgaria*.

S a t a k u n t a, par. Eura. Nuorante, in prato. 14 Iun. 1909.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1573.

1575. Taraxacum tumentilobum Markl.

Sectio *Vulgaria*.

R e g i o A b o e n s i s, par. Lojo, ins. Storön, in graminosis juxta
Paavola. 10 Iun. 1935.

leg. Harald Lindberg.

In Firlandia a Regione Aboënsi usque ad Tavastiam australem
dispersum est. Cfr Acta Bot. Fenn., 17, Tab. 28, 325—327.

1576. Taraxacum vitellinum Dahlst.

(*T. ostrobottnicum* Lindb. fil. in Acta bot. Fenn., 17, Tab. 29, 245—
246.)

Sectio *Vulgaria*.

N y l a n d i a, in Horto botanico Helsingforsiae cultum. 8 Iun.
1915. Semina ex Ostrobottnia bor., Uleåborg, leg.
M. E. Huuonen.

leg. Harald Lindberg.

Tantum loco uno in Nylandia et loco supra allato in Ostrob. bor.
lectum est.

1577. Taraxacum xanthostigma Lindb. fil.

in Medd. Soc. p. F. et Fl. Fenn., 36, p. 5 (1910).

Sectio *Vulgaria*.Nylandia, Helsingfors, in graminosis in Horto Sinebrychoff.
11 Iun. 1908.

leg. Harald Lindberg.

Folia obscure viridia, supra nitidiuscula, lata, subglabra, interlobiis \pm violaceo-brunneis, petiolis angustis, \pm rubroviolaceis; calathidium 45—55 mm latum, densiflorum, parum, sat pallide luteum; involucrium post anthesin 22—25 mm altum, squamæ exteriores 15 mm longæ, 4—6 mm latæ, patulæ, glaucescentes et \pm violascentes; ligulæ marginales planæ, 2—2.5 mm latæ, subtus stria distincta pallide schistacea notatæ; antheræ polliniferæ; stylus et stigmata lutea; achenium olivaceo-stramineum, magnum, 4—5 mm longum, 1—1.2 mm latum, apice spinulis brevibus et sat crassis instructo, subito in pyramidem subcylindricam, sæpe bidentatam abiers. Cfr Acta Bot. Fenn., 17, Tab. 38, 331. — Harald Lindberg.

In Finlandia australi et occidentali usque ad Ostrobotniam borealem lectum est.

1578. Hieracium macrolepideum Norrl.*(H. peleterianum* N.P.).Sect. *Pilosellina*.Karelia Ladogensis, ins. Valamo, in colle sicco. 6 Iul.
1938.

leg. Harald Lindberg.

Specimina omnia distributa ex eodem grege capta sunt. Species in Alandia frequenter crescit, etiam raro in Reg. Aboënsi, Nylandia, Karelia Ladogensi, in prov. Kuusamo et in Lapponia Kemensi occurrit.

1579. Hieracium albicans Norrl. (auctor vidit).
Sect. *Pilosellina*.

Savonia borealis, par. Jorois, Järvikylä, in declivi arenoso,
aprico. 28 Iun. 1911.

leg. Harald Lindberg.

Calathidium 32—35 mm latum, ligulæ dilute luteæ, apice sat pro-
funde laceratæ, subtus exigue rubrostriatæ, polliniferum, stig-
mata dilute lutea.

In Finlandia usque ad Ostrobottniam Kajanensem dispersum.

1580. Hieracium ambustum Norrl. (auctor vidit).
Sect. *Pilosellina*.

Savonia borealis, par. Jorois, Kanamäki, in margine viæ
in jugo pinifero. 3 Iul. 1911.

leg. Harald Lindberg.

Calathidia raro evoluta, sordide lutescentia, radiantia, sæpius quasi
deusta, ligulæ marginales remotæ et involutæ; polliniferum.
Late distributum in Finlandia australi et media usque ad Savoniam
borealem.

1581. Hieracium tenuilingua Norrl. (auctor vidit).
Sect. *Pilosellina*.

Savonia borealis, par. Jorois, Järvikylä, in declivi are-
noso, aprico. 28 Iun. 1911.

leg. Harald Lindberg.

Calathidium dilute luteum, 26 mm latum, radians, ligulæ marginales
canaliculatæ, 1.5—2 mm latæ, subtus haud vel obsoletissime
rubrostriatæ.

In Finlandia usque ad Ostrobottniam Kajanensem frequentissimum.

1582. Hieracium prasinatum Norrl. (auctor vidit).Sect. *Pilosellina*.

Savonia borealis, par. Jorois, Järvikylä, in campo arenoso, aprico. 4 Iul. 1911.

leg. Harald Lindberg.

Calathidium dilute luteum, 33 mm latum, ligulae marginales planae, 2 mm latae, subtus stria pulchra, intense colorata, longa ornata; stigmata pallide lutea; antherae polline carentes.

In Firlandia media late distributum, a Tavastia australi usque ad Ostrobotniam Kajanensem frequentissime et copiosissime occurrit.

1583. Hieracium venustum Norrl. (auctor vidit).Sect. *Pilosellina*.

Savonia borealis, par. Jorois, Järvikylä, Pirttiniemi, in betuleto. 11 Iul. 1911.

leg. Harald Lindberg.

Specimina originalia. Calathidium dilute luteum, 30 mm latum, ligulae marginales planae, 2 mm latae, subtus stria brevi ornata. Tantum loco supra allato lectum est.

1584. Hieracium deficiens Lindb. fil. n.sp.Sect. *Pilosellina*.

Kuusamo, par. Kuusamo, in prato humido in ripa fluminis Mäntyjoki. 16 Iul. 1936.

leg. Harald Lindberg.

Monocephalum (rarissime 2-cephalum), gracile, 12—30 cm altum; stiones foliis subæquantibus, pilis longis, mollibus dense et glandulis parvis parcissime vestiti; folia subprasina, teretia, concoloria, superiora acutiuscula, supra pilis longis paucis, in marginibus et subtus pilis longis numerosioribus et pilis stellatis haud dense vestita; pedunculus gracilis, virens et leviter adscendens, floccosus et pilis mollibus, patulis, 2—4 mm longis densiuscule et glandulis sparsis—densiusculis instructus, infra capitulum tomentosus, glandulis nigris confertis et pilis numerosioribus obtectus; involucrium atrum, 8—9 mm altum, sat latum, basi obtusa, lata; squamæ angustæ, sublineares, acutæ, dense glandulis nigris, sat longis et crassis et pilis sat dense vestitæ, exteriores albomarginatæ, interiores \pm late viridimarginatæ, apice viridi; calathidium dilute flavum, radiars, 25 mm latum; ligulæ marginales angustæ, 1.5 mm latæ, subcanaliculatæ, apice sat profunde laceratæ, subtus concolores vel rarius exigue rubrostriatæ; antheræ polline carentes; stigmata dilute flava.
— Harald Lindberg.

In Finlandia tantum loco supra allato lectum est.

1585. *Hieracium viridilivens* Norrl. (auctor vidit).

Sect. *Pilosellina*.

Savonia borealis, par. Jorois Järvikylä, in campo arenoso. 4 Jul. 1911.

leg. Harald Lindberg.

Calathidium dilute flavum, 29 mm latum, ligulæ marginales 2 mm latæ, stigmata flava, pollen 0.

In Isthmo Karelico, Karelia Ladogensi et Savonia boreali lectum est.

1586. *Hieracium reflexum* Norrl. (auctor vidit).

Sect. *Pilosellina*.

Savonia borealis, par. Jorois, Lapinmäki, in prato humidiusculo. 30 Jun. 1911.

leg. Harald Lindberg.

Calathidium 30 mm latum, ligulæ marginales 3 mm latæ, planæ, polliniferum.

In Nylandia, Tavastia australi et Savonia boreali lectum est.

1587. Hieracium aurosulum Norrl. (auctor vidit).
 (*Pilosella aurulenta* Norrl.)
 Sect. *Pilosellina*.

Savonia borealis, par. Jorois, in prato juxta templum.
 3 Iul. 1911.

leg. Harald Lindberg.

Calathidium dilute subaureum, 26—30 mm latum, ligulae marginales
 1.5—2 mm, canaliculatae, apice sublaceratae, pollen 0.

In Isthmo Karelico, Karelia Ladogensi et Savonia boreali lectum est

1588. Hieracium aurosulum Norrl. (auctor vidit).
 (*Pilosella aurulenta* Norrl.)
 Sect. *Pilosellina*.

Savonia borealis, par. Jorois, Lapinmäki, in prato humi-
 diusculo. 30 Iun. 1911.

leg. Harald Lindberg.

Calathidium dilute subaureum, ligulae marginales angustae, 1.5—2 mm
 latae, subcanaliculatae, apice sublaceratae, subtus rubrostriatae,
 pollen 0.

Cfr n. 1587.

1589. Hieracium auricula L.
 Sect. *Auriculina*.

Nylandia, par. Kyrkslätt, Österby, Nygård, in prato. 30 Iun.
 1907.

leg. Harald Lindberg.

In Finlandia australi frequenter occurrit, in parte media Finlandiae
 rarum.

1590. Hieracium macro-auricula Lindb. fil.
 (*H. gracilipes* Norrl. in sched., non K. Joh.)
 Sect. *Auriculina*.

N y l a n d i a, par. Kyrkslätt, in prato inter Österby et Kurk,
 una c. *H. auricula* crescens. 2 Iul 1907.

leg. Harald Lindberg.

Ab *H. auricula* L. colore calathidii obscuriore, ligulis subtus palli-
 dioribus, raro exigue rubrostriatis, stylo obscuriore differt.
 In Finlandia tantum loco supra allato lectum est.

1591. Hieracium suecicum Fr.
 var. *connectens* Norrl. (auctor vidit).
 Sect. *Auriculina*.

S a v o n i a b o r e a l i s, par. Jorois, Järvikylä, in campo gra-
 minoso. 7 Iul. 1911.

leg. Harald Lindberg.

Calathidium 25 mm latum, ligulae planae, subtus pallidiores, non
 rubrostriatae, stigmata dilute lutea, polliniferum.
 Species in Finlandia australi et media frequenter occurrit.

1592. Hieracium suecicum Fr. **hollolense* Norrl. (auctor vidit).
 Sect. *Auriculina*.

T a v a s t i a a u s t r a l i s, par. Asikkala, in prato inter Vääksy
 et lac. Päijänne. 11 Iul. 1909.

leg. Harald Lindberg.

In Tavastia australi et Savonia boreali lectum est.

1593. Hieracium subfloribundum N.P. (Norrl. vidit).
Sect. *Auriculina*.

Savonia borealis, par. Jorois, Järvikylä, in prato. 4 Iul.
1911.

leg. Harald Lindberg.

Calathidium sat obscure luteum, 25 mm latum, ligulæ marginales
planæ, subtus pallidiores, stigmata lutea, polliniferum, folia
nervo dorsali leviter stelligero.

In Finslandia media frequenter occurrit.

1594. Hieracium interruptum Norrl. (auctor vidit).
Sect. *Auriculina*.

Nylandia, par. Kyrkslätt, Smedsby, in prato Svartviksängen
juxta lac. Vitträsk. 4 Iul. 1907.

leg. Harald Lindberg.

Calathidium pallide luteum, radians, ligulæ marginales distantes,
angustæ, canaliculatæ, subtus rubrostriatæ, stigmata sordida.
In Finlandia australi dispersum.

1595. Hieracium isthmicola Norrl. (auctor vidit).
Sect. *Auriculina*.

Savonia borealis, par. Jorois, Järvikylä, in prato juxta
Rantahovi. 8 Iul. 1911.

leg. Harald Lindberg.

Calathidium luteum, 25—27 mm latum, ligulæ marginales subtus
levissime rubrostriatæ vel evittatæ, polliniferum, stigmata
sordida.

In Finlandia austro-orientali et in Savonia boreali lectum est.

1596. Hieracium isthmicola Norrl. (auctor vidit).Sect. *Auriculina*.

Savonia borealis, par Jorois, Järvikylä, in prato juxta Vihtaniemi. 4 Jul. 1911.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1595.

1597. Hieracium brachycephalum Norrl. (auctor vidit).Sect. *Auriculina*.

Savonia borealis, par. Jorois, Järvikylä, in campo graminoso. 4 Jul. 1911.

leg. Harald Lindberg.

Calathidium pallide luteum, 23—25 mm latum, ligulæ marginales subtus striâ parum distinctâ, polliferum, stigmata obscura. In Firlandia australi et media usque ad Ostrobotriam Kajansensem frequenter occurrit, in regionibus austro-occidentalibus deesse videtur.

1598. Hieracium maurochlorum Norrl. (auctor vidit).Sect. *Auriculina*.

Savonia borealis, par. Jorois, Järvikylä, in campo graminoso. 7 Jul. 1911.

leg. Harald Lindberg.

Calathidium pallide luteum, 25 mm latum, ligulæ marginales planæ, 2 mm latæ, sparse polliferum, stigmata obscura. In Tavastia australi et Savonia boreali lectum est.

1599. Hieracium fennicum Norrl. (auctor vidit).
Sect. *Auriculina*.

N y l a n d i a, par. Kyrkslätt, Smedsby, in prato Svartviksängen
juxta lac. Vitträsk. 4 Iul. 1907.

leg. Harald Lindberg.

Calathidium obscure luteum, 27—32 mm latum, ligulæ marginales
planæ, 2.5 mm latæ, stigmata obscura.

In Finlandia a Nylandia et Karelia australi usque ad Ostrobotniam
dispersum.

1600. Hieracium fennicum Norrl. (auctor vidit).
Sect. *Auriculina*.

S a v o n i a b o r e a l i s, par. Jorois, Järvikylä, in prato. 4 Iul.
1911.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1599.

1601. Hieracium subpratense Norrl. (auctor vidit).
Sect. *Auriculina*.

N y l a n d i a, par. Kyrkslätt, Österby, in prato. 12 Iul. 1907.

leg. Harald Lindberg.

Calathidium læte dilute luteum, 27 mm latum, ligulæ marginales
latæ, subtus rubrostriatæ, stigmata colore floscolorum.

In Finlandia australi usque ad Savoniam borealem occurrit.

1602. Hieracium subpulvinatum Norrl. (auctor vidit).
Sect. *Auriculina*.

S a v o n i a b o r e a l i s, par. Jorois, Järvikylä, in prato juxta
Rantahovi. 8 Iul. 1911.

leg. Harald Lindberg.

Calathidium obscure luteum, 25 mm latum, ligulæ marginales planæ
vel subcanaliculatæ, estriatæ, stigmata sat obscura.

In Karelia australi et Savonia boreali lectum est.

1603. Hieracium phaeostigma Norrl. (auctor vidit).Sect. *Auriculina*.

N y l a n d i a, par. Kyrkslätt, Österby, in prato juxta lac. Humaljärvi. 30 Iun. 1907.

leg. Harald Lindberg.

Calathidium sat obscure luteum, ligulae marginales exigue rubro-striatae, stigmata nigricantia.

In Reg. Aboënsi, Nylandia et Tavastia australi lectum est.

1604. Hieracium ladogense Norrl. (auctor vidit).Sect. *Auriculina*.

S a v o n i a b o r e a l i s, par. Jorois, Järvikylä, in prato. 7 Iul. 1911.

leg. Harald Lindberg.

In Karelia australi, Karelia Ladogensi, Savonia boreali et Karelia boreali lectum est.

1605. Hieracium pseudo-Blyttii Norrl. (auctor vidit).Sect. *Auriculina: Blyttiana*.

S a v o n i a b o r e a l i s, par. Jorois, Järvikylä, in campo graminoso. 13 Iul. 1911.

leg. Harald Lindberg.

In parte orientali et media Finlandiae usque ad Ostrobottniam borealem et Kajanensem occurrit, in parte austro-occidentali non crescit.

1606. Hieracium pseudo-Blyttii Norrl. (auctor vidit).Sect. *Auriculina*: *Blyttiana*.Savonia borealis, par. Jorois, Järvikylä, in prato. 30
Iun. 1911.

leg. Harald Lindberg.

Calathidium 22 mm latum, parce polliniferum.
Cfr n. 1605.**1607. Hieracium Sælandi** Norrl. (auctor vidit).Sect. *Auriculina*: *Blyttiana*.Savonia borealis, par. Jorois, Järvikylä, in prato humido.
9 Iul. 1911.

leg. Harald Lindberg.

Per totam Finlandiam centralem, a Nylandia usque ad Ostrobott-
niam borealem et Kajanensem, dispersum.**1608. Hieracium æruginascens** Norrl.Sect. *Auriculina*: *Blyttiana*.Isthmus Karelicus, par. Valkjärvi, pag. Nousiala, in
margine fossæ in prato. 3 Iul. 1934.

leg. Harald Lindberg.

Calathidium obscure luteum, 20—22 mm latum, ligulæ marginales
planæ, subtus lateritiæ.Tantum in Finlandia austro-orientali occurrit, in Isthmo Karelico
et Karelia Ladogensi lectum est.

1609. Hieracium pratense Tausch (Norrl. vidit).
(*H. dimorphum* Norrl. olim).

Nylandia, par. Kyrkslätt, Smedsby, in prato Svartviksängen
juxta lac. Vitträsk. 4 Iul. 1907.

leg. Harald Lindberg.

Calathidium obscure luteum, 20 mm latum, stigmata obscura.
In Finlandia australi et media, partes maxime occidentales exceptas,
frequenter obvium.

1610. Hieracium pratense Tausch.
(*H. dimorphum* Norrl. olim).

Karelia Ladogensis, par. Salmi, ins. Lunkulansaari, Pöllä,
in margine fossæ in agro. 14 Iul. 1938.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1609.

1611. Hieracium pericaustum Norrl. (auctor vidit).
Auriculina: H. Norrlinii N. et P.

Tavastia australis, par. Asikkala, in prato humido juxta
lac. Vesijärvi, prope villulam Ainola
in pago Vääksey. 11 Iul. 1909.

leg. Harald Lindberg.

Tantum in Tavastia australi lectum est.

1612. Hieracium pericaustum Norrl. (auctor vidit).
Sect. Auriculina: H. Norrlinii N. et P.

Tavastia australis, par. Asikkala, in prato sicco juxta
lac. Vesijärvi, prope villulam Ainola
in pago Vääksey. 11 Iul. 1909.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1611.

1613. Hieracium dimorphoides Norrl.Sect. *Auriculina*: *H. Norrlinii* N. et P.

S a t a k u n t a, par. Suoniemi, in prato. 30 Iun. 1917.

leg. O. Meurman.

In Finlandia media crescit.

1614. Hieracium insolens Norrl. (auctor vidit).Sect. *Præaltina*.N y l a n d i a, par. Kyrkslätt, Smedsby, in colle betulifero. 4 Iul.
1907.

leg. Harald Lindberg.

Calathidium pallide luteum, 14—15 mm latum, densiflorum, ligulæ
marginales planæ.

Tantum in par. Lojo Reg. Aboënsis et in par. Kyrkslätt lectum est.

1615. Hieracium septentrionale Norrl. (auctor vidit).Sect. *Præaltina*.N y l a n d i a, par. Kyrkslätt, pag. Österby, Tera, loco sicco. 5
Iul. 1907.

leg. Harald Lindberg.

Calathidium obscure luteum, 18—20 mm latum, ligulæ valde tubulosæ.

In Finlandia australi et media dispersum, in Alandia deest.

1616. Hieracium tenebricans Norrl. (auctor vidit).Sect. *Præaltina*.

N y l a n d i a, par. Kyrkslätt, Vohls, loco sicco. 7 Iul. 1907.

leg. Harald Lindberg.

Calathidium luteum, 15 mm latum, ligulæ tubulosæ, stigmata obscura.
In Finlandia australi et media dispersum.

1617. Hieracium tenebricans Norrl. (auctor vidit).
Sect. *Præaltina*.

Savonia borealis, par. Jorois, in prato sicco juxta templum.
3 Jul. 1911.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1616.

1618. Hieracium coracodes Norrl.
Sect. *Præaltina*.

Isthmus Karelicus, par. Valkjärvi, in prato sicco juxta
apothecam. 29 Jun. 1934.

leg. Harald Lindberg.

Calathium pallide luteum, 20—24 mm latum, ligulæ tubulosæ apicibus
dentium atroviridibus, stigmata obscura.

Tantum in Isthmo Karelco rarissime lectum est.

1619. Hieracium degeroeëense Sælan, Norrl.
Sect. *Præaltina*.

Isthmus Karelicus, par. Valkjärvi, Pähkinämäki, in declivi
graminoso, sicco. 25 Jun. 1934.

leg. Harald Lindberg.

Ligulæ marginales apicem versus \pm rubro vittatæ, tubulosæ, stigmata
fere pallida.

Tantum loco supra allato et juxta Helsingforsiam lectum est.

1620. Hieracium farreum Norrl. (auctor vidit).
Sect. *Præaltina*.

Savonia borealis, par. Jorois, Järvikylä, in prato sicco.
8 Jul. 1911.

leg. Harald Lindberg.

Calathidium sat obscure luteum, 20 mm latum, ligulæ $\frac{1}{2}$ -tubulosæ.
In Finlandia austro-orientali raro crescit, etiam in Savonia boreali
et Karelia boreali lectum est.

1621 a. Hieracium fruticulescens Norrl.Sect. *Præaltina*.

Regio Aboënsis, par. Lojo, ins. Jalassaari, in margine fossæ
in agro. 8 Iul. 1916.

leg. Harald Lindberg.

Ligulæ planæ.

In Finlandia australi et media locis paucis crescit.

1621 b. Hieracium fruticulescens Norrl.Sect. *Præaltina*.

Regio Aboënsis, par Lojo, ins. Jalassaari, in margine fossæ
in agro prope villulam Ekeberga. 19 Iun.
1943.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1621 a.

1622. Hieracium assimilatum Norrl., forma.Sect. *Præaltina*.

Karelia Ladogensis, Sortavala, in margine fossæ in prato
juxta Seminarium. 8 Iul. 1938.

leg. Harald Lindberg.

Species etiam in Finlandia media raro occurrit.

1623. Hieracium abundans Lindb. fil. n.sp.Sect. *Præaltina*.

Isthmus Karelicus, par. Valkjärvi, in prato sicco juxta
apothecam. 29 Iun. 1934.

leg. Harald Lindberg.

A formis ceteris sectionis *Præaltina* in Finlandia crescentibus optime foliis subtus \pm dense pilis stelligeris vestitis differt. Cæulis sat crassus, basi violaceus, parce et breviter pilosus, sat dense — dense stelligerus, superne parce glandulis nigris vestitus, folia glauco-viridia, argusta, acutiuscula, supra subglabra, subtus stelligera, folia caulina subtus abunde stelligera; anthela sat densa, ramis stelligeris et pallide glandulosis, epilosis vel parcissime pilosis; involucra 7 mm alta, squamæ obtusiusculæ, stelligeræ, glandulis subluteis vestitæ, epilosæ vel parcissime pilosæ; ligulæ planæ, luteæ, subtus estriatæ, apice \pm laceratæ; stigmata lutea. — Harald Lindberg.

In Finlandia tantum loco supra allato lectum est.

1624. Hieracium tonsile Brenn.

Sect. *Præaltina*.

Regio Aboënsis, par. Lojo, ins. Storön, Paavola, in declivi arenoso, sicco. 4 Jul. 1916.

leg. Harald Lindberg.

In Regione Aboënsi et Nylandia rarissime crescit.

1625. Hieracium tonsile Brenn.

Sect. *Præaltina*.

Regio Aboënsis, par. Lojo, ins. Storön, Paavola, in declivi arenoso, sicco. 6 Jul. 1941.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1624.

1626. Hieracium cyrtophyllum Norrl. (auctor vidit).

Sect. *Præaltina*, *H. Zizianum*.

Savonia borealis, par. Jorois, Frugård, in campo sicco. 14 Jul. 1911.

leg. Harald Lindberg.

In Finlandia media et orientali raro occurrit.

1627. Hieracium cyrtophyllum Norrl.Sect. *Præaltina*, *H. Zizianum*.Savonia borealis, par. Jorois, Järvikylä, in campo sicco.
9 Iul. 1911.

leg. Harald Lindberg.

Calathidium pallide luteum, 25 mm latum, polliniferum.
Cfr n. 1626.**1628. Hieracium incrassatiforme** Norrl.Sect. *Præaltina*, *H. Zizianum*.Isthmus Karelicus, par. Metsäpirtti, in declivi arenoso
juxta flum. Taipaleenjoki. 2 Iul. 1934.

leg. Harald Lindberg.

In orientali parte Finlandiæ australis et in Finlandia media raro
crescit.**1629. Hieracium incrassatiforme** Norrl. (auctor vidit).Sect. *Præaltina*, *H. Zizianum*.Savonia borealis, par. Jorois, Järvikylä, Pirttiniemi, in
campo sicco, arenoso. 11 Iul. 1911.

leg. Harald Lindberg.

Calathidium pallide luteum, 17—18 mm latum, ligulæ marginales
planæ, polliniferum.
Cfr n. 1628.**1630. Hieracium apricans** Norrl. (auctor vidit).Sect. *Præaltina*, *H. Zizianum*.Savonia borealis, par. Jorois, Järvikylä, loco arenoso in
betuleto. 14 Iul. 1911.

leg. Harald Lindberg.

Calathidium sat obscure luteum, 17 mm latum, ligulæ distantes,
polliniferum.
In Tavastia boreali et Savonia boreali raro crescit.

1631. Hieracium subcurvescens Norrl.Sect. *Cymosina*, *H. curvescens*.

Regio Aboënsis, par. Lojo, ins. Jalassaari, in prato juxta
villulam Ekeberga. 3 Jul. 1916.

leg. Harald Lindberg.

Calathidium sat obscurum, 16 mm latum, ligulæ laceratæ, stigmata
concoloria.

In Reg. Aboënsi, Nylandia et Tavastia australi occurrit.

1632. Hieracium subcurvescens Norrl. (auctor vidit).Sect. *Cymosina*, *H. curvescens*.

Nylandia, par. Kyrkslätt, Österby, Nygård, in prato. 1 Jul.
1907.

leg. Harald Lindberg.

Calathidium sat obscure luteum, 15—17 mm latum, ligulæ laceratæ.
Cfr n. 1631.

1633. Hieracium subcurvescens Norrl.***procurrens** Norrl. (auctor vidit).Sect. *Cymosina*, *H. curvescens*.

Nylandia, par. Kyrkslätt, Österby, Tera, in prato. 7 Jul. 1907.

leg. Harald Lindberg.

Calathidium sat obscure luteum, 20 mm latum, ligulæ laceratæ.

In Reg. Aboënsi et Nylandia raro occurrit.

1634. Hieracium subcurvescens Norrl.***barbaticeps** Norrl.Sect. *Cymosina*, *H. curvescens*.

Nylandia, par. Ekenäs, Tvärminne, in prato in pag. Tvärminne
by. 5 Jul. 1925.

leg. Harald Lindberg.

Loc. class. In Reg. Aboënsi et Nylandia occidentali raro crescit.

1635. Hieracium subcurvescens Norrl.
***barbaticeps** Norrl.

Sect. *Cymosina*, *H. curvescens*.

N y l a n d i a, opp. Ekenäs, in arenosis juxta viam ferrariam.
11 Iul. 1942.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1634.

1636. Hieracium juncicaule Norrl. (auctor vidit).
(*H. umbelliflorum* N.P., teste Zahn)
Sect. *Cymosina*, *H. glomeratum*.

N y l a n d i a, par. Kyrkslätt, Kurk, in prato. 3 Iul. 1907.

leg. Harald Lindberg.

In Finlandia austro-occidentali dispersum.

1637. Hieracium juncicaule Norrl. (auctor vidit).
(*H. umbelliflorum* N.P. teste Zahn)
Sect. *Cymosina*, *H. glomeratum*.

N y l a n d i a, par. Kyrkslätt, Österby, Tera, in prato. 5 Iul. 1907.

leg. Harald Lindberg.

Calathidium pallide luteum, 15—17 mm latum.
Cfr n. 1636.

1638. Hieracium Haraldii Norrl. (auctor vidit)
Sect. *Cymosina*, *H. glomeratum*.

S a v o n i a b o r e a l i s, par. Jorois, Järvikylä, in prato. 12 Iul.
1911.

leg. Harald Lindberg.

In Finlandia orientali occurrit, in Karelia Ladogensi, Savonia boreali
et Karelia boreali lectum est.

1639. Hieracium tonsilingua Norrl.Sect. *Cymosina*, *H. glomeratum*.

Regio Aboënsis, par. Lojo, ins. Storön, Paavola, in colle
graminoso. 4 Iul. 1916.

leg. Harald Lindberg

Tantum in par. Lojo lectum est.

1640. Hieracium griseum Norrl.Sect. *Cymosina*, *H. glomeratum*.

Regio Aboënsis, par. Lojo, ins. Jalassaari, in colle sicco
graminoso. 3 Iul. 1916.

leg. Harald Lindberg.

Calathidium sat dilute luteum, 15 mm latum, ligulæ marginales
planæ, stigmata concoloria, abunde polliferum. Forma pilis
brevioribus.

In Reg. Aboënsi, Nylandia, Isthmo Karelico et Tavastia australi
lectum est.

1641. Hieracium griseum Norrl.Sect. *Cymosina*, *H. glomeratum*.

Regio Aboënsis, par. Lojo, ins. Jalassaari, in margine fossæ
in prato sicco. 6 Iul. 1916.

leg. Harald Lindberg.

Calathidium sat dilute luteum, 20 mm latum, ligulæ marginales
planæ. Forma pilis longioribus.

Cfr n. 1640.

1642. Hieracium griseum Norrl. (auctor vidit).Sect. *Cymosina*, *H. glomeratum*.

Nylandia, par. Kyrkslätt, Getberg, in prato. 13 Iul. 1912.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1640, 1641.

1643. Hieracium griseum Norrl. (auctor vidit).Sect. *Cymosina*, *H. glomeratum*.Tavastia australis, par. Asikkala, in prato juxta lac.
Vesijärvi. 11 Jul. 1909.

leg Harald Lindberg.

Cfr n. 1640, 1641, 1642.

1644. Hieracium griseum Norrl., forma.Sect. *Cymosina*, *H. glomeratum*.

Isthmus Karelicus, par. Valkjärvi, in prato juxta stationem viæ ferrariæ. 29 Jun. 1934.

leg. Harald Lindberg.

Calathidium sat dilute luteum, 18 mm latum, ligulæ marginales
planæ, stigmata concoloria. Forma pilis in anthela nigris,
numerosioribus.

Cfr. 1640, 1641, 1642, 1643.

1645. Hieracium griseum Norrl.***oppletiforme** Norrl. (auctor vidit).Sect. *Cymosina*, *H. glomeratum*.Savonia borealis, par. Jorois, Järvikylä, loco sicco. 9
Jul. 1911.

leg. Harald Lindberg.

Calathidium pallide luteum, 18 mm latum, ligulæ marginales sat
laceratæ, polliniferum.

Tantum in Savonia boreali lectum est.

1646. Hieracium griseum Norrl.
 ***oppletiforme** Norrl. (auctor vidit).
 Sect. *Cymosina*, *H. glomeratum*.

Savonia borealis, par. Jorois, Lapinmäki, in colle sicco,
 graminoso. 7 Iul. 1911.

leg. Harald Lindberg.

Calathidium pallide luteum, 18 mm latum, ligulae marginales sat
 laceratae, polliniferum.

Cfr n. 1645.

1647. Hieracium vitellinum Norrl.
 f. *subepilosum* n.f.
 Sect. *Cymosina*, *H. glomeratum*.

Karelia Ladogensis, par. Salmi, ins. Lunkulansaari, Pöllä,
 in margine fossae in prato. 14 Iul.
 1938.

leg. Harald Lindberg.

A forma typica anthela fere epilosa, glandulis longioribus crassiori-
 busque differt.

Species tantum in Karelia orientali, Karelia Ladogensi et in Isthmo
 Karelico lectum est.

1648. Hieracium detonsum Norrl. (auctor vidit).
 Sect. *Cymosina*, *H. glomeratum*.

Tavastia australis, par. Asikkala, in prato juxta canalem
 Vesijärvi. 11 Iul. 1909.

leg. Harald Lindberg.

In tota fere Finlandia frequenter occurrit, in Alandia et in Lapponia
 deest.

1649. Hieracium detonsum Norrl.Sect. *Cymosina*, *H. glomeratum*.Kuusamo, par. Kuusamo, in prato juxta flum. Kolvankijoki
prope templum. 28 Jun. 1936.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1648.

1650. Hieracium luteoglandulosum SælanSect. *Cymosina*, *H. glomeratum*.Karelia Ladogensis, par. Sortavala, in prato juxta lac.
Helmijärvi. 29 Jun. 1938.

leg. Harald Lindberg.

In Firlandia zistro orientali, in Tavastia australi et Savonia boreali
lectum est.**1651. Hieracium luteoglandulosum** Sælan (Norrl. vidit).Sect. *Cymosina*, *H. glomeratum*.Savonia borealis, par. Jorois, Lapinmäki, in colle grami-
noso. 30 Jun. 1911.

leg. Harald Lindberg.

Calathidium dilute flavum, 17—18 mm latum, ligulae marginales
planæ, stigmata concoloria, polliniferum.

Cfr n. 1650.

1652. Hieracium neglectum Norrl.Sect. *Cymosina*, *H. glomeratum*.Isthmus Karelicus, par. Valkjärvi, in prato sicco juxta
apothecam prope stationem viae fer-
ratae. 29 Jun. 1934.

leg. Harald Lindberg.

Calathidium pallide luteum, 25 mm latum, ligulae marginales planæ,
apice laceratæ, stigmata concoloria.In tota fere Firlandia frequenter occurrit, in Alandia et Lapponia
deest.

1653. Hieracium neglectum Norrl. (auctor vidit).
Sect. *Cymosina*, *H. glomeratum*.

Savonia borealis, par. Jorois, Järvikylä, in prato. 28 Iun. 1911.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1652.

1654. Hieracium neglectum Norrl. (auctor vidit).
Sect. *Cymosina*, *H. glomeratum*.

Savonia borealis, par. Jorois, Lapinmäki, in prato. 30 Iun. 1911.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1652, 1653.

1655. Hieracium suomense Norrl. (auctor vidit).
Sect. *Cymosina*, *H. pubescens*.

Savonia borealis, par. Jorois, Järvikylä, in margine fossae in agro. 12 Iul. 1911.

leg. Harald Lindberg.

In Finlandia orientali et media usque ad prov. Kuusamo frequenter crescit.

1656. Hieracium suomense Norrl.
Sect. *Cymosina*, *H. pubescens*.

Kuusamo, par. Kuusamo, in prato juxta flum. Kolvankijoki prope templum. 28 Iun. 1936.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1655.

1657. Hieracium denticuliferum Norrl. (auctor vidit).Sect. *Cymosina*, *H. pubescens*.Tavastia australis, par. Asikkala, loco graminoso juxta
canalem Vesijärvi. 10 Iul. 1907.

leg. Harald Lindberg.

Tantum in Tavastia australi et boreali lectum est.

1658. Hieracium denticuliferum Norrl. (auctor vidit).Sect. *Cymosina*, *H. pubescens*.Tavastia australis, opp. Heinola, in colle graminoso.
13 Iul. 1909.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1657.

1659. Hieracium pseudodenticuliferum Lindb. fil. n.sp.Sect. *Cymosina*, *H. pubescens*.Regio Aboënsis, par. Lojo, ins. Storön, Paavola, in colle
graminoso, sicco. 4 Iul. 1916.

leg. Harald Lindberg.

Calathidium dilute luteum, 18—22 mm latum, ligulae marginales
latae, planae, stigmata concoloria. Ab *H. denticulifero* Norrl.
(n. 1657, 1658) foliis brevioribus latioribusque, calathidiis ma-
joribus obscurioribusque, indumento in anthela obscuriore et
longiore, foliis caulinis in marginibus sat dense et longe glan-
duliferis differt. — Harald Lindberg.

Tantum loco supra allato lectum est.

1660. Hieracium firmicaule Norrl. (auctor vidit).Sect. *Cymosina*, *H. pubescens*.Savonia borealis, par. Jorois, Järvikylä, loco arenoso sicco.
30 Iun. 1911.

leg. Harald Lindberg.

Calathidium sat obscure luteum, 17 mm latum, ligulae marginales
tubulosae, polliniferum.In Finlandia media et australi sat frequenter provenit, usque ad
Ostrobothniam Kajanensem lectum est. In Alandia deest.**1661. Hieracium contractum** Norrl.Sect. *Cymosina*, *H. pubescens*.Regio Aboënsis, par. Lojo, ins. Jalassaari, in prato. 3 Iul.
1916.

leg. Harald Lindberg.

Calathidium dilute luteum, 20 mm latum, ligulae marginales valde
laceratae, stigmata concoloria, polliniferum.

In Finlandia australi et media occurrit.

1662. Hieracium contractum Norrl.Sect. *Cymosina*, *H. pubescens*.Regio Aboënsis, par. Lojo, ins. Storön, Paavola, in colle
graminoso. 6 Iul. 1941.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1661.

1663. Hieracium contractum Norrl. (auctor vidit).Sect. *Cymosina*, *H. pubescens*.Nylandia, par. Kyrkslätt, Österby, Nygård, in prato. 2 Iul.
1907.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1661, 1662.

1664. Hieracium contractum Norrl.Sect. *Cymosina*, *H. pubescens*.

Karelia Ladogensis, ins. Valamo, in prato prope monasterium. 6 Iul. 1938.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1661, 1662, 1663.

1665. Hieracium nigrans Almqu. (Norrl. vidit).Sect. *Cymosina*, *H. pubescens*.

Tavastia australis, par. Asikkala, in prato juxta canalem Vesijärvi. 11 Iul. 1909.

leg. Harald Lindberg.

In Finlandia tantum in Alandia, Reg. Aboënsi et Tavastia australi lectum est.

1666. Hieracium spectabile Norrl.Sect. *Cymosina*, *H. pubescens*.

Regio Aboënsis, par. Lojo, ins. Storön, in colle sicco juxta Paavola. 4 Iul. 1916.

leg. Harald Lindberg.

Calathidium sat obscure luteum, 14—16 mm latum, ligulæ marginales sat laceratæ.

In Finlandia australi et media usque ad Savoniam borealem obvium.

In Alandia deest.

1667. Hieracium spectabile Norrl.Sect. *Cymosina*, *H. pubescens*.

Karelia Ladogensis, ins. Valamo, in prato juxta monasterium. 6 Iul. 1938.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1666.

1668. Hieracium spectabile Norrl. (auctor vidit).Sect. *Cymosina*, *H. pubescens*.

Savonia borealis, par. Jorois, Järvikylä, in prato. 28 Jun. 1911.

leg. Harald Lindberg.

Calathidium sat obscure luteum, 13—15 mm latum, ligulæ marginales sat laceratæ, polliniferum.

Cfr n. 1666, 1667.

1669. Hieracium retractatum Norrl.Sect. *Cymosina*, *H. cymosum*.

Regio Aboënsis, par. Lojo, ins. Jalassaari, in prato juxta præd. Jalassaari. 3 Jul. 1916.

leg. Harald Lindberg.

Calathidium dilute luteum, 17—18 mm latum, stigmata concoloria. Etiam in Tavastia australi lectum est.

1670. Hieracium retractatum Norrl.Sect. *Cymosina*, *H. cymosum*.

Regio Aboënsis, par. Lojo, ins. Jalassaari, in colle sicco juxta villulam Ekeberga prope præd. Jalassaari. 29 Jun. 1941.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1669.

1671. Hieracium occultum Norrl.Sect. *Cymosina*, *H. cymosum*.

Regio Aboënsis, par. Lojo, ins. Jalassaari, in colle graminoso juxta præd. Jalassaari. 7 Jul. 1916.

leg. Harald Lindberg.

Calathidium dilute flavum, 17 mm latum, ligulæ marginales planæ, stigmata concoloria.

Etiam in par. Reso Regionis Aboënsis lectum est.

1672. Hieracium occultum Norrl.Sect. *Cymosina*, *H. cymosum*.

Regio Aboënsis, par. Lojo, ins. Jalassaari, in margine viæ
juxta prædium Jalassaari. 2 Jul. 1942.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1671.

1673. Hieracium ainolense Norrl. (auctor vidit).Sect. *Cymosina*, *H. cymosum*.

Tavastia australis, par. Asikkala, Ainola, in graminosis
siccis juxta canalem Vesijärvi. 11
Jul. 1909.

leg. Harald Lindberg.

Tantum in Tavastia australi lectum est.

1674. Hieracium litoreum Norrl.Sect. *Macranthela*.

Regio Aboënsis, par. Karis, Hållsnäs, in monte Lökberget
juxta lac. Lojosjö. 26 Jun. 1942.

leg. Harald Lindberg.

In Reg. Aboënsi, Nylandia, Karelia australi et Karelia Ladogensi
lectum est.

1675. Hieracium intercedens Lindb. fil. n.sp.*(H. spectabile* Norrl. \times *H. pilosella* L., coll. esse videtur).Sect. *Macranthela*.

K a r e l i a L a d o g e n s i s, ins. Valamo, in prato juxta monasterium, una cum *H. spectabili* (n. 1667) crescens. 6 Iul. 1938.

leg. Harald Lindberg.

Tota planta pilis 2—3 mm longis sat dense vestita. Ab *H. litoreo* Norrl. foliis longioribus angustioribusque, distante denticulatis, squamis longioribus acutioribusque, sat dense pilis stellatis vestitis, dentibus ligularum extus atroviridibus optime differt.

— Harald Lindberg.

Tantum loco supra allato lectum est.

1676. Hieracium saxifragum Fr.Sect. *Oreadea*.

A l a n d i a, par. Jomala, ins. Möckelö, loco saxoso in pineto. 20 Iul. 1943.

leg. Harald Lindberg.

In Alandia raro crescit.

1677. Hieracium saxifragum Fr.Sect. *Oreadea*.

A l a n d i a, opp. Mariehamn, Badhusparken, in rupe. 10 Iul. 1943.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1676.

1678. Hieracium bottnicum Dahlst.Sect. *Oreadea*.

R e g i o A b o e n s i s, par Lojo, ins Jalassaari, in rupestribus juxta ripam lacus, contra villulam Ekeberga. 8 Iul. 1942.

leg. Harald Lindberg.

In Finlandia austro-occidentali raro obvium.

1679. Hieracium subonosmoides Brenn.
Sect. *Oreadea*.

Regio Aboënsis, par Lojo, ins Jalassaari, Ahtiala, in colle
graminoso juxta pontem. 5 Iul. 1916.

leg. Harald Lindberg.

In Finlandia austro-occidentali raro crescit.

1680. Hieracium subonosmoides Brenn.
Sect. *Oreadea*.

Satakunta, par Birkala, in rupe schistosa prope stationem
viæ ferratæ Siuro. 28 Iun. 1910.

leg. B. Florström.

Cfr n. 1679.

1681. Hieracium subonosmoides Brenn.
forma ad var. *hypoteticum* (Norrl.) (Norrl. vidit).
Sect. *Oreadea*.

Nylandia, par. Kyrkslätt, Ingels, in rupe. 25 Iul. 1907.

leg. Harald Lindberg.

Calathidium dilute luteum, 45 mm latum, ligulæ marginales planæ,
stigmata concoloria.

Cfr n. 1679, 1680.

1682. Hieracium subonosmoides Brenn.
var. *hypoteticum* (Norrl.) (Norrl. vidit).
Sect. *Oreadea*.

Nylandia, urb. Helsingfors, Djurgården, in rupestribus. 14
Iul. 1908.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1679, 1680, 1681.

1683. Hieracium rufescens Fr.Sect. *Oreadea*.

Alandia, opp. Mariehamn, in fissuris rupium in monte Badhusberget 8 Iul. 1943.

leg. Harald Lindberg.

In Alandia sat frequenter crescit, ceteroquin raro in Finlandia austro-occidentali obvium.

1684. Hieracium pellucidum Læst.*(H. melanolepis Almqu., Norrl.)*Sect. *Vulgata*, *H. murorum*.

Alandia, in silva mixta prope opp. Mariehamn. 7 Iul. 1943.

leg. Harald Lindberg.

In Finlandia australi et media usque ad Ostrobottniam Kajanensem sat frequenter provenit.

1685. Hieracium serratifrons Almqu.Sect. *Vulgata*, *H. murorum*.

Alandia, par. Jomala, Ytternäs, in silva. 7 Iul. 1909.

leg. B. Florström.

Tantum in Alandia crescit.

1686. Hieracium serratifrons Almqu.Sect. *Vulgata*, *H. murorum*.

Alandia, opp. Mariehamn, in betuleto. 9 Iul. 1943.

leg. Harald Lindberg.

Cfr. n. 1685.

1687. Hieracium lateriflorum Norrl. (auctor vidit).
Sect. *Vulgata*, *H. murorum*.

N y l a n d i a, par. Kyrkslätt, Österby, in silva mixta, vetusta.
11 Iul. 1907.

leg. Harald Lindberg.

In Finlandia australi et media sat raro crescit.

1688. Hieracium lateriflorum Norrl. (auctor vidit).
Sect. *Vulgata*, *H. murorum*.

N y l a n d i a, par. Kyrkslätt, Kuntun juxta lac. Juusjärvi, in
prato betulifero. 16 Iul. 1908.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1687.

1689. Hieracium distractum Norrl. (auctor vidit).
Sect. *Vulgata*, *H. murorum*.

N y l a n d i a, par. Kyrkslätt, Österby, in silva mixta, vetusta.
8 Iul. 1907.

leg. Harald Lindberg.

In Finlandia australi et media obvium.

1690. Hieracium distractum Norrl.
Sect. *Vulgata*, *H. murorum*.

K a r e l i a L a d o g e n s i s, Kirjavalahi prope opp. Sortavala,
in rupe juxta viam publicam. 1 Iul.
1938.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1689.

1691. Hieracium diminuens Norrl., forma.*(H. obtextum* Dahlst.)Sect. *Vulgata*, *H. murorum*.

Kuusamo, par Kuusamo, in silva acerosa humidiuscula juxta
semitam ad Laajusvaara. 30 Iun. 1936.

leg. Harald Lindberg.

In Lapponia et in Finlandia boreali ad meridiem versus usque ad
Savoniam borealem sat frequenter provenit.

1692. Hieracium integratum Dahlst.Sect. *Vulgata*, *H. murorum*.

Alandia, opp. Mariehamn, in betuleto. 9 Iul. 1943.

leg. Harald Lindberg.

Tantum in Alandia crescit.

1693. Hieracium orbicans Almqu., Dahlst.Sect. *Vulgata*, *H. murorum*.

Alandia, opp. Mariehamn, in betuleto. 9 Iul. 1943.

leg. Harald Lindberg.

Tantum in Alandia crescit.

1694. Hieracium lepidoides K. Joh. (Norrl. vidit).Sect. *Vulgata*, *H. murorum*.

Tavastia australis, Nynäs prope opp. Heinola, in jugo
pinifero. 17 Iul. 1909.

leg. Harald Lindberg.

Per totum fere territorium dispersum.

1695. Hieracium lyratum Norrl.var. *tenuiglandulosum* (Norrl.)Sect. *Vulgata*, *H. murorum*.

K u u s a m o, par. Kuusamo, Juurikkavaara, in pineto juxta viam publicam. 26 Jun. 1936.

leg. Harald Lindberg.

In orientali parte Finlandiæ mediæ et in Karelia orientali lectum est.

1696. Hieracium tenebescens Norrl. (auctor vidit).Sect. *Vulgata*, *H. murorum*.

N y l a n d i a, par. Kyrkslätt, Österby, Tera, in coryleto. 5 Jul. 1907.

leg. Harald Lindberg.

Calathidium sat pallide luteum, 35—40 mm latum, ligulæ marginales distantes, planæ, stigmata concoloria.

Locis paucis in Nylandia lectum est.

1697. Hieracium proximum Norrl. (auctor vidit).Sect. *Vulgata*, *H. murorum*.

N y l a n d i a, par. Kyrkslätt, Smedsby, in colle betulifero juxta Svartvikstorpet. 4 Jul. 1907.

leg. Harald Lindberg.

Calathidium sat dilute luteum, 25 mm latum, ligulæ marginales planæ, stigmata fere concoloria.

Per totum fere territorium dispersum.

1698. Hieracium proximum Norrl. (auctor vidit).
Sect. *Vulgata*, *H. murorum*.

N y l a n d i a, par. Kyrkslätt, Getberg, in silva mixta. 17 Iun.
1910.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1697.

1699. Hieracium sagittatum Lindeb.
Sect. *Vulgata*, *H. murorum*.

R e g i o A b o e n s i s, par. Lojo, ins. Jalassaari, in margine silvæ
juxta villulam Ekeberga. 29 Iun. 1941.

leg. Harald Lindberg.

In Finlandia australi et media obvium.

1700. Hieracium sagittatum Lindeb. (Norrl. vidit).
Sect. *Vulgata*, *H. murorum*.

N y l a n d i a, par. Kyrkslätt, in silva inter pag. Österby et lac.
Juusjärvi. 16 Iul. 1908.

leg. Harald Lindberg.

Calathidium 40 mm latum, ligulæ marginales planæ, stigmata obscura.
Cfr n. 1699.

1701. Hieracium sagittatum Lindeb. (Norrl. vidit).
Sect. *Vulgata*, *H. murorum*.

S a v o n i a b o r e a l i s, par. Jorois, Lapinmäki, in silva. 30
Iun. 1911.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1699, 1700.

1702. Hieracium expallidiforme Dahlst.Sect. *Vulgata*, *H. murorum*.

Alandia, opp. Mariehamn, loco umbroso, humidiusculo in betuleto. 9 Iul. 1943.

leg. Harald Lindberg.

Tantum in Alandia crescit.

1703. Hieracium philanthrax Stenstr.var. *olivascens* Norrl. (auctor vidit).Sect. *Vulgata*, *H. murorum*.

Nylandia, par. Kyrkslätt, Smedsby, in prato Svartviksängen juxta lac. Vitträsk. 4 Iul. 1907.

leg. Harald Lindberg.

Calathidium 33—35 mm latum.

Tantum in Finlandia australi sat raro provenit.

1704. Hieracium psepharum Dahlst.Sect. *Vulgata*, *H. subcaesium*.

Alandia, opp. Mariehamn, Badhusparken, loco graminoso, umbroso juxta mare. 8 Iul. 1943.

leg. Harald Lindberg.

Tantum in Alandia raro crescit.

1705. Hieracium chlorellum Sælan et Norrl. (Norrl. vidit).Sect. *Vulgata*, *H. subcaesium*.

Savonia borealis, par. Jorois, Järvikylä, in pineto. 29 Iun. 1911.

leg. Harald Lindberg.

In Finlandia australi et media sat frequenter crescit.

1706. Hieracium cæsiiflorum Almqu. (Norrl. vidit).
Sect. *Vulgata*, *H. subcæsiium*.

N y l a n d i a, par. Kyrkslätt, Vohls, in silva. 1 Iul. 1907.

leg. Harald Lindberg.

Per totum fere territorium frequenter dispersum.

1707. Hieracium cæsiiflorum Almqu. (Norrl. vidit).
Sect. *Vulgata*, *H. subcæsiium*.

N y l a n d i a, par. Kyrkslätt, Sarvvik, in colle betulifero. 4 Iul.
1909.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1706.

1708. Hieracium cæsiiflorum Almqu. (Norrl. vidit).
Sect. *Vulgata*, *H. subcæsiium*.

N y l a n d i a, par. Kyrkslätt, Getberg, in silva mixta. 17 Iun. 1910.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1706, 1707.

1709. Hieracium hololoma Brenn. (Norrl. vidit).
Sect. *Vulgata*, *H. subcæsiium*.

N y l a n d i a, par. Kyrkslätt, Österby, Tera, Långnäs, in silva
mixta vetusta. 16 Iul. 1908.

leg. Harald Lindberg.

In Reg. Aboënsi, Nylandia et Tavastia australi lectum est.

1710. Hieracium hololoma Brenn.Sect. *Vulgata*, *H. subcæsiuum*.

N y l a n d i a, par. Nurmijärvi, Klaukkala, in silva. 21 Iul. 1941

leg. G. Marklund.

Cfr n. 1709.

1711. Hieracium prolixum Norrl.var. *densiglandulosum* Lindb. fil. n. var.Sect. *Vulgata*, *H. subcæsiuum*.A l a n d i a, opp. Mariehamn, in pineto in Badhusparken. 8 Iul.
1943.

leg. Harald Lindberg.

Inflorescentia tota glandulis dense—densissime vestita a forma ty-
pica differt. — H a r a l d L i n d b e r g.

Species in Alandia sat frequenter provenit.

1712. Hieracium maculosum Dahlst.Sect. *Vulgata*, *H. subcæsiuum*.

A l a n d i a, opp. Mariehamn, in betuleto. 9 Iul. 1943.

leg. Harald Lindberg.

Verisimiliter tantum in Alandia crescit.

1713. Hieracium cæsitium Norrl. (auctor vidit).Sect. *Vulgata*, *H. subcæsiuum*.

T a v a s t i a a u s t r a l i s, opp. Heinola, in pineto. 20 Iul. 1909.

leg. Harald Lindberg.

In Finlandia australi et media occurrit.

1714. Hieracium jærvikylense Norrl. et Lindb. fil.
Sect. *Vulgata*, *H. subcæsium*.

Savonia borealis, par. Jorois, Järvikylä, in pineto. 9 Jul.
1911.

leg. Harald Lindberg.

Tantum locis paucis in Tavastia australi et Savonia boreali lectum
est.

1715. Hieracium jærvikylense Norrl. et Lindb. fil.
Sect. *Vulgata*, *H. subcæsium*.

Tavastia australis, opp. Heinola, in pineto in jugo. 15
Jul. 1909.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1544.

1716. Hieracium crispans Norrl.
Sect. *Vulgata*, *H. subcæsium*.

Karelia Ladogensis, par. Sortavala, Kirjavalahi, in rupe
juxta viam publicam. 1 Jul. 1938.

leg. Harald Lindberg.

Species in Finlandia rara est, tantum in Karelia australi, Karelia
Ladogensi et Karelia boreali lectum est.

1717. Hieracium diaphanoides Lindeb.
(*H. tenebrosum* Norrl., auctor vidit).
Sect. *Vulgata*, *H. vulgata* s.str.

Nylandia, Helsingfors, Djurgården, in silva acerosa, umbrosa
juxta Alphyddan. 14 Jul. 1908.

leg. Harald Lindberg.

In Finlandia australi et media satis frequenter occurrit.

1718. Hieracium subpellucidum Norrl. (auctor vidit).
Sect. *Vulgata*, *H. vulgata* s.str.

N y l a n d i a, urb. Helsingfors, Djurgården, in silva acerosa, umbrosa juxta Alphyddan. 14 Iul. 1908.

leg. Harald Lindberg.

Per totum fere territorium frequenter provenit.

1719. Hieracium subpellucidum Norrl. (auctor vidit).
Sect. *Vulgata*, *H. vulgata* s.str.

T a v a s t i a a u s t r a l i s, opp. Heinola, in margine fossæ in agro prope Nynäs. 17 Iul. 1909.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1718.

1720. Hieracium subpellucidum Norrl.
Sect. *Vulgata*, *H. vulgata* s. str.

K a r e l i a L a d o g e n s i s, prope opp. Sortavala, in margine silvæ. 2 Iul. 1938.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1718, 1719.

1721. Hieracium subpellucidum Norrl.
Sect. *Vulgata*, *H. vulgata* s.str.

K a r e l i a L a d o g e n s i s, in colle graminoso juxta Kultamäki inter Helylä et Kirjavalahi. 28 Iul. 1938.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1718, 1719, 1720.

1722. Hieracium subaretoum Norrl.
Sect. *Vulgata*, *H. vulgata* s.str.

Kuusamo, par. Kuusamo, Paanajärvi, in caespitibus in palude
juxta fl. Mäntyjoki. 15 Iul. 1936.

leg. Harald Lindberg.

In Lapponia et Finlandia boreali satis frequenter crescit.

1723. Hieracium internatum Brenn. (Norrl. vidit).
Sect. *Vulgata*, *H. vulgata* s.str.

Nylandia, par. Kyrkslätt, Vecklax, in rupe in silva. 28 Iul.
1908.

leg. Harald Lindberg.

In par. Kyrkslätt tantum lectum est.

1724. Hieracium Silenii Norrl. (auctor vidit).
Sect. *Vulgata*, *H. vulgata* s.str.

Nylandia, par. Kyrkslätt, in silva juxta lac. Vitträsk. 8 Iul.
1907.

leg. Harald Lindberg.

In Finlandia australi et media usque ad Ostrobottniam Kajanensem
sat frequenter dispersum est.

1725. Hieracium Silenii Norrl. (auctor vidit).
Sect. *Vulgata*, *H. vulgata* s.str.

Savonia borealis, par. Jorois, Järvikylä in silva. 31 Iul.
1911.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1724.

1726. Hieracium cæsiomurorum Lindeb. (Norrl. vidit).
Sect. *Vulgata*, *H. vulgata* s.str.

N y l a n d i a, par. Kyrkslätt, Sarvvik, in margine silvæ. 2 Iul. 1909.

leg. Harald Lindberg.

In Finlandia australi et media sat raro provenit.

1727. Hieracium incurrens Sælan.
Sect. *Vulgata*, *H. vulgata* s.str.

I s t h m u s K a r e l i c u s, par. Valkjärvi, in fruticeto umbroso,
humidiusculo prope stationem viæ
ferratæ. 3 Iul. 1934.

leg. Harald Lindberg.

In Finlandia media et australi sat frequenter crescit.

1728. Hieracium adunans Norrl. (auctor vidit).
Sect. *Vulgata*, *H. vulgata* s.str.

N y l a n d i a, par. Kyrkslätt, in coryleto juxta pag. Österby, Tera.
5 Iul. 1907.

leg. Harald Lindberg.

In Finlandia australi et media sat raro occurrit.

1729. Hieracium coniops Norrl.
Sect. *Vulgata*, *H. vulgata* s.str.

K u u s a m o, par. Kuusamo, Törmänen, pag. Vuotunki, in colle
graminoso juxta lac. Luodelahti. 1 Iul. 1936.

leg. Harald Lindberg.

In Finlandia media et boreali sat frequens.

1730. Hieracium coniops Norrl. ***umbricola** Sælan
Sect. *Vulgata*, *H. vulgata* s.str.

Regio Aboënsis, par. Lojo, ins. Jalassaari, in silva in monte
contra villulam Ekeberga. 8 Iul. 1942.

leg. Harald Lindberg.

In Finlandia australi et media dispersum.

1731. Hieracium coniops Norrl. ***umbricola** Sælan (Norrl. vidit).
Sect. *Vulgata*, *H. vulgata* s.str.

Nylandia, par. Kyrkslätt, in silva juxta præd. Vohls. 14 Iul.
1907.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1730.

1732. Hieracium kuusamoëns Wainio.
Sect. *Vulgata*, *H. vulgata* s.str.

Kuusamo, par. Kuusamo, in prato betulifero, humidiusculo
prope templum. 28 Jun. 1936.

leg. Harald Lindberg.

In Finlandia boreali raro crescit.

1733. Hieracium triviale Norrl. (auctor vidit).
Sect. *Vulgata*, *H. vulgata* s.str.

Nylandia, par. Kyrkslätt, in silva acerosa prope Vohls. 14 Iul.
1907.

leg. Harald Lindberg.

In Finlandia australi et media usque ad Savoniam borealem et
Kareliam borealem frequentissime crescit.

1734. Hieracium constringens Norrl.Sect. *Vulgata*, *H. vulgata* s.str.

Alandia, opp. Mariehamn, in margine betuleti. 9 Iul. 1943.

leg. Harald Lindberg.

In Alandia sat frequenter crescit.

1735. Hieracium vicarium Norrl.Sect. *Vulgata*, *H. vulgata* s.str.Kuusamo, par. Kuusamo, in rupe Ruskeakallio in ripa lac
Paanajärvi. 18 Iul. 1936.

leg. Harald Lindberg.

Calathidium dilute luteum, 25—28 mm latum, densiflorum, non
radians.

In Lapponia etiam crescit.

1736. Hieracium galbanum Dahlst. (Norrl. vidit).Sect. *Vulgata*, *H. cæsia*.

Nylandia, par. Kyrkslätt, Vohls, in silva acerosa. 14 Iul. 1907.

leg. Harald Lindberg.

In Finlandia usque ad Kuusamo frequenter obvium.

1737. Hieracium galbanum Dahlst. (Norrl. vidit).Sect. *Vulgata*, *H. cæsia*.Savonia borealis, par. Jorois, Örnevik, in silva acerosa.
14 Iul. 1911.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1736.

1738. Hieracium cæsium Fr., Dahlst.
Sect. *Vulgata*, *H. cæsia*.

Regio Aboënsis, par. Lojo, Jalassaari, in margine silvæ
prope præd. Ahtiala. 5 Iul. 1916.

leg. Harald Lindberg.

In Finlandia australi et media usque ad Savoniam borealem.

1739. Hieracium cæsium Fr., Dahlst. (Norrl. vidit).
Sect. *Vulgata*, *H. cæsia*.

Nylandia, par. Kyrkslätt, Ingels, in margine pineti. 25 Iun.
1907.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1738.

1740. Hieracium longimanum Norrl.
(*H. læticolor* Almqu. var. *subprolixum* Dahlst.)
Sect. *Vulgata*, *H. cæsia*.

Alandia, par. Ekerö, Öra, in prato betulifero. 13 Iul. 1943.

leg. Harald Lindberg.

In Alandia sat frequenter crescit.

1741. Hieracium prolixiforme Norrl. (auctor vidit).
Sect. *Vulgata*, *H. cæsia*.

Savonia borealis, par. Jorois, Örnevik, in pineto. 14 Iul.
1911.

leg. Harald Lindberg.

In Finlandia media et boreali dispersum.

1742. Hieracium basifolium (Fr.) Almqu.
Sect. *Vulgata*, *H. cæsia*.

Regio Aboënsis, par. Lojo, in silva prope templum. 7 Iul.
1915.

leg. Harald Lindberg.

In Finlandia australi et media occurrit.

1743. Hieracium basifolium (Fr.) Almqu.
Sect. *Vulgata*, *H. cæsia*.

Regio Aboënsis, par. Lojo, in silva umbrosa prope templum.
7 Iul. 1915.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1742.

1744. Hieracium basifolium (Fr.) Almqu.
Sect. *Vulgata*, *H. cæsia*.

Karelia Ladogensis, ins. Valamo, in pineto juxta monasterium.
6 Iul. 1938.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1742, 1743.

1745. Hieracium kuopioëns Norrl.
(*H. vitiligerum* Norrl., auctor vidit).
Sect. *Vulgata*, *H. cæsia*.

Savonia borealis, par. Jorois, Kolma, in pineto. 2 Aug.
1911.

leg. Harald Lindberg.

Tantum in Savonia boreali lectum est.

1746. Hieracium imitans Brenn.Sect. *Vulgata*, *H. cæsia*.

Regio Aboënsis, par. Lojo, Hitis, in pineto. 7 Iul. 1915.

leg. Harald Lindberg.

Tantum locis paucis in Reg. Aboënsi et Nylandia lectum est.

1747. Hieracium improvisum Norrl.Sect. *Vulgata*, *H. cæsia*.Regio Aboënsis, ins. Luonnonmaa, Kähölä, Tammipelto,
in margine fossæ in agro. 15 Iul. 1907.

leg. Laura Högman.

In Reg. Aboënsi et Nylandia raro crescit.

1748. Hieracium orbolense Stenstr.Sect. *Vulgata*, *H. cæsia*.Alandia, par. Ekerö, pag. Torp, in prato in margine paludis.
16 Iul. 1943.

leg. Harald Lindberg.

In Alandia sat raro crescit.

1749. Hieracium linifolium Sælan.Sect. *Rigida*.Nylandia, opp. Ekenäs, in pineto juxta viam ad Raseborg.
12 Iul. 1942.

leg. Harald Lindberg.

Tantum in Nylandia locis nonnullis lectum est.

1750. Hieracium subobatrescens Brenn.var. *paucidentatum* Lindb. fil. n. var.Sect. *Rigida*.N y l a n d i a, par. Kyrkslätt, in rupibus juxta lac. Juusjärvi.
6 Aug. 1907.

leg. Harald Lindberg.

Foliis brevioribus, paucidentatis a forma primaria differt.

Calathidium sat pallide luteum, c. 40 mm latum, ligulae planae vel
fere planae, stigmata concoloria.*H. subobatrescens* Brenn. tantum in par. Ingå Nylandiae lectum est**1751. Hieracium crepidioides** Norrl.Sect. *Rigida*.K u u s a m o, par. Kuusamo, Rajala juxta lac. Paanajärvi. 17
Iul. 1936.

leg. Harald Lindberg.

In Lapponia et Finlandia boreali usque ad par. Suomussalmi occurrit.

1752. Hieracium turbidum Norrl.Sect. *Rigida*.K u u s a m o, par. Kuusamo, prope pagum templi, in prato juxta
fl. Kolvankijoki. 28 Iul. 1936.

leg. Harald Lindberg.

Species rarissima, in Finlandia tantum loco supra allato lecta est.

Specim. originalia in Karelia Pomorica, in insula Maris albi
lecta sunt.

1753. Hieracium savo-karelicum Norrl.Sect. *Rigida*.

K a r e l i a b o r e a l i s, par. Juuka, Ahmovaara, Halolanpää, in pineto juxta viam publicam. 1 Aug. 1942.

leg. Harald Lindberg.

In Savonia boreali et Karelia boreali crescit.

1754. Hieracium floccimarginatum Brenn.Sect. *Rigida*.

N y l a n d i a, par. Kyrkslätt, Österby, Kvarnbacken. in pineto. 22 Jul. 1908.

leg. Harald Lindberg.

Locis paucis in Nylandia lectum est.

1755. Hieracium floccimarginatum Brenn.

*Pær-Haraldii Lindb. fil. n. subsp.

Sect. *Rigida*.

K u u s a m o, par. Kuusamo, loco sicco in silva mixta inter Rajala et Paana juxta lac. Paanajärvi. 13 Jul. 1936.

legg. Pär Harald et Harald Lindberg.

Cfr n. 1754. Ab *H. floccimarginato* Brenn. calathidiis majoribus, ligulis longioribus et foliis longioribus angustioribusque differt. — H a r a l d L i n d b e r g.*H. floccimarginatum* Brenn. typicum tantum locis paucis in Nylandia lectum est.

1756. Hieracium cirsiiforme Norrl.

nomen nudum in sched. in Herb. Mus. fenn.

Sect. *Rigida*.Alandia, par. Lemland, ins. Granholmen, in rupibus apricis.
21 Iul. 1943.

leg. Harald Lindberg.

Caulis crassus, ad 80 cm altus, infra, præcipue in specim. junioribus, sat dense—dense pilosus, pilis patulis, 3 mm longis; folia, præcipue in specim. majoribus grosse dentata, dentibus 3—5, longis, sat angustis, vulgo prorsus arcuatis, ± pilosa; anthela magna, polycephala, corymbosa, pedicellis floccosis, etiam sæpe ± pilosis; involucrium atroviride, 10 mm altum, squamis glandulis atris dense vestitis, sæpe pilis paucis immixtis; calathidium sat pallide luteum, 35—40 mm latum; ligulæ paululo canaliculatae; pappus sordidus; pollen 0; stigmata sordida. — Teste A. Palmgren *H. Avæ* Dahlst. var. est. Mea sententia propria species. *H. Avæ* Dahlst. involucri dense pilosis, eglandulosis squamisque acutis differt. — Harald Lindberg. Etiam loco unico in par. Jomala Alandiæ lectum est.

1757. Hieracium cruentiferum Norrl. et Lindb. fil.Sect. *Rigida*.

Ostrobothnia media, par. Pedersöre, Pirilö. 20 Iul. 1907.

leg. Maja Arvonen.

In Finlandia media dispersum.

1758. Hieracium semiumbellatum Norrl. (auctor vidit).Sect. *Rigida*.

Savonia borealis, par. Jorois, Örnevik, in silva. 25 Iul. 1907.

leg. Harald Lindberg.

In Finlandia austro-orientali et media obvium.

1759. Hieracium subrasile Lindb. fil. n.sp.
Sect. *Rigida*.

Kuusamo, par. Kuusamo, Rajala, in declivibus graminosis juxta lac. Paanajärvi. 17 Iul. 1936.

leg. Harald Lindberg.

Folia glauca, paucidentata, folia caulina 6—8, suprema apice flexuoso, subtus \pm dense pilis stellatis vestita; anthela oligocephala, pedicelli longi, dense floccosi; involucria brevia, squamæ obscure virides, glandulis et in inferiore parte pilis stellatis sat dense vestitæ, exteriores apice subpatulo; calathidium sat saturate luteum, ligulis planis, sat laxe sitis, 30—35 mm latum; stigmata obscura. Ab *H. rasile* Norrl. involucris brevioribus obscurioribusque, squamis latioribus, densius floccosis et glandulis numerosioribus longioribusque vestitis, pappo subalbido differt. — Harald Lindberg.

Locis nonnullis in par. Kuusamo lectum est.

1760. Hieracium Lauræ Norrl.
var. *angustisquamium* Lindb. fil. n. var.
Sect. *Rigida*.

Regio Aboënsis, ins. Luonnonmaa, loco lapidoso infra montem Raakalan vuori. 29 Iul. 1907.

leg. Laura Högman.

Ab *H. Lauræ* f. typica squamis angustioribus differt.
H. Lauræ Norrl. f. typica tantum in Alandia lectum est.

1761. Hieracium mixopolium Dahlst.
Sect. *Rigida*.

Alandia, opp. Mariehamn, in rupestribus juxta viam Skillnads-gatan. 22 Iul. 1943.

leg. Harald Lindberg.

In Alandia non raro occurrit.

1762. Hieracium mixopolium Dahlst.
Sect. *Rigida*.

Alandia, par. Ekerö, in rupe in litore maris juxta pag. Torp.
17 Iul. 1943.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1761.

1763. Hieracium parviglandulosum Lindb. fil. n. sp.
Sect. *Rigida*.

Regio Aboënsis, par. Karis, Hällsnäs, in margine silvæ
mixtæ. 20 Iul. 1942.

leg. Harald Lindberg.

Aphyllopodium vel rarius phyllopodum. Caulis 60—80 cm, pilis 2 mm longis, mollibus sat parce vestitus, in parte inferiore ± violascens; folia obscure viridia, subtus et in marginibus breviter, supra brevissime pilosa, folia caulina 6—10(12), sensim decrescentia, inferioria oblonga, petiolata, subintegra vel vulgo paucidentata, dentibus 1—4, brevibus, latis, superioria subsessilia — sessilia, paucidentata, sæpe ad basin latiora; anthela corymbosa, polycephala; pedicelli floccosi tantum; involucri brevia, 8—9 mm alta, squamis obscure viridibus, angustis, acutiusculis, sat dense glandulis parvis vestitis, epilosis vel pilis solitariis, basi parce floccosa; calathidium sat obscure luteum, 35 mm latum, ligulis planis; pappus subalbidus; stigmata obscura. — Harald Lindberg.

Locis paucis in Reg. Aboënsi lectum est.

1764. Hieracium umbellatum L.
Sect. *Umbellata*.

Regio Aboënsis, par. Lojo, ins. Jalassaari, in graminosis in margine silvæ mixtæ juxta villulam Ekeberga. 26 Iul. 1943.

leg. Harald Lindberg.

In formis numerosis per totam fere Finlandiam frequenter dispersum

1765. Hieracium umbellatum L.***deustum** Lindb. fil. n. subsp.Sect. *Umbellata*.

Kuusamo, par. Kuusamo, Kauppila, in litore arenoso insulae Hietasaari in lac. Paanajärvi. 23 Iul. 1936.

leg. Harald Lindberg.

Radix plerumque caules complures emittens. Folia angusta, 6—8 cm longa, 5—7 mm lata, paucidentata; anthela oligocephala, pedicellis longis; involucria atroviridia, glabra; calathidia non evoluta, sordide lutescentia, deusta; stigmata sordida. —
Harald Lindberg.

Locis nonnullis in ripis lac. Paanajärvi, sæpe una cum *H. *chloro melano* Dahlst. (n. 1766) crescens. Semper conformis et frequens

1766. Hieracium umbellatum L.***chloromelanum** Dahlst.Sect. *Umbellata*.

Kuusamo, par. Kuusamo, Kauppila, in litore arenoso insulae Hietasaari in lac. Paanajärvi, una cum *H. umbell. *deusto* Lindb. fil. (n. 1765) crescens. 23 Iul. 1936.

leg. Harald Lindberg.

In Lapponia et in Finlandia boreali obvium.

1767. Hieracium polycomatum Zahn*(H. polycomum* Dahlst., nec N.P.)Sect. *Foliosa*.

Kuusamo, par. Kuusamo, Rajala, in colle graminoso juxta lac. Paanajärvi. 14 Iul. 1936.

leg. Harald Lindberg.

Calathidium pallide luteum, 30 mm latum, ligulae planae, laxae, pollen 0, stigmata obscura.

In Lapponia et Finlandia boreali raro occurrit.

1768. Hieracium pruiniferum Norrl.Sect. *Foliosa*.

Savonia australis, par. Lappvesi, Tillsala, in margine
fossæ in agro. 26 Iul. 1911.

leg. H. Buch.

In Finlandia austro-orientali usque ad. Kareliam borealem raro
crescit.

1769. Hieracium pruiniferum Norrl.Sect. *Foliosa*.

Karelia borealis, opp. Joensuu, in prato fertili. 30 Iul.
1942.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1768.

1770. Hieracium transgrediens Norrl. (auctor vidit).Sect. *Prenanthoidea genuina*.

Karelia Ladogensis, par. Salmi, ins. Uuksalo, in nemore.
7 Aug. 1911.

leg. Laura Wecksell.

Etiam in J. P. Norrlin, Hieracia exsiccata, Fasc. XIII, n. 99 (1912)
distributum est.

Tantum in par. Salmi lectum est.

1771. Cystopteris fragilis (L.) Bernh.var. *Dickieana* (Sim.) Moore(C. *Bænitzii* Dörf.)

Kuusamo, par. Kuusamo, Kulmakkapuro prope pag. Kauppila,
in rupe calcarea umbrosa. 25 Iul. 1936.

leg. Harald Lindberg.

In Karelia Ladogensi, Kuusamo et in Lapponia crescit.

1772. *Cystopteris fragilis* (L.) Bernh.var. *Dickieana* (Sim.) Moore(C. *Bænitzi* Dörfel.)

K u u s a m o, par. Kuusamo, Juuma, Lammasvuoma, in rupe calcarea umbrosa. 7 Jul. 1936.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1771.

1773. *Cystopteris montana* (Lam.) Bernh.

K u u s a m o, par. Kuusamo, Laajusvaara, in umbrosis juxta rivulum. 30 Jun. 1936.

leg. Harald Lindberg.

In Kuusamo et in Lapponia raro legitur.

1774. *Aspidium Robertianum* (L.) Luerssen

K u u s a m o, par. Kuusamo, Kulmakkapuro prope pag. Kauppila, in umbrosis juxta rivulum, solo calcareo. 25 Jul. 1936.

leg. Harald Lindberg.

In Kuusamo, Karelia Onegensi et Olonetsensi raro crescit.

1775. *Aspidium thelypteris* (L.) Sw.

I s t h m u s K a r e l i c u s, par. Muola, Kyyrölä, in fruticeto juxta rivulum. 15 Aug. 1936.

leg. Harald Lindberg.

In Finlandia australi et media usque ad Ostrob. Kajanensem lectum est.

1776. *Woodsia alpina* (Bolton) S. F. Gray.

Karelia Ladogensis, par. Sortavala, Helylä, Kurenmäki,
in fissuris rupium. 30 Iun. 1938.

leg. Harald Lindberg.

In Finlandia orientali et in Lapponia raro obviam.

1777. *Woodsia alpina* (Bolton) S. F. Gray.

Kuusamo, par. Kuusamo, Alakitka, Juuma, Jäkälävuoma, in
rupe umbrosa. 6 Iul. 1936.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1776.

1778. *Woodsia glabella* R. Br.

Kuusamo, par. Kuusamo, Kulmakkapuro prope pag. Kauppila,
in rupe calc. umbrosa. 3 Aug. 1933, leg. Edv. af
Hällström; 25 Iul. 1936.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 407.

1779. *Asplenium adulterinum* Milde.

Karelia borealis, par. Juuka, Ahmovaara, Halolanpää,
Kannaksen tila, Porttikallio, in rupe
parcissime crescens. 1 Aug. 1942.

leg. Harald Lindberg.

Etiam loco unico in Savonia boreali lectum est.

1780. *Asplenium viride* Huds.

Karelia borealis, par. Juuka, Ahmovaara, Halolanpää,
Kannaksen tila, Porttikallio, in rupe
umbrosa. 1 Aug. 1942.

leg. Harald Lindberg.

In Finlandia orientali et in Lapponia obvium.

1781. *Asplenium viride* Huds.

Kuusamo, par. Kuusamo, Oulankajoki, Halosenkuru, in rupe
umbrosa in abiegno. 11 Aug. 1936.

leg. Edv. af Hällström.

Cfr n. 1780.

1782. *Botrychium lunaria* (L.) Sw.

Tavastia australis, par. Lempäälä, Kuokkala, in grami-
nosis siccis. 3 Iul. 1937.

leg. S. Saarnijoki.

Cfr n. 1005.

1783. *Equisetum palustre* L.

Kuusamo, par. Kuusamo, Virtasalmi, in palude. 1 Iul. 1936.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 413, 1010.

1784. Equisetum hiemale L. × E. variegatum Schleich.
(*E. trachyodon* A. Br.)

K u u s a m o, par. Kuusamo, in prato ripæ fluminis Kitkajoki,
inter Vääräkoski et lac. Ylijuumanjärvi. 5 Iul. 1936.

leg. Harald Lindberg.

Tantum in par Kuusamo et in Lapponia Petsamoënsi lectum est.

1785. Lycopodium clavatum L.
f. *lagopus* Læst.

K u u s a m o, par. Kuusamo, in monte Pieni Mäntytunturi. 26
Iul. 1936.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1019.

1786. Taxus baccata L.

A l a n d i a, par. Ekerö, Skeppsvik, in abiegno subhumido. 12 Iul.
1943.

leg. Harald Lindberg.

Specimina distributa ex una arbore capta sunt.

Cfr n. 419.

1787. Typha angustifolia L.

R e g i o A b o ë n s i s, par. Lojo, ins. Jalassaari, in ripa lacus prope
villulam Ekeberga. 25 Iul. 1934.

leg. Harald Lindberg.

In Finlandia australi et media usque ad c. 63° plerumque rarius,
imprimis in vicinitate marium crescit.

1788. Sparganium ramosum Huds.
***polyedrum** A. & G.

Isthmus Karelicus, par. Muola, Sudenoja, in fundo limoso in amne. 15 Aug. 1934.

leg. Harald Lindberg.

Subsp. *polyedrum* rarissime in Finlandia crescit, subsp. *microcarpum* Neum. sat frequenter usque ad Ostrob. borealem occurrit.

1789. Sparganium affine Schnizlein

Isthmus Karelicus, par. Valkjärvi, Vermatsulampi, in ripa limosa. 12 Aug. 1934.

leg. Harald Lindberg.

Plurimis in partibus Finlandiæ obvium.

1790. Sparganium submuticum Hartm.
(*Sp. hyperboreum* Læst.)

Karelia borealis, par. Juuka, Polvela, in fossa juxta viam publicam. 6 Aug. 1942.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1024.

1791. Potamogeton natans L.
modif. terrestris.

Karelia borealis, par. Juuka, in ripa subsicca lac. Pielisjärvi, prope templum. 3 Aug. 1942.

leg. Harald Lindberg.

In tota fere Finlandia frequenter obvius, in parte maxime septentrionali et in Lapponia rarescit, sed ad 69° fere procedere videtur.

1792. Potamogeton gramineus L. × P. natans L.
(*P. sparganifolius* Læst.)

N y l a n d i a, par. Iitti, in sinu Pyhålahti lac. Urajäarvi, fundo arenoso, in aqua c. 0.5 m profunda. 4 Aug. 1934.

leg. Aune Muroma.

Perpaucis locis in Finlandia lectus est.

1793. Potamogeton prælongus Wulfen.

K u u s a m o, par. Kuusamo, Ala-Kitka, Virtasalmi, in aqua. 1 Iul. 1936; fruct. 19 Iul. 1936, leg. G. Idman.

leg. Harald Lindberg.

In plurimis partibus Finlandiæ et Lapponiæ invenitur, sed plerumque nisi rarior non obvius.

1794. Potamogeton lucens L.

T a v a s t i a a u s t r a l i s, par. Hollola, lac. Vesijärvi, Sarva, in aqua c. 2 m profunda. 6 Aug. 1935.

leg. Tellervo Levanto.

In plurimis partibus Finlandiæ et Lapponiæ invenitur, sed plerumque nisi rarior non obvius.

1795. Potamogeton Zizii W. et K.

A l a n d i a, par. Hammarland, in lacu Långträsk copiosissime. 25 Aug. 1942.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 429, 430.

1796. Potamogeton rutilus Wolfgang.

Isthmus Karelicus, in lacu Äyräpäänjärvi, Eteläjärvi. 22
Iul. 1939.

leg. L. Pohjala.

In Finlandia tantum hoc loco in Isthmo Karelico et loco unico in
Tavastia australi crescit, etiam in Karelia orientali occurrit.

1797. Potamogeton rutilus Wolfgang.

Tavastia australis, par. Asikkala, lac. Vesijärvi, Korpi-
lahdenpohja, in aqua 0,8 m profunda.
8 Aug. 1935.

leg. Tellervo Levanto.

Cfr n. 1796.

1798. Potamogeton filiformis Pers. × **P. vaginatus** Turcz.
(*P. fennicus* Tagstr.)

Ostrobottnia media, opp. Jakobstad, Sandön, in mare.
22 Aug. 1900.

leg. C. W. Fontell.

Cfr 435, 4031.

1799. Zannichellia major Boenn.

Nylandia, par. Ekenäs, Tvärminne, ins. Långskärs Norrgrund,
in mare. 29 Aug. 1936.

leg. H. Luther.

Perpaucis locis in tæniis austro-occidentalibus occurrit.

1800. Zannichellia polycarpa Nolte.

Alandia, par. Jomala, ins. Möckelö, in ripa maris contra opp. Mariehamn. 22 Aug. 1942.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 31, 437.

1801. Najas tenuissima A. Br.

Tavastia australis, par. Asikkala, lac. Vesijärvi, Kurhila, in aqua 0.3—0.4 m profunda. 10 Aug. 1935.

leg. Tellervo Levanto.

Cfr n. 438.

1802. Alisma Wahlenbergii Holmberg.

Ostrobottnia media, par. Pyhäjoki, in sinu maris, in vado una cum *Ranunc. conferv.*, *Potamog. panormit.*, *Zannich. polyc.* 14 Aug. 1939.

leg. A. L. Backman.

Perpaucis locis in parte orientali Sinus Fennici et in parte septentrionali Sinus Bottnici lecta est.

1803. Alisma Wahlenbergii Holmberg.

Ostrobottnia borealis, par. Haukipudas, Kello, Halonen, loco limoso in litore maris. 14 Jul. 1936.

leg. O. Seppänen.

Cfr n. 1802.

1804. *Stratiotes aloides* L.

Isthmus Karelicus, par. Rautus, lac. Susijärvi. 7 Iul.
1934.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 442, 443.

1805. *Hydrocharis morsus-ranæ* L.

Isthmus Karelicus, par. Muola, Sudenoja, in amne. 15
Aug. 1934.

leg. Harald Lindberg.

In Finlandia usque ad Ostrobotniam borealem dispersa.

1806. *Hierochloë australis* (Schrad.) R. & S.

Tavastia australis, par. Lampis, Evois, in silva. 14 Iun.
1908.

leg. A. Renvall.

Cfr n. 445.

1807. *Setaria viridis* (L.) PB.

Isthmus Karelicus, par. Terijoki, Tyrisevä, loco arenoso
in via ferraria. 8 Aug. 1936.

leg. L. Fagerström.

In Isthmo Karelico spontanea, ceteroquin in saburra etc.

1808. *Cinna pendula* (Bong.) Trin.

Nylandia, par. Pyttis, Mogerpörtö, in nemore juxta Lång-
viken. 11 Aug. 1939.

leg. L. Fagerström.

Cfr n. 46 a, b.

1809. *Agrostis stolonifera* L.
(*A. alba* L.)

K a r e l i a b o r e a l i s, par. Juuka, ins Paalamaa in lac. Pielisjärvi, in ripa lapidosa. 2 Aug. 1942.

leg. Harald Lindberg.

Specimina distributa ex eodem caespite capta sunt.
Cfr n. 47, 1043.

1810. *Agrostis canina* L.
var. *arida* Schlecht. (var. *montana* Hartm.)

N y l a n d i a, par. Borgå, Emsalö, Havsudden, in fissuris rupium juxta mare. 9 Iul. 1919.

leg. C. E. Boldt.

Species per totum fere territorium dispersa est. Var. *arida* Schlecht. tantum in rupestribus juxta mare lecta est.

1811. *Calamagrostis neglecta* (Ehrh.) × *C. purpurea* Trin.

O s t r o b o t t n i a m e d i a, opp. Jakobstad in litore maris. 21 Iul. 1902.

leg. C. W. Fontell.

Cfr n. 455.

1812. *Calamagrostis lapponica* (Wahlenb.) Hartm.

K u u s a m o, par Kuusamo, in margine silvæ inter Rajala et Paana juxta lac. Paanajärvi. 13 Iul. 1936.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 456.

1813. *Holcus mollis* L.

Isthmus Karelicus, par. Valkjärvi, in margine alneti juxta
præd. Veikkola. 11 Aug. 1934.

leg. Harald Lindberg.

Locus unicus in Finlandia.

1814. *Sieglingia decumbens* (L.) Bernh.

Isthmus Karelicus, par. Terijoki, in prato. 13 Jul. 1939.

leg. L. Fagerström.

Cfr n. 470.

1815. *Melica ciliata* L.

Regio Aboënsis, par. Tenala, Trollshovda, in litore lapidoso
in radice montis ad Solbölefjärden spec-
tantis. 13 Jul. 1942.

leg. Harald Lindberg.

Locus unicus in Finlandia.

**1816. *Poa glauca* Vahl.
(*P. caesia* Sm.)**

Karelia Ladogensis, par. Sortavala, ins. Iso Virosaari,
in fissuris rupium. 10 Jul. 1922.

leg. K. H. Hällström.

Cfr n. 1050.

1817. *Poa glauca* Vahl.*(Poa caesia Sm.)*

K u u s a m o, par. Kuusamo, in rupe Ruskeakallio juxta lac.
Paanajärvi. 14 Iul. 1936.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1050, 1816.

1818. *Poa palustris* L.*(P. serotina Ehrh.)*

R e g i o A b o e n s i s, par. Lojo, ins. Jalassaari, in prato in ripa
lacus. 15 Iul. 1940.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1054.

1819. *Poa alpigena* (Fr.) Lindm.

K u u s a m o, par. Kuusamo, Rajala, in graminosis. 14 Iul. 1936.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1055.

1820. *Festuca sabulosa* (Anderss.) Lindb. fil.*(F. pholesica Zapal.)*

I s t h m u s K a r e l i c u s, par. Pyhäjärvi, in collibus arenae
mobilis in ripa lacus Ladoga, prope
pag. Riiska. 30 Iun. 1934.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 77 a, b, 485.

1821. Bromus inermis Leysser.

Nylandia, par. Karis, in arenosis juxta viam ferrariam in vicinitate stationis viæ ferrariæ Karis, adv. 14 Iul. 1942.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 79.

1822. Bromus squarrosus L.

Isthmus Karelicus, par. Terijoki, adv. in arenosis ad stationem viæ ferrariæ Rajajoki. 2 Iul. 1935.

leg. L. Fagerström.

Raro adventicius in Finlandia.

1823. Bromus japonicus Thunb.

Isthmus Karelicus, par. Terijoki, Rajajoki, adv. in arenosis ad stationem viæ ferrariæ Rajajoki. 8 Iul. 1935.

leg. L. Fagerström.

Raro adventicius in Finlandia.

1824. Brachypodium pinnatum (L.) PB.

Karelia Ladogensis, par. Sortavala, in margine silvæ juxta lac. Helmijärvi. 29 Iun. 1938.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 82 a, b.

1825. *Brachypodium silvaticum* (Huds.) PB.

Alandia, par. Finström, Bergö, Husö, in fruticeto juxta mare.
1 Sept. 1942.

leg. Harald Lindberg.

Tantum raro in Alandia crescit.

1826. *Agropyron caninum* (L.) PB.

Ostrobottnia borealis, par. Nedertorneå, Kaakamo, Mansikka, in litore arenoso maris, una c. *A. fibroso* (Schrenk) crescens (n. 1827).

leg. E. Häyrén.

Cfr n. 83.

1827. *Agropyron fibrosum* (Schrenk) Nevski.

Ostrobottnia borealis, par. Nedertorneå, Kaakamo, Mansikka, in litore arenoso maris, una c. *A. canino* (L.) crescens (n. 1826).

leg. E. Häyrén.

In Finlandia boreali et Lapponia raro obvium.

1828. *Agropyron fibrosum* (Schrenk) Nevski.

Kuusamo, par. Kuusamo, in ripa arenosa ad ostium fluminis Oulankajoki, prope Kauppila ad lac. Paanajärvi, fqq. Aug. 1936.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1827.

1829. Schoenus ferrugineus L.

K u u s a m o, par. Kuusamo, Nissinjärvi, in palude Lakisuo.
8 Iul. 1934.

leg. Edv. af Hällström.

Cfr n. 491, 1065.

1830. Schoenus ferrugineus L.

K u u s a m o, par. Kuusamo, Nissinjärvi, in palude Lakisuo. 26
Iun. 1936.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 491, 1065, 1829.

1831. Scirpus eupaluster Lindb. fil.
f. *nulliseta* Lindb. fil.

K u u s a m o, par. Kuusamo, in ripa arenosa lac. Paanajärvi, in
aqua non profunda infra præd. Rajala. 17 Iul. 1936.

leg. Harald Lindberg.

Per totum territorium dispersum. F. *nulliseta* rarior est.

Cfr Harald Lindberg, Die nordeuropäischen Formen von
Scirpus (Heleocharis) paluster L. (Acta Soc. p. F. et Fl. Fenn.,
23, N:o 7, 1902).

1832. Scirpus eupaluster Lindb. fil. × Sc. mamillatus Lindb. fil.
in Acta Soc. p. F. et Fl. Fenn., 23, N:o 7 (1902).

S a v o n i a b o r e a l i s, par. Jorois, Järvikylä, Katteinsilta,
in fossa fundo turfoso parce inter *Sc.*
mamillatum. 20 Aug. 1902.

leg. Harald Lindberg.

Tantum semel lectus est.

1833. Carex dioeca L. × C. heleonastes Ehrh.

Ostrobottnia Kajanensis, par. Suomussalmi, in pago Kiannankylä, Kiannanniemi, Nuolinoro, in prato paludoso. 6 Iul. 1938.

leg. O. Kyyhkynen.

Tantum hoc loco lecta est.

1834. Carex cyperoïdes L.

Karelia Ladogensis, opp. Sortavala, in ripa lac. Ladoga. 4 Iul. 1938.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 104, 508, 1071.

1835. Carex cyperoïdes L.

Karelia Ladogensis, par. Sortavala, Hakala, Pieni Heposaari, in ripa. 4 Aug. 1937.

leg. K. H. Pankakoski.

Cfr n. 104, 508, 1071, 1834.

1836. Carex disticha Huds.

Alandia, par. Ekerö, Skeppsvik, in margine viæ graminoso. 12 Iul. 1943.

leg. Harald Lindberg.

In Alandia frequenter crescit, ceteroquin in Finlandia austro-occidentali rarior.

1837. Carex arenaria L.

Alandia, par. Ekerö, Torp, Degersand, in litore maris arenoso
fqq. 28 Aug. 1942.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 105.

1838. Carex contigua Hoppe.

Regio Aboënsis, par. Lojo, ins. Storön, Hermala, in prato
siccò. 4 Iul. 1942.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 511, 1074.

1839. Carex Pairæi F. Schultz.

Regio Aboënsis, par. Lojo, ins. Jalassaari, Ekeberga, in
margine silvæ. 1 Iul. 1942.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 106, 1074.

1840. Carex elongata L.

Tavastia australis, par. Sääksinäki, Nuutala, loco palu-
doso in silva. 25 Iun. 1935.

leg. K. Linkola.

In Finlandia australi et media obvia.

1841. Carex elongata L.

Savonia borealis, par. Leppävirta, Reinikkala, Edussaari,
in prato humido in silva. 7 Iul. 1935.

leg. A. Vaarama.

Cfr n. 1840.

1842. Carex glareosa Wahlenb.

Ostrobottnia media, par. Pedersöre, ins. Sandön, in litore
maris. 18 Iun. 1898.

leg. C. W. Fontell.

Cfr n. 113, 1083.

1843. Carex Hudsonii A. Bennett.

(*C. stricta* Good., non Lam.)

Karelia Ladogensis, par. Sortavala, in ripa lacus Ladoga,
infra Seminarium. 21 Iun. 1938.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1085. Specimina distributa ex uno caespite capta sunt.

1844. Carex caespitosa L.

Tavastia australis, par. Sääksmäki, Ikkala, Uotila, in
fruticeto juxta ripam lacus. 27 Iun.
1935.

leg. K. Linkola.

Per totum fere territorium dispersum. Specimina distributa ex
uno caespite capta sunt.

1845. Carex caespitosa L.

Kuusamo, par. Kuusamo, Alakitka, Virtaniemi, loco paludoso.
1 Iul. 1936.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1844. Specimina distributa ex uno caespite capta sunt.

1846. Carex Goodenoughii Gay.

Isthmus Karelicus, par. Sakkola, Kiviniemi, in cumulo arenæ mobilis in campo sicco juxta ripam lacus. 4 Jul. 1934.

leg. Harald Lindberg.

In toto territorio, parte maxime septentrionali excepta, frequentissime sæpeque copiosissime obviam.

1847. Carex alpina Sw.

Kuusamo, par. Kuusamo, Kulmakkapuro, juxta rivulum in silva. 26 Jun. 1936.

leg. Harald Lindberg.

In ultima Lapponiæ frequenter crescere videtur, ad meridiem versus frequentia minuitur, ut jam in Lapponia maxime australi satis rara sit, sed saltem usque ad 65° procedit. Etiam in Karelia rossica lecta est.

1848. Carex holostoma Drej.

Lapponia Inarensis, in monte Kalkuoivi juxta flum. Pasvik älv. 19 Aug. 1899.

leg. C. W. Fontell.

Etiam in Lapponia rossica lecta est.

1849. Carex limosa L. f. depauperata.

Rossia, Lapponia Imandræ, ad lac. Umpjaur, in sphagneto aquoso una c. *C. limosa*-typica et *C. rariflora* (Wg.). Jul. 1892.

leg. A. Osw. Kihlman.

Sunt specimina originalia *C. imandrensis* Kihlm. »Verisimiliter est *C. limosa* × *livida*» teste Kihlm. F. depauperata *C. limosæ* mihi videtur (Mem. Soc. p. F. et Fl. Fenn., 15, p. 175). — Harald Lindberg.

Cfr n. 126.

1850. Carex digitata L. f. *pallens* Fristedt.

Satakunta, par. Kokemäki, Vuoltee, in colle. 25 Mai 1934.
leg. L. Pohjala.

Cfr n. 133, 1091. F. *pallens* rarissime in Finlandia crescit.

1851. Carex jemtlandica Palmgr.

Ostrobottnia Kajanensis, par. Suomussalmi, Ruhtinaansalmi, in palude Rytisuo. 10 Iul. 1937.

leg. O. Kyyhkynen.

In Finlandia boreali locis paucis lecta est.

1852. Carex jemtlandica Palmgr.

Kuusamo, par. Kuusamo, Nissinjärvi, in palude Lakisuo. 26 Iun. 1936.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1851.

1853. Carex oedocarpa Ands.

Alandia, par. Ekerö, in semita humida in silva acerosa inter Torp et Skeppsvik. 15 Iul. 1943.

leg. Harald Lindberg.

In ins. Alandia non raro crescit, ceteroquin in Finlandia australi raro lecta est.

1854. Carex aristata R. Br. f. *Siegertiana* (Uechtr.) Aschers.

Karelia Ladogensis, par. Sortavala, Vuorlahti, loco humido in margine silvæ. 22 Iul. 1934.

leg. A. Pankakoski.

Cfr n. 141. Tantum specimina sterilia distributa sunt.

1855. Carex præcox Schreb.

Nylandia, par. Ekenäs, Dragsvik, in ruderatis juxta viam ferratam. 12 Iul. 1935.

leg. O. Fortelius.

Planta adventicia in Finlandia. Paucis locis in parte australi lecta est. Vulgo copiose crescens.

1856. Spirodela polyrrhiza (L.) Schleid.

Isthmus Karelicus, par. Muola, Sudenoja, in fossa. 15 Aug. 1934.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 144, 554.

1857. Juncus stygius L.

Kuusamo, par. Kuusamo, Virtasalmi, in palude. 1 Iul. 1936.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 153, 560, 561.

1858. Juncus balticus Willd. × **J. filiformis** L.
(*J. inundatus* Drejer.)

Ostrobottnia media, par. Pedersöre, ins. Ådön, in litore maris, loco paludoso. 1 Aug. 1898

leg. C. W. Fontell.

Cfr n. 147, 556, 557.

1859. Juncus alpinus Vill.

Isthmus Karelicus, par. Sakkola, in ripa lacus juxta Kiviniemi. 4 Iul. 1934.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 563.

1860. Juncus alpinus Will. ***fuscoater** (Schreb.).

Karelia borealis, par. Juuka, in semita humida ad Tahkovaara. 6 Aug. 1942.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 564.

1861. Juncus articulatus L.

(*J. lamprocarpus* Ehrh.)

Isthmus Karelicus, par. Pyhäjärvi, Keliä, in ripa lac. Pyhäjärvi. 19 Aug. 1934.

leg. Harald Lindberg.

In Finlandia australi frequens, in media parte rarior, sed saltem ad 63° fere est lecta.

1862. Luzula nemorosa (Poll.) E. Mey.

(*L. albida* Desv.)

Regio Aboënsis, ins. Runsala, in querceto cusp. 7 Iul. 1936.

leg. Suoma Valle.

Cfr n. 1102.

1863. Allium oleraceum L.

Alandia, par. Ekerö, Skag, in prato frondoso. 28 Aug. 1842.

leg. Harald Lindberg.

In Alandia satis frequenter, in reliqua Finlandia austro-occidentali passim aut rarius, sed ceteroquin rarius—rarissime usque ad c. 62° invenitur.

1864. *Iris pseudacorus* L.

N y l a n d i a, par. Helsinge, Räckhals, in aqua. 24 Iun. 1937.

leg. Aino Roivainen.

In Finlandia australi et media satis frequenter — passim invenitur, ad septentrionem versus in parte maxime occidentali territorii usque ad 66° indicatur.

1865. *Orchis maculatus* L.

T a v a s t i a a u s t r a l i s, par. Tyrvántö, Mälkiäinen, in prato subhumido in silva. 10 Iul. 1935.

legg. Hilikka et K. Linkola.

In tota Finlandia satis frequenter aut frequenter crescit, ad septentrionem versus frequentia minuitur, sed usque ad summos septentriones ut etiam in regionem subalpinam progreditur.

1866. *Salix amygdalina* L.

K u u s a m o, par. Kuusamo, Kauppila, ins. Hietasaari in lac. Paanajärvi. 11 Iul. 1936.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 583. Specimina distributa ex eodem frutice capta sunt.

1867. *Salix nigricans* Sm.

K u u s a m o, par. Kuusamo, Paanajärvi, in margine fl. Mäntyjoki. 28 Iul. 1936.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1110. Specimina distributa ex eodem frutice capta sunt.

1868. *Salix nigricans* Sm. f. *latifolia*.

Kuusamo, par. Kuusamo, Paanajärvi, in ripa fl. Mäntyjoki.
22 Iul. 1936.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1110, 1837. Specimina distributa ex eadem arbore (3.5 m alta)
capta sunt.

1869. *Salix phylicifolia* L.

Kuusamo, par. Kuusamo, Paanajärvi, in ripa fl. Mäntyjoki.
28 Iul. 1936.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1111—1114. Specimina distributa ex eodem frutice magno
capta sunt.

**1870. *Salix phylicifolia* L. f. ad f. *irriguam* prox.
(det. B. Floderus, 1929).**

Laponia Petsamöensis, Maattivuono, Rotajoki. 11 Iul. 1928.

leg. E. Häyrén.

Cfr n. 1111—1114, 1869.

**1871 *Salix phylicifolia* L. \times *S.*rosmarinifolia* (L.) C. Hartm.
(videtur).**

Regio Aboënsis, par. Lojo, ins. Storön, Saukkalahti in pag.
Hermala, in prato juxta ripam lacus,
inter *S. phylic.* et *S.*rosmarin.* 20 Iul.
1940.

leg. Harald Lindberg.

Specimina distributa ex eodem frutice capta sunt.

1872. *Salix hastata* L.

Kuusamo, par. Kuusamo, prope templum, in prato juxta lac.
Torankijärvi. 24 Jun. 1936.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1115. Specimina distributa ex eodem frutice capta sunt.

1873. *Salix hastata* L.

Kuusamo, par. Kuusamo, in prato juxta lac. Torankijärvi.
25 Jun. 1936.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1115, 1872. Specimina distributa ex eodem frutice capta sunt.

1874. *Salix hastata* L.

Kuusamo, par. Kuusamo, Kauppila, ins. Hietasaari in lac.
Paanejärvi. 11 Jul. 1936.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1115, 1872, 1873. Specimina distributa ex eodem frutice
capta sunt.

1875. *Salix pyrolifolia* Ledeb.

Kuusamo, par. Kuusamo, loco paludoso juxta rivulum Jippi-
hetteenoja prope fl. Oulankajoki. 26 Jun. 1936.

leg. Harald Lindberg.

Arbor (♀) unica in Finlandia, infirma, c. 5 m alta.

1876. *Salix cinerea* L.

Regio Aboënsis, par. Lojo, in ripa lacus inter ins. Jalasaari et ins. Storön. 12 Iun. et 1 Iul. 1942.

leg. Harald Lindberg.

Specimina distributa ex eodem frutice capta sunt.

In Finlandia australi sa'tem ad 62° plerumque frequenter aut satis frequenter obvia, supra 64° autem rarius inveniri videtur. In parte occidentali usque ad 66°20', in orientali autem parte ad 66°25' lecta est.

1877. *Salix caprea* L.

Kuusamo, par. Kuusamo, Paanajärvi, in pineto juxta fl. Mäntyjoki. 19 Iul. 1936.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 584, 1116, 1117. Specimina distributa ex eadem arbore capta sunt.

1878. *Salix caprea* L.

Kuusamo, par. Kuusamo, pag. Vuotunki, Törmänen. 1 Iul. 1936.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 584, 1116, 1117, 1877. Specimina distributa ex eadem arbore (5 m alta) capta sunt.

1879. *Salix caprea* L. × *S.*cinerascens* (Wg.).
*(S.*cinerascens* (Wg) dominans).

Kuusamo, par. Kuusamo, in pineto sicco juxta rivulum Kolvankioja. 25 Iun. 1936.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1118. Specimina distributa ex eodem frutice (parvo, sterili) capta sunt.

1880. *Salix caprea* L. × *S. repens* L.

Alandia, par. Ekerö, pag. Torp, loco humidiusculo juxta paludem. 15 Iul. 1943.

leg. Harald Lindberg.

Specimina distributa ex eodem arbore (4 m alta) capta sunt.

1881. *Salix aurita* L.

Kuusamo, par. Kuusamo, Paanajärvi, in palude juxta stagnum Lohilampi. 24 Iul. 1943.

leg. Harald Lindberg.

In Finlandia australi et media usque ad 64° frequenter — satis frequenter obvia; supra hunc gradum passim — satis frequenter inveniri indicatur; ad septentrionem versus usque ad 66°45' lecta est. — Specimina distributa ex eodem frutice capta sunt.

1882. *Salix aurita* L. × *S.*livida* Wg.

Regio Aboënsis, par. Tenala, Seuko, in fruticeto in margine agri inter parentes. 12 Iul. 1942.

leg. Harald Lindberg.

Specimina distributa ex eodem frutice capta sunt.

1883. *Salix aurita* L. × *S. myrtilloides* L.

Kuusamo, par. Kuusamo, Paanajärvi, inter fl. Mäntyjoki et m. Pieni Mäntyunturi. 26 Iul. 1936.

leg. Harald Lindberg.

Specimina distributa ex eodem frutice capta sunt.

1884. *Salix aurita* L. × *S repens* L.

Alandia, par. Ekerö, pag. Torp, in margine peludis. 12 Iul. 1943.

leg. Harald Lindberg.

Specimina distributa ex eodem frutice capta sunt.

1885. *Salix depressa* L. **livida* (Wg.).

Kuusamo, par. Kuusamo, Kauppila, in fruticeto in margine prati. 29 Iul. 1936.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 586. Specimina distributa ex eodem frutice capta sunt.

1886. *Salix depressa* L. **livida* Wg. f. ad. *S.*cinerascens* (Wg) vergens.

Kuusamo, par. Kuusamo, Kauppila, in fruticeto in margine prati, una c. *S.*livida* (n. 1885) crescens. 29 Iul. 1936.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 586, 1885. Specimina distributa ex eodem frutice (2 m alto) capta sunt.

1887. *Salix depressa* L. **cinerascens* (Wg.).

Kuusamo, par. Kuusamo, in colle sicco prope templum. 22 Iun. 1936.

leg. Harald Lindberg.

In Lapponia occidentali passim aut etiam majore frequentia invenitur, ceteroquin rara esse indicatur; ad meridiem versus usque ad c. 60° lecta est. — Specimina distributa ex eodem frutice capta sunt.

1888. *Salix repens* L. ♂

Regio Aboënsis, par. Lojo, Syd-Lojo, Biskopsnäs, in prato
juxta ripam lacus. 7 Jun. 1938.

leg. Harald Lindberg.

In Finlandia maxime occidentali saltem plurimis plagis frequenter
obvia, ad orientem versus subito rarescit; ad septentrionem
versus usque ad 65°50' progreditur. — Specimina distributa
ex eodem frutice capta sunt.

1889. *Salix lapponum* L.

Kuusamo, par. Kuusamo, prope templum, in prato juxta ripam
lac. Torankijärvi. 24 Jun. 1936.

leg. Harald Lindberg.

In Lapponia frequentissime sæpeque copiose provenit, in Finlandia
septentrionali frequenter obvia; ad meridiem versus raris-
simè rarescit, sed etiam in australibus provinciis, Alandia excepta,
inventæ est. — Specimina distributa ex eodem frutice capta sunt.

1890. *Salix lapponum* L. var. *serrata* Flod.

Kuusamo, par. Kuusamo, Vuotunki, Törmären, in ripa lac.
Luodelahti, 1 frutex una c. *S. lapponum*-typ. et
S. phyllicifolia crescens. 1 Jul. 1936.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1889.

1891. *Salix glauca* L. forma.

Kuusamo, par. Kuusamo, prope templum, in prato juxta ripam
lac. Kuusamorsjärvi. 23 Jun. 1936.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 175. Specimina distributa ex eodem frutice capta sunt.

1892. *Salix glauca* L. forma.

K u u s a m o, par. Kuusamo, prope templum, in prato juxta ripam
lac. Kuusamonjärvi. 23 Jun. 1936.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 175, 1891. Specimina distributa ex eodem frutice capta sunt.

1893. *Salix glauca* L. forma.

K u u s a m o, par. Kuusamo, in prato juxta lac. Torankijärvi.
29 Jun. 1936.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 175, 1891, 1892. Specimina distributa ex eodem frutice capta
sunt.

1894. *Salix myrsinites* L.

K u u s a m o, par. Kuusamo, Paanajärvi, in palude juxta fl. Mänty-
joki. 19 Jul. 1936.

leg. Harald Lindberg.

In maxima parte Lapponiæ salis frequenter aut frequenter inveniri
videtur; ad meridiem versus saltem in parte occidentali subito
rærescit et ibi infra $65^{\circ}40'$ non visa est; in orientali autem parte
(in Karelia rossica) ad $62^{\circ}40'$ quamvis rara progreditur. —
Specimina distributa ex eodem frutice nano capta sunt.

1895. *Salix myrsinites* L. × *S. nigricans* Sm.

(*S. myrsinites* L. valde dominans).

K u u s a m o, par. Kuusamo, prope templum in prato juxta lac.
Kuusamonjärvi. 23 Jun. 1936.

leg. Harald Lindberg.

Specimina distributa ex eodem frutice capta sunt.

1896. Salix herbacea L.

L a p p o n i a P e t s a m o e n s i s, Pummanki, in reg. alp. in monte Pummangirriemen tunti. 22 Iul. 1928.

leg. E. Häyrén.

In regione alpina montium Lapponiæ, ut etiam in alpinis ad Mare glaciale, frequenter sæpeque copiose obvia; extra montes alpinos aut subalpinos apud nos vix provenit.

1897. Salix herbacea L. × S. lapponum L.

L a p p o n i a P e t s a m o e n s i s, Pummanki, in reg. alp. in monte Pummangirriemen tunti. 22 Iul. 1928.

leg. E. Häyrén.

1898. Salix reticulata L.

K u u s a m o, par. Kuusamo, Laajusvaara, loco muscoso in silva in monte Hämeenvaara. 30 Iun. 1936.

leg. Harald Lindberg.

In Lapponia in regione alpina montium altissimorum et septentrionalium, ut etiam in alpinis Maris glacialis frequenter inveniri indicatur, in regionem subalpinam nisi raro non descendit, etiam raro in par Kuusamo in Finlandia septentrionali (ad 66°15') lecta est.

1899. Betula nana L. × B. pubescens Ehrh.

K u u s a m o, par. Kuusamo, Paanajärvi, in fruticeto loco humidusculo juxta stagnum Haukilampi. 25 Iul. 1936.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1127, 1128.

1900. *Alnus glutinosa* (L.) × *A. incana* (L.) D.C.

S a t a k u n t a, par. Pohjois-Pirkkala, Villilä, in ripa lac. Fyhäjärvi. 14 Apr. et 7 Sept. 1936.

leg. S. Saarnijoki.

Cfr n. 1130. Arbor 12.5 m alta, circuitus 1.5 m.

1901. *Alnus glutinosa* (L.) Gært. × *A. incana* (L.) D.C.

T a v a s t i a a u s t r a l i s, par. Tyrvöntö, Mälkiäiren, in margine agri. 20 Aug. 1937.

leg. K. Linkola.

Cfr 1130, 1900. Arbor 8 m alta, inter parentes crescens.

1902. *Alnus incana* (L.) D.C. forma.

K u u s a m o, par. Kuusamo, Paanajärvi, juxta fl. Mäntyjoki. 19 Jul. 1936.

leg. Harald Lindberg.

Specimina distributa ex eadem arbore capta sunt.

1903. *Alnus incana* (L.) D.C. var. *argentata* Norrl.

I s t h m u s K a r e l i c u s, par. Valkjärvi, in margine viæ juxta stationem viæ ferratæ Valkjärvi. 29 Jun. 1934.

leg. Harald Lindberg.

In Firlardia præcipue media hæud raro inveniri videtur. — Specimina distributa ex eodem frutice capta sunt.

1904. *Urtica dioeca* L. var *Sondénii* Simmons.

Kuusamo, par. Kuusamo, Laajusvaara, in nemore scaturigirioso.
30 Jun. 1936.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 598. Var. *Sondénii* tantum raro locis paucis in Finlandia septentrionali lecta est.

1905. *Rumex maritimus* L.

Karelia Ladogensis, opp. Soravaala, Hakala, Tuohitiinlahti, in ripa limosa. 8 Aug. 1937.

leg. K. H. Pankakoski.

Cfr n. 599.

1906. *Rumex hydrolapathum* Huds.

Isthmus Karelicus, par. Muola, pag. Kyyrölä, in ripa limosa lac. Yskjärvi. 15 Aug. 1934.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1140.

1907. *Rumex aquaticus* L.

Kuusamo, par. Kuusamo, Kauppila, in ripa lac. Paanajärvi,
23 Jul. 1936.

leg. Harald Lindberg.

Per totum territorium dispersus.

1908. *Rumex aquaticus* L.

Karelia australis, opp. Viborg, Monrepos, in ripa lacus.
24 Aug. 1934.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1907.

1909. Rumex aquaticus L. × R. obtusifolius L.

Isthmus Karelicus, par. Sakkola, Mönkö, in fossa, inter parentes. 17 Aug. 1934.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 604.

1910. Rumex auriculatus (Wallr.). ♀.

Karelia Ladogensis, par. Salmi, in margine viæ prope templum. 13 Iul. 1938.

leg. Harald Lindberg.

In parte austro-orientali territorii sæpe magna frequentia occurrit.

1911. Rumex auriculatus (Wallr.). ♂.

Karelia Ladogensis, par. Salmi, Uusikylä, loco graminoso juxta viam publicam. 14 Iul. 1938.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1910.

1912. Polygonum tomentosum Schrank.

Isthmus Karelicus, par. Sakkola, Kiviniemi, in ripa arenosa lac. Suvanto. 6 Iul. 1934.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 185.

1913. Polygonum nodosum Pers.

Isthmus Karelicus, par. Valkjärvi, in ripa arenosa lac. Valkjärvi, prope templum. 11 Aug. 1934.

leg. Harald Lindberg.

In Finlandia australi et media raro crescit. Distributio nondum rite explorata est.

1914. Polygonum nodosum Pers.

Karelia borealis, par. Juuka, in ripa lac. Pielisjärvi, haud
procul a templo. 3 Aug. 1942.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1913.

1915. Polygonum convolvulus L.

Isthmus Karelicus, par. Valkjärvi, Veikkola, in agro. 11
Aug. 1934.

leg. Harald Lindberg.

Per totum territorium in cultis frequenter—satis frequenter crescit.

1916. Chenopodium glaucum L.

Isthmus Karelicus, par. Pyhäjärvi, Taubila, in horto.
19 Aug. 1934.

leg. Harald Lindberg.

In Finlandia sat raro — raro in ruderalis et cultis usque ad Ostro-
bottuam borealem lecta est.

1917. Atriplex patulum L. var. sarcophyllum
Neum. et Ahlfvengr.

Alandia, par. Ekerö, pag. Torp, Degersand, parce in *Fuco* in
litore arenoso maris una c. n. 1918. 28 Aug. 1942.

leg. Harald Lindberg.

Species in multis formis in cultis, ruderalis et ad oras marium per
totum territorium dispersa est.

1918. Atriplex prostratum Bouch.

Alandia, par. Ekerö, pag. Torp, Degersand, in *Fuco* in litore arenoso maris una c. n. 1917. 28 Aug. 1942.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 191.

1919. Salsola kali L.

Alandia, par. Ekerö, pag. Torp, Degersand, in litore arenoso maris. 28 Aug. 1942.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 192.

1920. Montia lamprosperma Cham.

Kuusamo par. Kuusamo Paanajärvi loco scaturiginoso inter *Philonotis fontana* juxta fl. Mäntyjoki. 27 Jul. 1936.

leg. Harald Lindberg.

In maxima parte Finlandiæ passim aut satis frequenter obvia, in Alandia et nonnullis aliis plagis quamquam rarius inveniri indicatur, ad summum tamen septentrionem lecta est. In Finlandiæ tantum *M. lamprosperma* crescit. Cfr Harald Lindberg, Medd. Soc. p. F. et Fl. Fenn. XXVII p. 20.

1921. Silene tatarica (L.) Pers.

Kuusamo par. Kuusamo Kauppila ins Hietasaari in lac. Paanajärvi, copiose in arenosis juxta ripam lacus. 11 Jul. 1936.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 196 a, b, 1152.

1922. Melandrium affine (Vahl) Hartm.

Kuusamo par. Kuusamo in fissuris rupis Ahverperäkallio
juxta fl. Kitkajoki, parcissime crescers. 8 Iul. 1936.

leg. Harald Lindberg.

In summis partibus Lapponiæ rarissime invenitur, etiam in par.
Kuusamo et in par. Kuolajärvi lectum est.

1923. Gypsophila fastigiata L.

Isthmus Karelicus, par. Sakkola, Suvantola, in colle
arenoso juxta viam ferratam. 9 Iul.
1934.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 618, 1154.

1924. Dianthus polymorphus M.B.

Isthmus Karelicus, par. Terijoki, Tyrisevä, juxta static-
nem viæ ferratæ, adventicius. 2. Iul.
1936.

leg. L. Fagerström.

Tantum hoc loco lectus est.

1925. Dianthus superbus L.

Kuusamo, par. Kuusamo, Paanajärvi, Rajala, in graminosis
siccis. 15 Iul. 1936.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1156, 1157. Specimina distributa ex una radice orta sunt.

1926. *Sagina nodosa* (L.) Fenzl.

Isthmus Karelicus, par. Sakkola, Kiviniemi, in ripa arenosa fl. Vuoksen. 4 Iul. 1934.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 624.

1927. *Alsine verna* (L.) Bartl.

Karelia Ladogensis, par. Impilahti, Raukkiivuoret, in rupe juxta lac. Ladoga. 10 Iul. 1938.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1160.

1928. *Arenaria ciliata* L.pseudofrigida* Ostf. & Dahl.**

Kuusamo, par. Kuusamo, pag. Alakitka, Juuma, Jäkälävuoma, in parietibus umbrosis montis. 6 Iul. 1936.

leg. Harald Lindberg.

In Finlandia tantum in par. Kuusamo et Kuolajärvi lecta est. Etiam in Lapponia orientali crescit.

1929. *Stellaria palustris* (Murr.) Retz. f. *glauca* With.

Isthmus Karelicus, par. Rautu, Susijärvi, in prato humido. 7 Iul. 1934.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1162.

1930. *Stellaria palustris* (Murr.) Retz. f. *parviflora* (Klett. & Richt.).

Isthmus Karelicus, par. Rautu, Susijärvi, in prato humido. 7 Iul. 1934.

leg. Harald Lindberg.

Adhuc nisi raro in Finlandia australi non lecta est.

1931. *Stellaria longifolia* Mühlenb.

Savonia borealis, par. Pielavesi, Taipale, Kumpunen, in nemore umbroso. 2 Iul. 1933.

leg. O. Kyyhkynen.

Satis raro—passim in toto fere territorio, Lapponia septentr.-orientali excepta, obvia est; in Alandia rarissima.

1932. *Stellaria uliginosa* Murr.

Isthmus Karelicus, par. Valkjärvi, Pähkirämäki, loco scaturiginoso. 25 Iun. 1934.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 629.

1933. *Cerastium alpinum* L.

Kuusamo, par. Kuusamo, pag. Alakitka, Juuma, in rupe prærupta, umbrosa in Hautaniitty. 7 Iul. 1936.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1164.

1934. *Spergula vernalis* Willd.

Regio Aboënsis, par. Lojo, ins. Jalassaari, in monte alta contra villulam Ekeberga. 8 Iul. 1942.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 643.

1935. *Spergularia marina* (L.) Griseb.

(*Sp. salina* Presl., *Sp. canina* Leffl.)

Alandia, par. Jomala, Ramsholmen, in litore argillaceo maris. 23 Aug. 1942.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 644, 645.

1936. Scleranthus annuus L.

Isthmus Karelicus, par. Pyhäjärvi, Rantakylä, in campo arenoso juxta lac. Lædoga. 30 Jun. 1934.

leg. Harald Lindberg.

In Finlandia australi usque ad 62° frequenter, interdum frequentissime obvius; deinde ad 63° plerumque passim invenitur, supra hunc gradum autem plerumque rarus aut adventicius esse videtur.

1937. Nymphæa tetragona Georgi.

Savonia australis, par. Mikkeli (St. Michel), in stagno Pieni Likolampi. 25 Aug. 1935.

leg. Helmi Tulla.

Cfr n. 1171.

1938. Ceratophyllum demersum L. var. *apiculatum* (Cham. et Schl.) Aschers, c. fr.

Alandia, par. Finström, Godby, frequentissime in stagno Godby-träsk. 3 Sept. 1942.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1172.

1939. Actæa erythrocarpa Fisch.

Kuusamo, par. Kuusamo, Paanajärvi, in abiegno humidiusculo juxta Kuloharju. 30 Jul. 1936.

leg. Harald Lindberg.

In australi et media parte Fennoscandiæ orientalis satis frequenter inveniri videtur, ceterum in tota Lapponia et provinciis orientalibus plerumque raro occurrere videtur.

1940. *Thalictrum simplex* L. var. *boreale* (F. Nyl.) Fr.

Kuusamo, par. Kuusamo, juxta rivulum Tulilammenpuro supra Halosenkuru. 11 Aug. 1936.

leg. Edv. af Hällström.

In Finlandia septentrionali et in Lapponia crescit.

1941. *Thalictrum flavum* L.

Regio Aboënsis, par. Lojo, ins. Jalassaari, in prato juxta ripam lacus. 26 Iur. 1937.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1175.

1942. *Thalictrum alpinum* L.

Kuusamo, par. Kuusamo, in prato paludoso juxta ripam rivuli Hiidenjoki. 22 Iul. 1939.

leg. Edv. af Hällström.

In Lapponia satis frequens, in Finlandia boreali tantum loco supra allato lectum est.

1943. *Pulsatilla vernalis* (L.) Mill.

Isthmus Karelicus, par. Valkjärvi, Punnus, in pineto sicco. 11 Mai 1935.

leg. C. Cedercreutz.

In nonnullis Finlandiæ interioris plagis arenosis (vix nisi inter 43° et 48° long) haud infrequenter provenit; ad septentrionem versus supra 61°50' non lecta est.

1944. *Myosurus minimus* L.

Regio Aboënsis, par. Lojo, ins. Jalassari, in colle sicco
juxta villulam Ekeberga. 10 Jun. 1942.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 217.

1945. *Ranunculus cymbalaria* Pursh.

(*R. salsuginosus* Pallas)

Satakunta, ins. Bastuskär prope portum Räfsö, copiose in
litore graminoso maris. 19 Aug. 1938.

leg. Harald Lindberg.

Tantum in vicinitate portus Räfsö nonnullis locis crescit.

1946. *Ranunculus hyperboreus* Rottb.

Kuusamo, par. Kuusamo, Paanajärvi, in semita humida in silva
juxta fl. Mäntyjoki. 16 Jul. 1936.

leg. Harald Lindberg.

In Lapponia et in Finlandia septentrionali raro—satis raro invenitur;
ad meridiem versus usque ad 64°50' progreditur.

1947. *Ranunculus ficaria* L.

var. *obtusissimus* Lindb. fil.

Satakunta, par. Loimaa, Kojonkulma, Kuivakoski, in nemore
una c. f. typica. 20 Mai 1917.

leg. M. Sauramo.

Cfr n. 225, 664, 665, 666.

1948. Asarum europæum (L.)

Isthmus Karelicus, par. Terijoki, Ollinpää, in silva mixta,
umbrosa. 14 Iun. 1935.

leg. L. Fagerström.

Tantum in parte orientali Isthmi Karelici et in par. Hiitola in Karelia australi lectum est.

1949. Nasturtium silvestre (L.) R.Br.

Regio Aboënsis, par. Lojo, ins. Jalassaari, Ahtiala, in horto
fqq. 2 Iul. 1942.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 672, 1182.

1950. Arabis hirsuta (L.) Scop.

Regio Aboënsis, par. Lojo, ins. Storön, pag. Hermala, in
rupe calcarea. 15 Iul. 1942.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 231.

1951. Arabis alpina L.

Kuusamo, par. Kuusamo, pag. Alakitka, Juuma, Hautaniityn-
vuoma, in fonte. 7 Iul. 1936.

leg. Harald Lindberg.

In Lapponia rarius invenitur, etiam locis duobus in par. Kuusamo
in Finlandia septentrionali lecta est.

1952. Cardamine pratensis L. *dentata Schultes.

Tavastia australis, par. Törväntö, Mälkiäinen, Kariniemi,
in fossa. 26 Iun. 1935.

leg. K. Linkola.

Cfr n. 678.

1953. *Stenophragma Thalianum* (L.) Celak.

Regio Aboënsis, par. Lojo, ins. Jalassaari, inter muscos in colle sicco juxta villulam Ekeberga. 11 Iun. 1942.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 235, 680.

1954. *Stenophragma Thalianum* (L.) Celak.

Regio Aboënsis, par. Lojo, Syd-Lojo, Biskopsnäs, in colle sicco. 21 Iun. 1942.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 235, 680, 1953.

1955. *Erysimum cheiranthoides* L. f. *brachysiliqua*.

Regio Aboënsis, par. Lojo, ins. Jalassaari, in cacumine montis contra villulam Ekeberga. 8 Iul. 1942.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 238.

1956. *Erysimum cheiranthoides* L. var. *nodosum* Fr.

Kuusamo, par. Kuusamo, in cultis prope templum. 21 Iun. et 9 Iul. 1936.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 682.

1957. *Erysimum hieraciifolium* L.

Karelia Ladogensis, opp. Sortavala, loco arenoso juxta viam ferratam. 2 Iul. 1938.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1188.

1958. Erysimum hieraciifolium L.

Kuusamo, par. Kuusamo, Paanajärvi, Kauppila, in tecto cellæ.
11 Iul. 1936.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1188, 1957. Specimina distributa ex una radice orta sunt.

1959. Draba cinerea Adams.

(*Dr. hirta* L. var. *brachysiliqua* Mela.)

Kuusamo, par. Kuusamo, Paanajärvi, Ruskeakallio, in rupe
prærupta. 18 Iul. 1936.

leg. Harald Lindberg.

Rarissime tantum in par. Kuusamo crescit. *Dr. cinerea* Adams v.
ladogensis Lindb. fil. in Karelia Ladogensi, prope opp. Sortavala
lecta est (Cfr n. 244, sub n. *Dr. hirta* L. var. *arctica* (J. Vahl)
f. *brachysiliqua* (Mela).

1960. Draba rupestris R. Br.

Kuusamo, par. Kuusamo, pag. Alakitka, Juuma, Jäkälävuoma,
in rupe prærupta, umbrosa. 6 Iul. 1936.

leg. Harald Lindberg.

In Lapponia et in par. Kuusamo raro aut rarissime obvia.

1961. Lepidium densiflorum Schrad.

Karelia Ladogensis, opp. Sortavala, in arenosis in portu.
12 Iul. 1938.

leg. Harald Lindberg.

In ruderalis, saburra etc. in Finlandia australi et media adventi-
cium, sæpe copiose crescens.

1962. Bulliarda aquatica (L.) D.C.

Karelia borealis, par. Juuka, in ripa argillacea juxta lac.
Pielisjärvi, prope templum. 3 Aug. 1942.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 249.

1963. Sedum fabaria Koch.

Isthmus Karelicus, par. Valkjärvi, Veikkola, in agro. 11
Aug. 1934.

leg. Harald Lindberg.

In Finlandia austro-orientali raro aut rarissime occurrit.

1964. Sedum fabaria Koch.

Karelia Ladogensis, par. Suistamo, in agro juxta scholam
publicam. 27 Jul. 1937.

leg. A. J. Huuskonen.

Cfr n. 1963.

1965. Sedum acre L. f. ochroleuca.

Regio Aboënsis, par. Lojo, ins. Jalassaari, in rupe muscosa
juxta villulam Ekeberga. 21 Jun. 1937.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 701.

1966. Sedum sexangulare L.

Alandia, par. Ekerö, pag. Torp, inter muscos in rupe subplana.
17 Jul. 1943.

leg. P. H. Lindberg.

In Alandia passim occurrit.

1967. Saxifraga nivalis L.

Karelia Ladogënsis, par. Impilahti, Raukkiivuoret, in rupe umbrosa. 10 Iul. 1938.

leg. Harald Lindberg.

Cfr 252, 703.

1968. Saxifraga aizoides L.

Kuusamo, par. Kuusamo, pag. Alakitka, Juuma, Jäkälävuoma, in rupe prærupta, humida. 6 Iul. 1936.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 253.

1969. Saxifraga adscendens L.

Regio Aboënsis, par. Lojo, ins. Storön, Hermala, in rupe calcarea. 12 Iun. 1943.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 257.

1970. Parnassia palustris L.

Isthmus Karelicus, par. Valkjärvi, Pähkinämäki, loco scaturiginoso inter *Sphagnum Warnstorffii* et *Paludella*. 25 Iun. 1934.

leg. Harald Lindberg.

In toto territorio invenitur.

1971. Ribes rubrum L. var.

Kuusamo, par. Kuusamo, Paanajärvi, Ruskeakallio, in margine silvæ. 18 Iul. 1936.

leg. Harald Lindberg.

In maxima parte Finlandiæ et Lapponiæ occurrit.

1972. Ribes rubrum L. var. glabellum Trautv. & Meyer.

Kuusamo, par. Kuusamo, Laajusvaara, in umbrosis juxta rivulum. 30 Jun. 1936.

leg. Harald Lindberg.

In Lapponia et in Finlandia septentrionali multis locis lectum est.

1973. Dryas octopetala L.

Kuusamo, par. Kuusamo, pag. Alakitka, Juuma, Jäkälävuoma, in rupe prærupta, umbrosa. 6 Jul. 1936.

leg. Harald Lindberg.

In summis montibus alpinis Lapponiæ sæpe copiose occurrit, etiam in prov. Kuusamo in Finlandia septentrionali lecta est. Subfossilis anno 1897 unico loco in Isthmo Karelico ab Harald Lindberg lecta est.

1974. Geum rivale L. × G. urbanum L.

Regio Aboënsis, par. Lojo, ins. Storön, Hermala, in fruticeto juxta ripam lacus inter parentes crescens. 23 Jun. 1941.

leg. Harald Lindberg.

In Finlandia australi multis locis lectum est.

1975. Rubus suberectus G. Andersson.

Isthmus Karelicus, par. Rautu, Raasuli, in declivibus graminosis. 10 Jul. 1934.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 712.

1976. *Rubus idæus* L. f. *longiseipala* Lindb. fil. n. f.

Regio Aboënsis, par Lojo, ins. Jalassaari, in margine silvæ frondosæ juxta villulam Ekeberga. 16 Iul. 1936.

leg. Harald Lindberg.

Sepalis longe et angustissime apiculatis, foliis profunde et argute dentatis a typo differt. — Harald Lindberg.
Tantum loco supra allato lectus est, aream sat magnam occupans.

1977. *Rubus humilifolius* C. A. Mey.

Tavastia borealis, in silva prope opp. Jyväskylä. 1 Iul. 1942.

leg. G. Marklund.

Cfr n. 262. Locus unicus in Finlandia, etiam multis locis in parte australi Kareliæ rossicæ lectus est.

1978. *Rubus arcticus* L. f. *leuciticus* Fr.

Ostrobottnia media, par. Pedersöre, inter *Polytrichum commune* in abiegno. 17 Iul. 1902.

leg. C. W. Fontell.

Cfr n. 719, 720.

1979. *Potentilla strigosa* Pall., Bunge.

(*P. dasyphylla* Bge, auctor., *P. sericea* auctor.).

Karelia Ladogensis, par. Impilahti, Mälkinvuori in insula Mäkisalo in lac. Ladoga, parce in rupe abrupta. 11 Iul. 1938.

leg. Harald Lindberg.

Tantum in insula Mäkisalo lecta est.

1980. *Potentilla anserina* L.

Regio Aboënsis, par. Lojo, ins. Jalassaari, in ripa arenosa
lacus juxta villulam Ekeberga. 17 Iul.
1941.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 267.

1981. *Potentilla Egedii* Wormsk.

Satakunta, prope opp. Björneborg, in ripa arenosa Sinus
Bottnici juxta portum Mäntyluoto. 19 Aug. 1938.

leg. Harald Lindberg.

Ad litora Sinus bottnici, Maris glacialis et albi occurrit.

1982. *Potentilla argentea* L.

Karelia Ladogensis, par. Impilahti, Raukkiivuoret, in
rupe juxta lac. Ladoga. 10 Iul. 1938.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 728.

1983. *Potentilla impolita* Wahlenb.

Karelia Ladogensis, opp. Sortavala, in monte juxta lac.
Airanne. 2 Iul. 1938.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1210.

**1984. *Potentilla thuringiaca* Bernh. **Goldbachii*
(Rupr.) Th. Wolf.**

Isthmus Karelicus, par. Valkjärvi, Veikkola, in prato
culto, sicco. 24 Iun. 1934.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 730.

1985. *Potentilla nivea* L.

Kuusamo, par. Kuusamo, Ruskeakallio, in rupe sicca, abrupta
juxta lac. Paanajärvi. 14 Jul. 1936.

leg. Harald Lindberg.

In summis montibus alpinis aut subalpinis Lapponiæ raro occurrit,
etiam locis nonnullis prov. Kuusamo lecta est.

1986. *Alchemilla glomerulans* Buser.

Kuusamo, par. Kuusamo, Paanajärvi, in prato humido juxta
fl. Mäntyjoki, una c. *Sphagn. Warnstorffii*, *Erioph.*
latif. crescens. 15 Jul. 1936.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1216.

1987. *Alchemilla nebulosa* Samuels.

Karelia Ladogensis, par. Sortavala, Rausku, in colle
graminoso in margine silvæ. 3 Jul.
1938.

leg. Harald Lindberg.

In Finlandia austro-orientali crescit.

1988. *Sanguisorba minor* Scop. **dietyocarpa* (Spach) Gams.

Alandia, opp. Mariehamn, Badhusparken, parce loco gramirioso
in margine viæ, qusp.(?). 22 Aug. 1942.

leg. Harald Lindberg.

Tantum loco supra allato in Finlandia lecta est.

1989. Agrimonia eupatoria L.

Regio Aboënsis, par. Lojo, ins. Storön, Hermala, in colle
graminoso juxta ripam lacus. 29 Jul. 1938.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 272.

1990. Sorbus fennica (Kalm) Bab.

Alandia, par. Ekerö, inter Storby et Käringsund, arbor vetusta.
26 Aug. 1942.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1224.

1991. Anthyllis vulneraria L. *affinis (Brittinger).

Savonia borealis, par. Jorois, Torstila, loco lapidoso aperto
in jugo pinifero. 29 Jul. 1942.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 757.

1992. Trifolium arvense L.

Regio Aboënsis, par. Lojo, ins. Jalassaari, Ahtiala, loco
arenoso in margine silvæ. 3 Aug. 1943.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 762.

1993. Trifolium arvense L.

Isthmus Karelicus, par. Rautu, in campo arenoso juxta
stationem viæ ferratæ Rautu. 6 Jul. 1934.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 762, 1992

1994. Trifolium montanum L.

K a r e l i a L a d o g e n s i s, opp. Sortavala, loco graminoso in rupe juxta Seminarium. 16 Iul. 1938.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1228.

1995. Trifolium procumbens L.

(*Tr. campestre* Schreb.).

S a t a k u n t a, locis arenosis in portu Mäntyluoto prope opp. Björneborg. 19 Aug. 1938.

leg. Harald Lindberg.

In saburra etc. raro occurrit; etiam aliis cum seminibus introductum est.

1996. Oxycrpis campestris (L.) D.C. f. sordida (Willd.).

K u u s a m o, par. Kuusamo, Paanajärvi, in campo arenoso, graminoso in insula Hietasaari juxta Kauppila. 11 Iul. 1936.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 768, 769.

1997. Phaca frigida L.

K u u s a m o, par. Kuusamo, Tulilammen kangas, in pineto vetusto, vegeto. 26 Iun. 1936.

leg. Harald Lindberg.

In Lapponia passim copiose invenitur; etiam locis multis in prov. Kuusamo lecta est.

1998. *Vicia tetrasperma* (L.) Moench.

Regio Aboënsis, par. Lojo, irs. Storön, Hermala, inter frutices in rupe muscosa. 4 Iul. 1942.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 276.

1999. *Lathyrus silvester* L.

Regio Aboënsis par. Lojo, Syd-Lojo Kauria, in graminosis prope Biskopsnäs. 12 Iul. 1938.

leg. Harald Lindberg.

In Finlandia australi ad c. 62° satis raro aut raro occurrit.

2000. *Vicia cassubica* L.

Regio Aboënsis, par. Tenala, Seuko, Sundet, copiose in colle graminoso. 19 Iul. 1942; fruct. Sept. 1942 leg. B. Lindström.

leg. Harald Lindberg.

Locus unicus in Finlandia, anno 1936 detexit dom. E. F. af Hällström.

2001. *Geranium pratense* L.

Kuusamo, par. Kuusamo, Paanejärvi, Kauppila in colle sicco juxta domos. 26 Iun. 1936.

leg. Harald Lindberg.

In Finlandia orientali usque ad 67°10' procedit et multis plagis copiose provenit, in parte occidentali raro et cis 42° long. vix nisi efferatum occurrit.

2002. Geranium pusillum L.

Regio Aboënsis, par. Lojo, ins. Storön, Hermala, in rupe muscoso, sicco. 4 Iul. 1942.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 785.

2003. Linum catharticum L.

Alandia, par. Jomala, Möckelö, fqq. in litore graminoso maris. 23 Aug. 1942.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 283 a, b, 790, 791, 1232.

2004. Polygala amarellum Crantz.

Karelia Ladogensis, par. Sortavala, loco scaturiginoso juxta lac. Helmijärvi. 29 Iun. 1938.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 284, 793, 794.

2005. Euphorbia humifusa Willd.

Nylandia, in Horto botanico Helsingforsiae, efferata. 5 Aug. 1937.

leg. M. Puolanne.

2006. Euphorbia humifusa Willd.

Nylandia, in Horto botanico Helsingforsiae, efferata. 30 Aug. 1937.

leg. Martta Vällä.

Cfr n. 2005.

2007. Euphorbia nutans Lag.

Nylandia, in Horto botanico Helsingforsiae, efferata. 5 Aug.
1937.

leg. M. Puolanne.

2008. Tilia cordata Mill.

Tavastia australis, par. Sääksmäki, Ikkala, Uotila. 23
Aug. 1936.

leg. K. Linkola.

Cfr n. 805, 1237, 1238, 1239.

2009. Elatine hydropiper L.

Isthmus Karelicus, par. Valkjärvi, in ripa argillacea lac.
Valkjärvi. 11 Aug. 1934.

leg. Harald Lindberg.

In Finlandia australi et media plerumque passim invenitur; ad
septentrionem raescit, sed usque ad 67°12' procedit.

2010. Viola epipsila Ledeb.

Savonia borealis, par. Pielavesi, Taipale, Heinikanmäki,
in silva mixta nemorosa. 16 Iun. 1939.

leg. O. Kyyhkynen.

Cfr n. 1245.

2011. Viola epipsila Ledeb. × **V. palustris** L.

Savonia borealis, par. Pielavesi, Taipale, Heinikanmäki,
in margine fossae in nemore. 16 Iun. 1939.

leg. O. Kyyhkynen.

Cfr n. 1246, 2010.

2012. Viola canina L. *ericetorum Schrad.

Isthmus Karelicus, par. Sakkola, Suvantola, loco arenoso
siccio juxta viam ferream. 9 Iul. 1934.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 291.

2013. Viola tricolor L.

Regio Aboënsis, par. Lojo, ins. Jalassaari, inter muscos in
rupe. 22 Iun. 1942.

leg. Harald Lindberg.

In Finlandia australi frequenter provenit; jam circa 62° rarescere
incipit, sed usque ad 66°15' in parte septentr.-orientali lecta est;
in Lapponia tantum in parte orientali occurrit.

2014. Chamænerium angustifolium L.

f. *albiflorum* Hausskn.

Nylandia, opp. Ekenäs, loco arenoso juxta oppidum. 10 Jul. 1942.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 298. F. *albiflorum* Hausskn. rarissime in Finlandia crescit.

2015. Chamænerium angustifolium L.

f. *roseum* Lindb. fil.

Isthmus Karelicus, par. Sakkola, Suvantola, loco arenoso
juxta viam ferratam. 9 Iul. 1934.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 816, 1257. F. *roseum* Lindb. fil. rarissime in Finlandia lectum
est.

2016. *Epilobium montanum* L.

N y l a n d i a, in Horto botanico Helsingforsiae, in graminosis umbrosis una c. *E. hypericifolio* (n. 2017) crescens. 27 Iun. 1940.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 299.

2017. *Epilobium hypericifolium* Tausch.

N y l a n d i a, in Horto botanico Helsingforsiae, in graminosis umbrosis una c. *E. montano* (n. 2016) crescens. 27 Iun. 1940.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 817.

2018. *Epilobium collinum* Gmel.

K a r e l i a L a d o g e n s i s, opp. Sortavala, loco sicco ad radicem montis. 9 Iul. 1938.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 300.

2019. *Epilobium obscurum* Schreb.

I s t h m u s K a r e l i c u s, par. Valkjärvi, Pähkinämäki, in fonte. 10 Aug. 1938.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 820.

2020. *Epilobium adenocaulon* Hausskn.

I s t h m u s K a r e l i c u s, par. Sakkola, in ripa lac. Suvanto, prope templum. 17 Aug. 1934.

leg. Harald Lindberg.

His annis in Finlandia australi multis locis lectum est.

2021. *Epilobium adenocaulon* Hausskn.

Isthmus Karelicus, par. Valkjärvi, Päsuri, in ripa arenosa
fl. Vuoksen. 14 Aug. 1934.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 2020.

2022. *Epilobium adenocaulon* Hausskn.

Karelia Ladogensis, opp. Sortavala, in ripa lac. Ladoga,
infra Seminarium. 4 Iul. 1938.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 2020, 2021.

2023. *Epilobium rutescens* Rydberg.

Satakunta, par. Kokemäki, Koomarkangas. 1 Aug. 1938.

leg. L. Pohjala.

Cfr n. 1259, 1260.

2024. *Epilobium palustre* L.

Karelia borealis, par. Juuka, in ripa graminosa lac. Pielis-
järvi, prope templum, una c. f. *albiflorum*
(n. 2025) crescens. 3 Aug. 1942.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 301.

2025. *Epilobium palustre* L. f. *albiflorum*.

Karelia borealis, par. Juuka, in ripa graminosa lac. Pielis-
järvi, prope templum, una c. f. *typica*
(n. 2024) crescens. 3 Aug. 1942.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 301, 2024.

2026. *Epilobium palustre* f. *lapponicum* Hausskn.

K u u s a m o, par. Kuusamo, Paanajärvi, inter muscos (*Philonotis fontana*) juxta fl. Mäntyjoki. 19 Iul. 1936.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 301, 2024, 2025.

2027. *Epilobium davuricum* Fisch.

K u u s a m o, par. Kuusamo, Paanajärvi, loco scaturiginoso in silva. 20 Iul. 1936.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1261.

2028. *Epilobium alsinifolium* Vill.

K u u s a m o, par. Kuusamo, Laajusvaara, inter muscos loco scaturiginoso. 30 Iun. 1936.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1262.

2029. *Epilobium Hornemanni* Rchb.

K u u s a m o, par. Kuusamo, Paanajärvi, inter muscos loco scaturiginoso juxta fl. Mäntyjoki. 19 et 28 Jul. 1936.

Cfr n. 1264.

leg. Harald Lindberg

2030. *Epilobium Hornemanni* Rchb. × *E. palustre* L.

K u u s a m o, par. Kuusamo, Paanajärvi, inter muscos loco scaturiginoso juxta fl. Mäntyjoki. 19 et 28 Iul. 1936.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 2029.

2031. Myriophyllum spicatum L. f. »*squamosum*» Læst.

K u s a m o, par. Kuolajärvi, lac. Vuorijärvi, juxta effluvium.
19 Sept. 1909.

leg. Edv. af Hällström.

Cfr n. 823, 824.

2032. Selinum carvifolia L.

A l a n d i a, par. Finström, Björkö, in litore maris graminoso.
5 Sept. 1942.

leg. Harald Lindberg.

In Finlandia australi rarius legitur, ad septentrionem versus 60°40'
vix superat.

2033. Angelica silvestris L.

R e g i o A b o ë n s i s, par. Lojo, ins. Jalassaari, in nemore juxta
villulam Ekeberga. 5 et 20 Aug. 1936.

leg. Harald Lindberg.

In tota Finlandia frequenter—satis frequenter provenit.

2034. Lacerpicium latifolium L.

A l a n d i a, par. Ekerö, pag. Torp, in colle silvatico. 16 Jul. 1943.

leg. Harald Lindberg.

In Alandia passim invenitur; etiam in ins. Korpo in Reg. Aboënsi
lectum est.

2035. *Torilis anthriscus* (L.) Gmel.

Alandia, par. Geta, ins. Dårö, Iul. 1909.

leg. J. Montell.

Tantum paucis locis in Alandia lecta est.

2036. *Chærophyllum Prescottii* (D.C.)

Kuusamo, par. Kuusamo, in prato juxta templum. 25 Iun. 1936.

leg. Harald Lindberg.

In parte orientali Firlandiæ septentrionali et in Lapponia sat frequenter aut passim provenit.

2037. *Pyrola minor* L. × *P. rotundifolia* L.

Kuusamo, par. Kuusamo, in abiegno humido juxta rivulum Lippihetteenoja una c. *P. rotundifolia* crescens (*P. minor* hoc loco haud visa). 26 Iun. 1936.

leg. Harald Lindberg.

Tantum locis nonnullis in territorio lecta est.

2038. *Arctostaphylos alpina* (L.) Spreng.

Kuusamo, par. Kuusamo, Paanajärvi, in monte Pieni Mäntytunturi. 26 Iul. 1936.

leg. Harald Lindberg.

In omnibus montibus subalpinis Lapponiæ et Finlandiæ septentrionalis frequenter provenit; etiam loco unico in maxime austro-occidentali parte lecta est.

2039. *Arctostaphylos alpina* (L.) Spreng.

L a p p o n i a K e m e n s i s, par. Muonio, Olostunturi, reg. alp.
24 Jul. 1935.

leg. R. Sarvas.

Cfr n. 2038.

2040. *Primula veris* L.

K a r e l i a L a d o g e n s i s, par. Sortavala, Vuorlahti, in colle
betulifero. 28 Jun. 1938.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 854 a, b.

2041. *Primula veris* L.

I s t h m u s K a r e l i c u s, par. Pyhäjärvi, Rantakylä, in prato
frondoso juxta lac. Ladoga. 30 Jun.
1934.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 854 a, b, 2040.

2042. *Gentiana campestris* L. **germanica* (Froel.) Murb.

N y l a n d i a, par. Esbo, Bodom, Tuvkulla, in prato. 26 Aug. 1921.

leg. C. Cedercreutz.

Cfr n. 323, 860.

2043. *Gentiana amarella* L. **lingulata* (C. A. Agardh) Aresch.

K a r e l i a b o r e a l i s, par. Juuka, in colle graminoso, betulifero
inter Polvela et Tahkovzara. 6 Aug. 1942.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1281.

2044. *Gentiana amarella* L. **lingulata* (C. A. Agardh) Aresch.

Kuusamo, par. Kuusamo, Paanajärvi, Paavola, in colle graminoso juxta ripam lacus. 30 Jul. 1936.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1281, 2043.

2045. *Gentiana amarella* L.axillaris* (Schmidt) Murb.**

Regio Aboënsis, par. Lojo, ins. Storön, Askola, in margine graminoso viæ. 10 Sept. 1943.

leg. Harald Lindberg.

In tota Finlandia usque ad 67°10' satis raro — raro occurrit, sed nonnullis plagis in media parte reperta non est.

2046. *Gentiana uliginosa* Willd.

Alandia, par. Ekerö, Skag, in litore graminoso maris. 28 Aug. 1942.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 861, 862.

2047. *Gentiana uliginosa* Willd.

Alandia, par. Finström, Björkö, in litore graminoso maris. 30 Aug. 1942.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 861, 862, 2046.

2048. *Gentiana uliginosa* Willd.

Alandia, par. Jomala, in litore graminoso maris juxta Rams-
holmen. 23 Aug. 1942.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 861, 862, 2046, 2047.

2049. Erythræa pulchella (Sw.) Fr.

Alandia, par. Jomala, Möckelö, in litore graminoso maris. 22
Aug. 1942.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 326.

2050. Polemonium coeruleum L.

Karelia Ladogensis, par. Impilahti, ins. Mäkisalo, loco
graminoso. 11 Iul. 1938.

leg. Harald Lindberg.

In parte occidentali vix nisi efferatum, ad orientem versus prorsus
spontaneum. In Finlandia septentrionali et in Lapponia non
crescit.

2051. Eritrichium villosum (Ledeb.) Bunge.

Rossia, Lapponia Tulomensis, Tshipnavolok, una c.
Empetro in glareosis
juxta mare. 16 Iul.
1909.

leg. F. W. Klingstedt.

Cfr n. 869.

2052. Lappula deflexa (Wahlenb.) Garcke.

Karelia Ladogensis, par Impilahti, ins. Mäkisalo, Mälki-
vuori, in glareosis juxta ripam lac.
Ladoga. 11 Iul. 1938.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 870.

2053. *Achusa arvensis* (L.) M.B.

Alandia, par. Hammarland, Djäkenböle, in agro *Tritico* consito.
30 Aug. 1942.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 871.

2054. *Myosotis scorpioides* L.

Karelia borealis, par. Juuka, in ripa humida lac. Pielisjärvi, prope templum. 3 Aug. 1942.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1286.

2055. *Myosotis scorpioides* L. var. *strigulosa* Rehb.

Nylandia, par. Borgå, Pellinge, ins. Delholmen, in litore maris.
18 Iul. 1934.

leg. G. Marklund.

Cfr n. 1286, 2054.

2056. *Myosotis scorpioides* L. var. *micrantha* Opiz.

Isthmus Karelicus, par. Metsäpirtti, Taipale, in ripa humida lac. Ladoga, una c. *M. scorpioides* f. *typ.* et *M. caespitosa* *crescens*.
26 Iun. 1934.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1286, 2054, 2055.

2057. *Myosotis laxa* Lehm.

Alandia, ins. Ekerö, Storby, Käringsund, in litore glareoso maris. 27 Aug. 1942.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 875, 1287.

2058. *Myosotis micrantha* Pall.*(M. stricta* Link).

Regio Aboënsis, par. Lojo, ins. Storön, inter muscos in colle sicco inter Paavola et Hermala. 12 Iun. 1942.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1288.

2059. *Myosotis micrantha* Pall.*(M. stricta* Link).

Regio Aboënsis, par. Lojo, Syd-Lojo, Biskopsnäs, in colle sicco. 21 Iun. 1942.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1288, 2058.

2060. *Myosotis collina* Hoffm.

Regio Aboënsis, par. Lojo, ins. Jalassaari, in colle sicco inter muscos juxta villulam Ekeberga. 11 Iun. 1942.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 876, 1289, 1290.

2061. *Myosotis arvensis* (L.) Hill.

Regio Aboënsis, par. Karis, Hållsnäs, in rupe. 26 Iun. 1942.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 878.

2062. *Mentha litoralis* Hartm.

Alandia, par. Finström, Bergö, Husö, copiose in litore maris in margine fruticeti (*Hippophaës*), (tantum hæc forma). 1 Sept. 1942.

leg. Harald Lindberg.

Tantum in litoribus Alandiæ.

2063. *Mentha litoralis* Hartm.

Alandia, par. Finström, Björkö, copiose in margine fruticeti in litore maris (tantum hæc forma). 31 Aug. 1942.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 2062.

2064. *Mentha litoralis* Hartm.

Alandia, par. Finström, Björkö, in litore maris (tantum hæc forma). 31 Aug. 1942.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 2062, 2063.

**2065. *Mentha litoralis* Hartm. var. *interrupta* Lindb. fil.
(? *M. arvensis* L. × *M. litoralis* Hartm.).**

Alandia, par. Ekerö, Storby, inter muscos in declivibus fontanis copiose crescens (tantum hæc forma). 27 Aug. 1942.

leg. Harald Lindberg.

Tantum in Alandia raro crescit, numquam in litoribus.

**2066. *Mentha litoralis* Hartm. var. *interrupta* Lindb. fil.
(? *M. arvensis* L. × *M. litoralis* Hartm.).**

Alandia, par. Saltvik, Kvarnbo, in rivulo juxta molam copiose crescens (tantum hæc forma). 4 Sept. 1942.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 2065.

**2067. *Mentha alandica* Lindb. fil. n.sp.
(? *M. aquatica* L. × *M. arvensis* L.).**

Alandia, par. Finström, Björkö, in margine fruticeti in prato frondoso, copiose crescens (tantum hæc forma).

leg. Harald Lindberg.

Planta simplex, 20—30 cm alta, hirsuta, calycibus parvis, viridibus, non vel obsolete plicatis, hirsutis, dentibus angustis, acutissimis, pedicellis hirsutis, floribus subfemineis, pallide violaceis. — Harald Lindberg.

2068. *Mentha arvensis* L. *palustris (Moench).
(*M. arvensis* L. var. *riparia* Fr.).

K a r e l i a b o r e a l i s, par. Juuka, copiose in ripa humida lac. Pielisjärvi, prope templum. 3 Aug. 1942.

leg. Harald Lindberg.

M. arvensis L. coll. per totum fere territorium dispersa est.

2069. *Origanum vulgare* L.

A l a n d i a, par. Lemland, ins. Granholm, inter frutices in declivibus siccis juxta mare. 21 Jul. 1943.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 333, 885.

2070. *Thymus serpyllum* L.

K u u s a m o, par. Kuusamo, pag. Alakitka, Juuma, Jäkälävuoma, in rupe prærupta, umbrösa. 6 Jul. 1936.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 886, 887.

2071. *Thymus serpyllum* L.

K u u s a m o, par. Kuusamo, Paanajärvi, Kauppila, ins. Hieta-saari. 11 Jul. 1936.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 886, 887, 2070. Specimina distributa ex eodem grege capta sunt. Hæc forma foliis latioribus in Finlandia rara est.

2072. Calamintha acinos (L.) Clairv.

Isthmus Karelicus, par. Pyhäjärvi, Rantakylä, loco arenoso juxta lac. Ladoga. 30 Jun. 1934.

leg. Karin Fonselius.

Cfr n. 335.

2073. Dracocephalum thymiflorum L.

Isthmus Karelicus, par. Terijoki, in campo juxta stationem viæ ferratæ. 19 Jun. 1935.

leg. L. Fagerström.

Cfr n. 1294.

2074. Dracocephalum Ruyschiana L.

Karelia Ladogensis, par. Impilahti, Raukkiivuoret, in rupe fqq. 10 Jul. 1938.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 890, 891.

2075. Galeopsis ladanum L.

Isthmus Karelicus, par. Valkjärvi, Nousiala, in campo arenoso. 3 Jul. 1934.

leg. Harald Lindberg.

Multis plagis inprimis in orientali parte Finlandiæ occidentalis satis frequenter aut frequenter provenit; aliis autem raro aut non obviam; ad septentrionem versus saltem ad 63° progreditur.

2076. Brunella vulgaris L. var. *parviflora* (Poir.).

Alandia, par. Ekerö, Öra, in graminosis in margine viæ. 13 Jul. 1943.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 342.

2077. *Ajuga reptans* L.

Isthmus Karelicus, par. Terijoki, Käkösenpää, in agro.
10 Iun. 1938.

leg. L. Fagerström.

Cfr n. 343, 903, 1300.

2078. *Veronica spicata* L.

Alandia, par. Ekerö, Skag, in litore lapidoso maris. 12 Iul. 1943.

leg. Harald Lindberg.

In Alandia satis frequenter — frequenter provenit, in reliqua Finlandia maxime austro occidentali rarissime visa est. Etiam in Karelia rossica lecta est.

2079. *Melampyrum cristatum* L.

Alandia, par. Ekerö, Skag, in fruticeto in litore maris. 12 Iul. 1943.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 940, 941.

2080. *Melampyrum cristatum* L. var. *pallens* Hartm.

Alandia, par. Ekerö, Skag, inter frutices in rupe haud procul a mare. 13 Iul. 1943.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 940, 941, 2079.

2081. *Hypochoeris maculata* L.

Regio Aboënsis, par. Lojo, ins. Storön, Hermala, in betuleto.
30 Iun. 1943.

leg. Harald Lindberg.

Cfr n. 1405.

INDEX

fasc. I—XLII, n. 1—2081.

- Achillea millefolium* L. 388
 — *ptarmica* L. 387 a, 387 b
Aconitum lycoctonum L.
 **septentrionale* Koelle 652
Acorus calamus L. 551
Actæa erythrocarpa Fisch 1939
Adoxa moschatellina L. 369,
 961, 962
Ægopodium podagraria L. 827,
 828
Æthusa cynapium L. 303, 834
Agrimonia eupatoria L. 272, 1989
Agropyron caninum (L.) 83,
 1063, 1826
 — *fibrosum* (Schrenk)
 Nevski 1827, 1828
 — *junceum* (L.) × *A. re-*
 pens (L.) 489, 1064
 — *repens* L. α *vulgare* Döll 84
 — — var. *cæsium* (Presl) 488
Agrostemma githago L. 200
Agrostis borealis Hartm. 453,
 1046
 — *canina* L. var. *arida*
 Schlecht. 1810
 — *clavata* Trin. 48, 454
 — *stolonifera* L. 47, 1043, 1809
 — *tenuis* Sibth. 452, 1044
 — — var. *aristata* (Hartm.) 1045
 — *spica venti* L. 49
Aira atropurpurea (Wah-
 lenb.) Scheele 58
 — *bottnica* Wahlenb. 56, 464
 — — × *A. cæspitosa* L. 465—469
 — *cæspitosa* L. 57
 — *flexuosa* L. 463
 — *praecox* L. 1047
Ajuga pyramidalis L. 904
 — *reptans* L. 343, 903, 1300, 2077
Alchemilla acutangula Bu-
 ser 1219
 — — var. *adpresse-pilosa*
 Lindb. fil. 740
 — *acutidens* Buser 743—745
 — *alpestris* Schmidt 1218
 — *glomerulans* Buser 1216, 1986
 — *hirsuticaulis* Lindb. fil. 269,
 734, 1213—1215
 — *micans* Buser 1220
 — *minor* Huds. 741
 — — **filicaulis* (Buser)
 Lindb. fil. 742
 — *nebulosa* Samuels. 1987
 — *obtusa* Buser 746, 1217
 — *pastoralis* Buser 737
 — *plicata* Buser 271 a, b, 736
 — *pubescens* (Lam.) Buser 270,
 735
 — *strigosula* Buser 738
 — *subcrenata* Buser 739
Alectorolophus major
 (Ehrh.) Rchb. 1331
 — — **montanus* (Sauter)
 Fritsch 1332
 — *minor* (Ehrh.) Wimm.
 et Grab. 933, 934, 1333
 — — **stenophyllus* (Schur)

- Sterneck f. maculiferus
 Lindb. fil. 935, 1334
Alisma plantago aquatica
 L. *Michaletii Aschers.
 et Græbn. 35
 — *Wahlenbergii* Holmberg 1802,
 1803
Alliaria officinalis Andrzej. 237,
 1187
Allium oleraceum L. 1863
 — *schoenoprasum* L. 161
 — *strictum* Schrad. 572,
 1103, 1104
 — *ursinum* L. 570, 571
 — *vineale* L. 573
Alnus glutinosa (L.) Gært. 178
 — — f. *minutifolia* Lindb.
 fil. 1129
 — — × *A. incana* (L.)
 DC. 1130, 1900, 1901
 — *incana* (L.) DC. 1131, 1902
 — — f. *lobata* Larss. 1132
 — — var. *argentata* Norrl. 1903
 — — — f. *pinnatipartita*
 (Norrl.) 179
 — — var. *borealis* Norrl. 1133
Alopecurus arundinaceus
 Poir. α *ruthenicus*
 (Weinm.) Marsson. 446
 — — var. *exserens* (Gri-
 seb.) Marsson. 447
 — — × *A. geniculatus*
 L. 448, 871
 — — × *A. pratensis* L. 449
 — *fulvus* Sm. 45
 — *geniculatus* L. 450
 — — × *A. pratensis* J. 451
 — *pratensis* L. 44
Alsine verna (L.) Bartl. 1160,
 1927
Anchusa arvensis (L.) M.
 Bieb. 1041, 2053
Andromeda polifolia L. 316
Androsaces filiforme Ret-
 zius 321
 — *septentrionale* L. 320,
 851, 852, 1277
Anemone hepatica L. 215
 — — f. *alba* (Mill.) 653
 — *nemorosa* L. 654
 — *ranunculoides* L. 216
Angelica silvestris L. 2033
Antennaria dioeca (L.)
 Gært. 1379, 1380
Anthemis arvensis L. 976
 — *tinctoria* L. 975
Anthoxanthum odoratum
 L. 37 a, 37 b, 1038
Anthriscus silvester (L.)
 Hoffm. 835
Anthyllis vulneraria L.
 **affinis* (Brittinger) 757, 1991
 — — **eu-vulneraria*
 Lindb. fil. 756
Aquilegia vulgaris L. α
pratensis Kittel 213
Arabis alpina L. 1951
 — *arenosa* Scop. 1185
 — *hirsuta* (L.) Scop. 231, 1950
Arctium lappa L. 1397
 — *minus* (Hill) Bernh. 985
 — *tomentosum* Mill. 1398
Arctostaphylos alpina (L.)
 Spreng. 2038, 2039
 — *uva ursi* (L.) Spreng. 315
Arenaria ciliata L.* *pseudo-*
frigida Ostf. et Dahl 1928
 — *serpyllifolia* L. var. *vis-*
cida (Loisl.) Aschers 205
Arnica alpina (L.) Olin 1394
Artemisia absinthium L. 391
 — *campestris* L. 981, 982, 1390—
 1392
 — *vulgaris* L. 980
Asarum europæum L. 1137, 1948
Asperugo procumbens L. 1284
Asperula odorata L. 1349
 — *tinctoria* L. 1350
Aspidium cristatum (L.)
 Sw. 404

- — × *A. eu-spinulosum*
 Aschers 4
 — *dryopteris* (L.) Baumg. 2
 — *filix mas* (L.) Sw. 3
 — *phegopteris* (L.) Baumg. 403
 — *Robertianum* (L.) Luers-
 sen 1774
 — *spinulosum* (Müller) Sw.
 **dilatatum* (Hoffm.) Sw. 406
 — — **eu-spinulosum*
 Aschers 405
 — *thelypteris* (L.) Sw. . . 1775
Asplenium adulterinum
 Milde 1779
 — *septentrionale* (L.)
 Hoffm. 6
 — *trichomanes* L. 408
 — *viride* Huds. . . 5, 1780, 1781
Aster sibiricus L. var. *sub-*
 integerrimus Trautv. . . 1365
 — *tripolium* L. 379
Astragalus alpinus L. . . 770, 771
Athyrium crenatum (Som-
 merf.) Rupr. 4
 — *filix femina* (L.) Roth 404, 402
Atropis distans (L.) Griseb. 483
 — — *f. pulvinata* Fr. . . 72, 484
Atriplex hastatum L. var.
 validum (Mert. et Koch)
 Marss. 491
 — *patulum* L. var. *sarco-*
 phyllum Neum. et Ahlf-
 vengr. 1917
 — *prostratum* Bouch. . . 1918
Avena pratensis L. . . . 55, 461
 — *pubescens* Huds. 54
 — — var. *alpina* Gaud. . . 460
 — *strigosa* Schreb. 53
Barbarea stricta Andrzej-
 owski 673
 — *vulgaris* R. Br. var. *ar-*
 cuata (Opiz) Fr. 1184
Bartschia alpina L. . . 922, 1308
Berteroa incana (L.) DC. . 683,
 1191, 1192
Betula concinna Gunnarss.
 × *B. coriacea* Gunnarss.
 × *B. pubescens* Ehrh.
 **suecica* Gunnarss. ×
 B. verrucosa Ehrh. f.
 Palmeri Gunnarss. . . . 1124
 — *nana* L. 1125, 1126
 — — × *B. pubescens* Ehrh. 1128,
 1899
 — — × *B. tortuosa* Ledeb. 1127
 — — × *B. verrucosa* Ehrh. 594
 — — — *f. cordifolia* Lindb.
 fil. 595, 596
 — *pubescens* Ehrh. **car-*
 patica Willd. 177
 — *verrucosa* Ehrh. l. *bir-*
 calensis Mela 592 593
 — — l. *lobulata* C. Ander-
 son 590, 591
Bidens cernuus L. 1385
 — — *f. minima* (L.) . . . 1386
 — — var. *radiatus* DC. . . 386
 — *radiatus* Thuill. 385, 973-1384
 — — × *B. tripartitus* L. 974
 — *tripartitus* L. 384 a
 — — *f. pumilus* Roth. . . 384 b
Botrychium lunaria (L.)
 Sw. 1005, 1782
 — *matricariæ* (Schrank)
 Sprengel 412
 — *simplex* Hitchcock, for-
 mæ 8
 — *virginianum* (L.) Sw. . . 9
Brachypodium pinnatum
 (L.) PB. 82 a, 82 b, 1824
 — *silvaticum* (Huds.) PB. 1825
Brassica campestris L. 1189, 1190
Briza media L. 472
Bromus arvensis L. . . . 486, 487
 — *inermis* Leysser 79, 1821
 — *japonicus* Thunb. . . . 1823
 — *mollis* L. 81, 1062
 — *secalinus* L. 80
 — *squarrosus* L. 1822
Brunella vulgaris L. 902

- — var. *parviflora* (Poir.) 342,
 2076
Bulliarda aquatica (L.) DC. 249,
 1962
Bunias orientalis L. 694
Butomus umbellatus L. 36
Cakile maritima Scop. 695
Calamagrostis arenaria (L.)
 Roth 52
 — *arundinacea* (L.) Roth 459
 — *epigeios* (L.) Roth. 51 a, 51 b
 — — f. *laviculmis* Lindb.
 fil. 458
 — *lanceolata* Roth. × *C.*
 neglecta (Ehrh.) Fr. 455
 — *lapponica* (Wahlenb.)
 Hartm. 456, 1812
 — *neglecta* (Ehrh.) Fr. 457
 — — × *C. purpurea* Trin. 1811
 — *purpurea* Trin. 50
Calamintha acinos (L.)
 Clairv. 335, 2072
 — *clinopodium* Spenner 336 a,
 336 b, 888
Callitriche vernalis Kütz. 802
Calla palustris L. 552
Calluna vulgaris (L.) Salisb. 318
Caltha palustris L. 649—651
Camelina linicola Sch. et Sp.
 **macrocarpa* (Heuff.) 1198,
 1199
Campanula aparinoides
 Pursh 1362
 — *cervicaria* L. 1363
 — *glomerata* L. 376 a, 376 b
 — *patula* L. 374
 — *persicifolia* L. 375
 — *rapunculoides* L. 372
 — *rotundifolia* L. *a* *scabri-*
 riusecula (Mert. et Koch) 967
 — *trachelium* L. 373, 1361
Capsella bursa pastoris (L.)
 Mönch. 247, 692
Cardamine amara L. 233
 — *hirsuta* L. **multicaulis*
 Hoppe 232, 677
 — *parviflora* L. 675, 676
 — *pratensis* L. 678
 — — **dentata* Schultes 1952
Carduus crispus L. 1399
Carex acutiformis Ehrh. 140
 — *alpina* Sw. 121, 1847
 — *aquatilis* Wahlenb. 114
 — — × *C. Goodenoughii*
 Gay 115
 — — : *C. salina* Wahlenb.
 **cuspidata* Wahlenb.
 a *kattegatensis* (Fr.)
 Almqu. 116 a
 — — : *C. salina* Wahlenb.
 **cuspidata* Wahlenb. *a*
 kattegatensis (Fr.) Alm-
 qu. f. *ostrobotnica*
 Almqu. 116 b
 — *arenaria* L. 105, 1837
 — *aristata* R. Br. f. *Sieger-*
 tiana (Uechtr.) Aschers. 141,
 1854
 — *atrata* L. 122
 — *brunnescens* (Pers.) Poir. 110
 — — × *C. Lachenalii*
 Schkuhr 1081
 — — × *C. loliacea* L. 1080
 — *Buxbaumii* Wahlenb. 120
 — *cæspitosa* L. 1844, 1845
 — *canescens* L. 515
 — — × *C. dioeca* L. 108,
 516, 517, 1078
 — — : *C. loliacea* L. 1079
 — — : *C. norvegica* Willd. 109 a,
 109 b
 — *capillaris* L. 132 a, 132 b
 — *capitata* L. 102, 507
 — *caryophyllea* Latouretti 125
 — *chordorrhiza* Ehrh. 1072
 — — f. *sphagnicola* Læst. 1073
 — *contigna* Hoppe 511,
 1074, 1838

- *cyperoides* L. 104,
508, 1071, 1834, 1835
- *diandra* Schrank 1075, 1076
- *digitata* L. 133, 1091
- — f. *pallens* Fristedt . . 1850
- — × *C. ornithopus*
Willd. 1092
- *dioeca* L. 1070 a, 1070 b
- — × *C. heleonastes*
Ehrh. 1833
- *disperma* Dewey . . 111, 519
- *distans* L. 135 a, 135 b
- *disticha* Huds. 1836
- *elongata* L. 1840, 1841
- *ericetorum* Poll. 124, 530
- *extensa* Good. 540
- *filiformis* L. 1099
- *flava* L. 136
- — f. *dispersa* Neum. . . 1095
- — × *C. Oederi* Ehrh. 137 a—c
- *glareosa* Wahlenb. 113,
1083, 1842
- *glauca* Murray f. *typica*
Aschers. et Græbn. 128
- *globularis* L. 123 a—c
- *Goodenoughii* Gay. . . 1846
- *gracilis* Curtis **fluvia-*
tilis (Hartm.) Lindb. fil. . 525
- — **personata* (Fr.) . 526
Lindb. fil. 526
- *heleonastes* Ehrh. 514
- *hirta* L. 550
- *holostoma* Drej 1848
- *Hornschuchiana* Hoppe
var. *eckeröensis* Lindb
fil. et Palmgren 537, 538
- — — × *C. Oederi* Ehrh. . 539
- *Hudsonii* A. Bennett . . 1085,
1843
- *jentlandica* Palmgr. . . 1851,
1852
- *lævirostris* (Blytt) Fr. 1097,
1098
- *laxa* Wahlenb. 127 a—c
- *lepidocarpa* Tausch.
var. *turgida* Palmgren
et Florström 541, 542
- *leporina* L. 513
- *limosa* L. 126, 1849
- *livida* (Wahlenb.) Willd. 130
- *loliacea* L. 520—522
- *Macloviana* D'. Urv. . . 1077
- *magellanica* Lam. 1088
- *maritima* O. F. Müll. . . 119,
527, 1087
- *nemorosa* Reber. 510
- *norvegica* Willd. 112,
523, 1082
- *Oederi* Ehrh. var. *pul-*
chella (Lönroth) 543
- — — f. *pygmæa* Lön-
roth 138, 544
- *oedocarpa* Ands. 1853
- *ornithopus* Willd. 534, 1094
- *Pairæi* F. Schultz . . 106, 1839
- *pallescens* L. 131
- *panicea* L. 129, 1089
- *paradoxa* Willd. 512
- *pauciflora* Light. 103
- *pedata* (L.) Wahlenb. 535, 536
- *pediformis* C. A. Mey.
**rhiizodes* (Blytt) Lindb.
fil. 134, 532, 533, 1093
- *pilulifera* L. 528, 529
- *præcox* Schreb. 1855
- *pseudocyperus* L. 139
- *pulicaris* L. 101
- *remota* L. 524, 1084
- *rigida* Good. 1086 a, 1086 b
- *riparia* Curt. 549
- *rostrata* Stokes ap.
With. 545, 1096
- — × *C. vesicaria* L. . . 546
- *rotundata* Wahlenb. . . 547
- *salina* Wahlenb. **cuspi-*
data Wahlenb. a *katte-*
gatensis (Fr.) Almqu. 117 a
- — — — f. *ostrobott-*
nica Almqu. 117 b

- — * *mutica* Wahlenb. *α*
subspathacea (Drej.)
Almqu. f. *curvata* Drej. 118
- *sparsiflora* (Wahlenb.)
Steud. 1090
- *stellulata* Good. 107
- *tenuiflora* Wahlenb. 518
- *ustulata* Wahlenb. 531
- *vesicaria* L. 548
- *vulpina* L. 509
- Carum carvi* L. 829
- Cassiope tetragona* (L.) Don 846
- Centaurea austriaca* Willd. 993
- *cyanus* L. 994
- *jacea* L. 991, 1403
- *nigra* L. 992
- *scabiosa* L. 995
- Centunculus minimus* L. 1274,
1275
- Cephalanthera longifolia*
(L., Huds.) Fritsch 580
- Cerastium alpinum* L. 1164, 1933
- — × *C. vulgare* Hartm. 636
- *arvense* L. 634, 635
- *glutinosum* Fr. 640, 641
- *semidecandrum* L. 209, 1166
- *trigynum* Vill. 208
- *vulgare* Hartm. var.
glandulosum Boenn. 637—639
- — * *alpestre* (Lindbl.)
Hartm. 1165
- Ceratophyllum demersum*
L. 1172
- — var. *apiculatum*
(Cham. et Schl.) Aschers 1938
- Chærophyllum Prescottii*
(D.C.) 2036
- Chamaedaphne calyculata*
(L.) Mönch. 317 a, 317 b
- Chamaenerium angustifolium*
(L.) Scop. 298
- — f. *albiflorum* Haus-
skn. 2044
- — f. *roseum* Lindb. fil. 816,
1257, 2015
- Chamaepericlymenum sue-
cicum* (L.) Aschers. et
Græbn. 837
- Chelidonium maius* L. 667
- Chenopodium album* L. var.
viride (L.) 190
- *capitatum* (L.) Aschers 1150
- *glaucum* L. 1916
- *polyspermum* L. 189 a, 189 b
- *rubrum* L. 604
- Chimophila umbellata* (L.)
DC. 309
- Chrysanthemum chamo-
milla* (L.) Bernh. 390, 978
- *inodorum* L. 1388
- — forma 1389
- *leucanthemum* L. 389
- *suaveolens* (Pursh)
Aschers 979
- *vulgare* (L.) Bernh. 977
- — f. *tenuisectum* Beck 1387
- Chrysosplenium alternifo-
lium* L. 259
- *tetrandrum* (Lund) Th.
Fr. 706
- Cicuta virosa* L. 1269
- Cinna pendula* (Bong.) Trin. 46 a,
46 b, 1808
- Circæa alpina* L. 822
- Cirsium arvense* L. 989 a, 989 b
- — var. *incanum*
(Fischer) Ledeb. 1402
- *heterophyllum* L. 986, 987
- *oleraceum* (L.) Scop. 1400,
1401
- *palustre* L. 988
- Cnidium venosum* (Hoffm.)
Koch 304
- Cochlearia danica* L. 245, 687
- Coeloglossum viride* (L.)
Hartm. 1107
- Colpodium fulvum* (Trin.)
Griseb. f. *pendulina*
(Læst.) 479
- Comarum palustre* L. 266

- Convallaria majalis* L. 576
Convolvulus arvensis L. .. 865
Coronaria flos cuculi (L.)
 A. Br. 199
 — — f. *albiflora* 617
Coronopus didymus (L.) Sm. 693
Corydallis intermedia (L.)
 P.M.F. 669, 670
 — *solida* (L.) Sm. 226, 668
Corylus avellana L. 589
 — — f. *monstrosa* 1123
Cotoneaster integerrimus
 Medik. 273
 — — var. *uniflorus* (Bunge) 752
 — *niger* (Ehrh.) Wahlb. ... 753,
 1223
Crambe maritima L. 1201
Crepis paludosa (L.) Mönch. 399
 — *sibirica* L. 400
 — *tectorum* L. 1000, 1412, 1413
Cryptogramme crispa (L.)
 R. Br. 410
Cuscuta epithymum Murr.
 β *trifolii* (Bab.) 327
 — *europæa* L. 866
Cynanchum vincetoxicum
 (L.) Pers. 1282
Cynosurus cristatus L. 78
Cystopteris fragilis (L.)
 Bernh. 1001
 — — var. *Dickieana* (Sim.)
 Moore 1771, 1772
 — *montana* (Lam.) Bernh. 1773
Dactylis glomerata L. 1049
Daphne mezereum L. 296
Dianthus arenarius L. 202, 1155
 — *deltoides* L. 201, 620
 — *polymorphus* M.B. 1924
 — *superbus* L. 1156, 1925
 — — f. *albiflora* 1157
Diapensia lapponica L. .. 1283
Draba cinerea Adams 1959
 — — var. *ladogensis*
 Lindb. fil. (var. *brachy-*
siliqua (Mela) 244
 — *incana* L. α *confusa*
 (Ehrh.) 242
 — — β *contorta* (Ehrh.) .. 243,
 1197
 — *muralis* L. 239, 1193
 — *nemorosa* L. α *genuina*
 Boiss. 240, 684, 1194
 — — β *liocarpa* Boiss. 241,
 685, 1195, 1196
 — *rupestris* R. Br. 1960
Dracocephalum Ruyschiana
 L. 890, 891, 2074
 — *thymiflorum* L. .. 1294, 2073
Drosera intermedia Hayne 248a-c
 — *longifolia* L. 699
 — — \times *D. rotundifolia* L. 1202,
 1203
 — *rotundifolia* L. 697, 698
Dryas octopetala L. 1973
Elatine alsinastrum L. 289,
 809, 810
 — *hydropiper* L. 2009
 — *triandra* Schkular 807
 — — f. *callitrichoides* ... (W.
 Nyl.) 808
Empetrum nigrum L. 285
 — — f. *hermaphroditum* 1236
Epilobium adenocaulon
 Hausskn. 2020—2022
 — *alsinifolium* Vill. 1262, 2028
 — — \times *E. palustre* L. .. 1263
 — *collinum* Gmel. ... 300, 2018
 — *davuricum* Fisch. 1261, 2027
 — *hirsutum* L. 1258
 — *Hornemanni* Rchb. ... 1264,
 2029
 — — \times *palustre* L. 1265, 2030
 — *hypericifolium* Tausch. 817,
 2017
 — *Lamyi* F. Schultz 819
 — *montanum* L. 299, 2016
 — *obscurum* (Schreb.)
 Roth 820, 2019
 — *palustre* L. 301, 2024
 — — f. *albiflorum* 2025

- var. *angustum* Hartm. 821
 — — f. *lapponicum*.
 Hausskn. 2026
 — *roseum* Schreb. 818
 — *rubescens* Rydb. 1259,
 1260, 2023
Epipactis latifolia All. . . 1108
 — *palustris* (L.) Crantz . . 167
Equisetum arvense L. . . . 1008
 — — × *E. heleocharis*
 Ehrh. 1009
 — *heleocharis* Ehrh. 1011, 1012
 — *hiemale* L. 10, 1013
 — — × *E. variegatum*
 Schleich. 1784
 — *palustre* L. 1010, 1783
 — — f. *simplicissima* A. Br. 413
 — *scirpoides* Michx. . . 11, 416
 — *silvaticum* L. 1007
 — *variegatum* Schleich. . . 414,
 415
Erigeron acre L. 971, 1367—1371
 — *brachycephalum* Lindb.
 fil. 1372—1375
 — *canadense* L. 1366
 — *decoloratum* Lindb. fil. 1376,
 1377
Eriophorum Chamissonis C.
 A. Mey 98, 499, 500
 — — var. *subalbidum*
 Lindb. fil. 501
 — *intercedens* Lindb. fil.
 v. *medium* (Anderss.) . . 99 a
 — — var. *rufescens* (An-
 derss.) 99 b, 502—504
 — *latifolium* Hoppe 100
 — *opacum* (Björnstr.) Fer-
 nald 498, 1069
 — *polystachyum* L. 506
 — *Scheuchzeri* Hoppe . . 505
 — *vaginatum* L. 97
Eritrichum villosum (Le-
 deb.) Bunge 869, 2051
Erodium cicutarium (L.)
 L'Hér. 788
Erophila verna (L.) E. Mey 686
Erysimum cheiranthoides
 L. 238
 — — f. *brachysiliqua* 1955
 — — var. *nodosum* Fr. . . . 682,
 1956
 — *hieraciifolium* L. 1188,
 1957, 1958
Erythraea centaurium (L.)
 Pers. 324
 — *pulchella* Fr. 326, 2049
 — *vulgaris* (Rafn.) Willd. 325,
 863
Eupatorium cannabinum
 L. 377, 1364
Euphorbia cyparissias L. 799
 — *esula* L. 798
 — *helioscopia* L. 800
 — *humifusa* Willd. 2005, 2006
 — *nutans* Lag. 2007
 — *palustris* L. 797
 — *peplus* L. 801
 — *virgata* W. K. . . 1234, 1235
Euphrasia bottnica Kihlm. 353,
 927—929
 — *brevipila* Burnat et
 Greml. 349 a,
 349 b, 1316—1319
 — — f. *eglandulosa* 348,
 1320—1323
 — — **tenuis* (Brenn.) 350, 1324
 — *curta* Fr. 351 a, 351 b
 — — var. *glabrescens*
 Wettst. 1325
 — *frigida* Pugsley f. *eglan-*
dulosa (Wettst.) 352,
 925, 926, 1326, 1327
 — — f. *subglabra* 1328
 — — var. *paludosa* Towns. 1329
 — *gracilis* Fr. 930
 — *hirtella* Jord. **fennica*
 (Kihlm.) Lindb. fil. 354,
 931, 1330
 — — — f. *macrantha*
 Lindb. fil. 932

- Festuca arundinacea* Schreb.
α vulgaris Hackel 74
— *gigantea* (L.) *α typica*
Aschers. et Græbn. 75
— *ovina* L. *α genuina*
Hackel 76 a, 76 b
— *pratensis* Huds. *α ty-*
pica Hackel 73
— *rubra* L. 1060
— — var. *arenaria* (Osb.)
Fr. 1061
— *sabulosa* (Anderss.)
Lindb. fil. 77 a, 77 b, 485, 1820
Filago arvensis L. 380, 1378
Filipendula hexapetala Gi-
lib. 260
— *ulmaria* (L.) Maxim. *α*
glauca (C. F. Schultz) 708
— — *β denudata* (Presl)
Beck 709
Fragaria vesca L. 265
— — × *F. viridis* Duc-
hesne 723—725
Fritillaria meleagris L. 574
Fumaria officinalis L. 227
— *Vaillantii* Loisel. 1181
Gagea minima (L.) Ker-
Gawler 159
— *silvatica* (Pers.) Loud. 160 a,
160 b
Galeopsis bifida Boem.
forma floribus albis 898
— — *forma floribus rubris* 897
— *ladanum* L. 2075
— *speciosa* Mill. 899
— *tetrahit* L. *forma flori-*
bis albis 896
— — *forma floribus rubris* 895
Galium boreale L. *α typi-*
cum Beck 364
— *mollugo* L. 958, 1355
— — × *G. verum* L. 1356
— — × *G. verum* L. **ru-*
thenicum (Willd.) 959
— *palustre* L. 956
— — **elongatum* Presl. 1351
— *saxatile* L. 363, 1353
— *trifidum* L. 361 a, 361 b, 1352
— *triflorum* Michx. 362 a, 362 b
— *uliginosum* L. 955
— *Vaillantii* DC. 954
— *verum* L. 365, 1354
— — **ruthenicum* (Willd.) 366,
957
Gentiana amarella L. **axil-*
laris (Schmidt) Murb. 2045
— — **lingulata* (C. A.
Agardh) Aresch. 1281,
2043, 2044
— *campestris* L. **germa-*
nica (Froel.) Murb. 323,
860, 2042
— — **suecica* (Froel.)
Murb. 858, 859
— *nivalis* L. 857
— *uliginosa* Willd. 861,
862, 2046—2048
Geranium dissectum L. 786
— *lucidum* L. 281 a, 281 b
— *molle* L. 787
— *palustre* L. 784
— *pratense* L. 2001
— *pusillum* L. 785, 2002
— *Robertianum* L. 282
— *sanguineum* L. 280
— *silvaticum* L. *α typicum*
Beck 783
Geum rivale L. 261
— — × *G. urbanum* L. 1974
— *urbanum* L. 710, 711
Glaux maritima L. 850
Glechoma hederacea L. 889
Glyceria aquatica (L.)
Wahlb. 69, 480, 1058, 1059
— *fluitans* (L.) R Br. 66
— — *f. loliacea* (Huds.) 67
— *plicata* Fr. 68
— *remota* (Forselles) Fr. 70, 481
Gnaphalium norvegicum
Gunn. 1381

- silvaticum L. 381
- supinum L. 972
- uliginosum L. *a* typicum
Neum. 382 a, 382 b
- Goodyera repens (L.) R. Br. 170
- Grapphephorum arundina-
ceum (Liljebld)
- Aschers 71, 482
- Gymnadenia conopea (L.)
R. Br. 165
- — f. lapponica J. W.
Zetterstedt 579
- Gypsophila fastigiata L. . . 618,
1154, 1923
- panniculata L. 619
- Hedysarum obscurum L. . . 772
- Helodea canadensis (Rich.) 441
- Herminium monorchis (L.)
R. Br. 166 a, 166 b
- Herniaria glabra L. 1168
- Hieracium abundans Lindb.
fil. 1623
- adunans Norrl. 1728
- æruginasces Norrl. . . 1608
- ainolense Norrl. 1673
- albicans Norrl. 1579
- ambustum Norrl. 1580
- apricans Norrl. 1630
- assimilatum Norrl. f. . . 1622
- auricula L. 1589
- aurosulum Norrl. 1587, 1588
- basifolium (Fr.) Almqu. 1742
—1744
- bottnicum Dahlst. 1678
- brachycephalum Norrl. 1597
- cæsiiflorum Almqu 1706—1708
- cæsiomurorum Lindb. 1726
- cæsitiium Norrl. 1713
- cæsiium Fr., Dahlst. . . 1738,
1739
- chlorellum Sælan et
Norrl. 1705
- cirsiiforme Norrl. 1756
- coniops Norrl. 1729
- —*umbricola Sæl. 1730, 1731
- constringens Norrl. . . . 1734
- contractum Norrl. . . 1661—
1664
- coracodes Norrl. 1618
- crepidioides Norrl. . . . 1751
- crispans Norrl. 1716
- cruentiferum Norrl. et
Lindb. fil. 1757
- cyrtophyllum Norrl. . . 1626,
1627
- deficiens Lindb. fil. . . 1584
- degeroeëense Sælan,
Norrl. 1619
- denticuliferum Norrl. . . 1657,
1658
- detonsum Norrl. . . 1648, 1649
- diaphanoides Lindb. . . 1717
- diminuens Norrl. 1691
- dimorphoides Norrl. . . 1613
- distractum Norrl. 1689, 1690
- expallidiforme Dahlst. 1702
- farreum Norrl. 1620
- fennicum Norrl. . . 1599, 1600
- firmicaule Norrl. 1660
- floccimarginatum Brenn. 1754
- —*Pær-Haraldii Lindb.
fil. 1755
- fruticulescens Norrl. . . 1621 a,
1621 b
- galbanum Dahlst. 1736, 1737
- griseum Norrl. . . 1640—1644
- —*oppletiforme Norrl. 1645,
1646
- Haraldii Norrl. 1638
- holocma Brenn. 1709, 1710
- imitans Brenn. 1746
- improvisum Norrl. 1747
- incrassatiforme Norrl. 1628,
1629
- incurrens Sælan 1727
- insolens Norrl. 1614
- integratum Dahlst. 1692
- intercedens Lindb. fil. 1675
- internatum Brenn. 1723
- interruptum Norrl. 1594

- *isthmicola* Norrl. 1595, 1596
 — *jærvikylense* Norrl. et Lindb. fil. 1714, 1715
 — *juncicaule* Norrl. 1636, 1637
 — *kuopioëense* Norrl. 1745
 — *kuusamoëense* Wainio . . 1732
 — *ladogense* Norrl. 1604
 — *lateriflorum* Norrl. 1687, 1688
 — *Lauræ* Norrl. v. *angustisquamæum* Lindb. fil. . . 1760
 — *lepidoides* K. Joh. 1694
 — *linifolium* Sæl. 1749
 — *litoreum* Norrl. 1674
 — *longimanum* Norrl. 1740
 — *luteoglandulosum* Sælan 1650, 1651
 — *lyratum* Norrl. 1695
 — *macro-auricula* Lindb. fil. 1590
 — *macrolepideum* Norrl. 1578
 — *maculosum* Dahlst. . . 1712
 — *maurochlorum* Norrl. . . 1598
 — *mixopolium* Dahlst. . . 1761, 1762
 — *neglectum* Norrl. 1652—1654
 — *nigrans* Almqu. 1665
 — *occultum* Norrl. 1671, 1672
 — *orbicans* Almqu., Dahlst 1693
 — *orbolense* Stenstr. 1748
 — *parviglandulosum* Lindb. fil. 1763
 — *pellucidum* Læst. 1684
 — *pericaustum* Norrl. 1611, 1612
 — *phæostigma* Norrl. . . 1603
 — *philanthrax* Stenstr. . . 1703
 — *polycomatum* Zahn . . 1767
 — *prasinatum* Norrl. 1582
 — *pratense* Tausch. 1609, 1610
 — *prolixiforme* Norrl. . . 1741
 — *prolixum* Norrl. var. *densiglandulosum* Lindb. fil. 1711
 — *proximum* Norrl. 1697, 1698
 — *pruiniferum* Norrl. 1768, 1769
 — *psepharum* Dahlst. 1704
 — *pseudo-Blyttii* Norrl. . . 1605, 1606
 — *pseudodenticuliferum* Lindb. fil. 1659
 — *reflexum* Norrl. 1586
 — *retractatum* Norrl. 1669, 1670
 — *rufescens* Fr. 1683
 — *Sælani* Norrl. 1607
 — *sagittatum* Lindeb. 1699—1701
 — *savo-karelicum* Norrl. 1753
 — *saxifragum* Fr. . . 1676, 1677
 — *semiumbellatum* Norrl. 1758
 — *septentrionale* Norrl. . . 1615
 — *serratifrons* Almqu. . . 1685, 1686
 — *Silenii* Norrl. 1724, 1725
 — *spectabile* Norrl. 1666—1668
 — *subarctoum* Norrl. 1722
 — *subcurvescens* Norrl. . . 1631, 1632
 — — **barbaticeps* Norrl. 1634, 1635
 — — **procurrens* Norrl. . . 1633
 — *subfloribundum* N.P. . . 1593
 — *subobatescens* Brenn. var. *paucidentatum* Lindb. fil. 1750
 — *subonosmoides* Brenn. —1681
 var. *hypoteticum* (Norrl.) 1682
 — *subpellucidum* Norrl. 1718—1721
 — *subpratense* Norrl. 1601
 — *subpulvinatum* Norrl. 1602
 — *subrasile* Lindb. fil. . . 1759
 — *suecicum* Fr. var. *connectens* Norrl. 1591
 — — **hollolense* Norrl. . . 1592
 — *suomense* Norrl. . . 1655, 1656
 — *tenebrescens* Norrl. . . 1696
 — *tenebricans* Norrl. 1616, 1617
 — *tenuilingua* Norrl. 1581
 — *tonsile* Brenn. 1624, 1625

- tonsilingia Norrl. 1639
 — transgrediens Norrl. 1770
 — triviale Norrl. 1733
 — turbidum Norrl. 1752
 — umbellatum L. 1764
 — — *chloromelanum Dahlst. 1766
 — — *deustum Lindb. fil. 1765
 — venustulum Norrl. 1583
 — vicarium Norrl. 1735
 — viridilivens Norrl. 1585
 — vitellinum Norrl. f. sub-
 epilosum Lindb. fil. 1647
Hierochloë australis
 (Schrad.) R. et S. 445, 1806
 — odorata (L.) Wahlenb. 38
 — — var. firma F. Nyl. 39,
 444, 1039
Hippophaës rhamnoides L.
 1254—1256
Hippuris tetraphylla L. fil. 1267,
 1268
 — vulgaris L. 1266
Holcus mollis L. 1813
Honckenya peploides (L.)
 Ehrh. 203
Hordeum arenarium (L.)
 Aschers. 85
Humulus lupulus L. 597
Hydrocharis morsus-ranæ
 L. 1805
Hyoscyamus niger L. 1301
Hypericum montanum L. 1241,
 1242
 — perforatum L. 806
 — quadrangulum L. 288
Hypochoeris maculata L. 1405,
 2081
Impatiens noli tangere L.
 f. pallidiflora 803
 — parviflora DC. 286
Inula salicina L. *a* glabra
 Beck 1382, 1383
 — — var. subhirta C. A.
 Mey 383
Iris pseudacorus L. 1864
Isoëtes echinosporum Dur. 1023
 — lacustre L. 17, 418
Jasione montana L. 966, 1360
Juncus alpinus Vill. 563, 1859
 — — *fuscoater (Schreb.) 564,
 1860
 — articulatus L. 1861
 — balticus Willd. *a* euro-
 pæus Engelm. 146 a,
 146 b, 555
 — — \times J. filiformis L. 147,
 556, 557, 1858
 — biglumis L. 559
 — bufonius L. *a* typicus
 Aschers et Græbn. 151 a, 151 b
 — capitatus Weigel 152
 — compressus Jacq. *a*
 typicus Aschers et Græbn. 149
 — conglomeratus L. 145
 — filiformis L. 558
 — Gerardi Loisel. *a* typicus
 Buchenau 150
 — stygius L. 153,
 560, 561, 1857
 — supinus Mönch. f. pyg-
 mæus Marss. 154
 — — f. fluitans (Lam.) 562
 — trifidus L. 148 a, 148 b
Knautia arvensis (L.) Duby 964
Laserpicium latifolium L. 2034
Lactuca alpina (L.) A. Gray 1410
 — muralis (L.) Less. 398
Lamium album L. 339
 — amplexicaule L. 337
 — galeobdolon (L.) Crantz 1298
 — hybridum Villars 338, 894
 — intermedium Fr. 893, 1295
 — purpureum L. 1296, 1297
 — — f. albiflora 892
Lampsana communis L. 394
Lappula deflexa (Wahlenb.)
 Garcke 870, 2052
 — echinata Gilib. 1285
Lathræa squamaria L. 949

- Lathyrus maritimus* (L.)
 Bigelow 778
 — *montanus* Bernh. .. 781, 782
 — *niger* (L.) Bernh. 279
 — *paluster* L. 779
 — *pratensis* L. 278 a, 278 b
 — *silvester* L. 1999
 — *vernus* (L.) Bernh. *a* la-
 tifolius Schur) Rouy .. 780
Ledum palustre L. .. 311 a, 311 b
Leersia oryzoides (L.) Sw. 1035
Lemna gibba L. 553, 1100, 1101
 — *minor* L. *c. floribus* .. 143
 — *trisolca* L. 142
Lens culinaris Med. *a* vul-
 garis Gren. et Godr. .. 777
Leontodon autumnalis L. 1406
 — *hispidus* L. 996
Lepidium densiflorum
 Schrad. 1961
 — *runderale* L. 691, 1200
Limosella aquatica L. 346
 — — *f. tenuifolia* Hoffm. 910
Linaria vulgaris Mill. 345
Linnæa borealis L. .. 368, 960
Linum catharticum L. 283 a,
 283 b, 790, 791, 1232, 2003
Listera cordata (L.) R. Br. 169
Lithospermum arvense L. 330
 — — *var. coerulescens* DC. 873
Litorella uniflora (L.)
 Aschers 950, 1344, 1345
 — — *modif. isoëtoides*
 Bolle 951
Lobelia Dortmannia L. 968, 969
 — — *var. decolor* Lindb.
 fil. 970
Loiseleuria procumbens (L.)
 Desv. 312, 842
Lolium perenne L. 490
 — *remotum* Schrank 86 a, 86 b
Lonicera coerulea L. 1358
 — *xylostium* L. 1357
Lotus corniculatus L. *a*
 genuinus Pospich 765
 — — *β ciliatus* Koch .. 766, 767
Luzula campestris (L.) DC. 156,
 565, 566
 — *multiflora* (Ehrh.) Lej. 567
 — — *× L. sudetica* (Willd.)
 DC. 158
 — *nemorosa* (Poll.) E. Mey 1102,
 1862
 — *pallescens* (Wahlenb.)
 Bess. 568
 — *pilosa* L., Willd. 155
 — *sudetica* (Willd.) DC. 157
Lycopodium alpinum L. .. 417
 — *annotinum* L. .. 1015, 1016
 — — *f. pungens* Desv. .. 1017
 — *clavatum* L. 1018
 — — *f. lagopus* Læst. 1019, 1785
 — *complanatum* L. **an-*
 ceps Wallr. 14, 1020
 — — — *f. polystachyum*
 Lindb. *fil.* 15
 — — **chamæcyparissus* A.
 Br. 16
 — *inundatum* L. 13
 — *selago* L. 12, 1014
Lycopus europæus L. 332
Lysimachia nummularia L. 1276
 — *thyrsiflora* L. 319
 — *vulgaris* L. 848, 849
Lythrum salicaria L. 815
Majanthemum bifolium (L.)
 F. W. Schmidt 162
Malachium aquaticum (L.)
 Fr. 1167
Malaxis paludosa (L.) Sw. 171 a,
 171 b, 582
Malva pusilla With. 1240
Medicago falcata L. *a* ty-
 pica Pospich. 759
 — *lupulina* L. *β* Willdeno-
 wii (Boenn.) 758
Melampyrum arvense L. 942, 943
 — *cristatum* L. 2079
 — — *f. pallens* Hartm. .. 940,
 941, 2080

- nemorosum L. 944
 — — f. albidum Svaul. . . 1340
 — pratense L. *typicum
 Beck 945
 — — *vulgatum Pers. . . 946
 — silvaticum L. *genui-
 num Lindb. fil. . . 947, 1341
 — — *laricetorum Kern. 948
Melandrium affine (Vahl)
 Hartm. 1922
 — album (Mill.) Garcke 613 a,
 613 b
 — apetalum (L.) Fenzl. . . 198
 — noctiflorum (L.) Fr. . . 615
 — rubrum (Weig.) Garcke 614
 — viscosum (L.) Celak. . . 616
Melica ciliata L. 1815
 — nutans L. 61
Melilotus albus Desr. 1226, 1227
Mentha alandica Lindb. fil. 2067
 — Arrhenii Lindb. fil. 880—882
 — arvensis L. α agrestis
 Sole 883
 — — β praecox Sole . . . 884
 — — *palustris (Moench) 2068
 — gentilis L. α Friesii Bri-
 quet 879
 — litoralis Hartm. 2062—2064
 — — var. interrupta Lindb.
 fil. 2065, 2066
Menyanthes trifoliata L. 855, 856
Mercurialis annua L. . . . 796
 — perennis L. 795, 1233
Mertensia maritima (L.)
 Link. 331
Milium effusum L. 40
Möehringia trinervia (L.)
 Clairv. 204 a, 204 b
Molinia coerulea (L.)
 Moench 471
Monotropa hypopitys L.
 *hirsuta (Roth.) 310
Montia lamprosperma
 Cham. 1920
Myosotis arvensis (L.) Hill. 878,
 2061
 — caespitosa C. F. Schultz 874
 — collina Hoffm. 876,
 1289, 2060
 — — f. albiflora 1290
 — laxa Lehm. 875, 1287, 2057
 — micrantha Pall. 1288,
 2058, 2059
 — scorpioides L. . . 1286, 2054
 — — var. micrantha Opiz. 2056
 — — var. strigulosa Rehb. 2055
 — silvatica (Ehrh.) Hoffm. 877
 — sparsiflora Mikan 1291—1293
Myosurus minimus L. 217, 1944
Myrica gale L. 588
Myriophyllum alterniflo-
 rum DC. 825
 — spicatum L. . . 823, 824, 2031
 — verticillatum L. α inter-
 medium Koch 302
Myrrhis aromatica (L.)
 Sprengel 305
 — odorata (L.) Scop. . . . 836
Najas marina L. 1032
 — tenuissima A. Br. 438, 1801
Nardus stricta L. . . . 41 a, 41 b
Nasturtium amphibium (L.)
 R. Br. 228 a, 671
 — — f. indivisum DC. . . 228 b
 — palustre (Leysser) DC. 229
 — prostrata (Bergeret) var.
 stenocarpa (Godron) . . 1183
 — silvestre (L.) R. Br. . . 672,
 1182, 1949
Neottia nidus avis (L.)
 Rich. 168, 581
Nonnea pulla (L.) DC. . . 872
Nuphar luteum (L.) Sm. . . 647
 — — \times N. pumilum
 (Timm.) Sm. 1169
 — pumilum (Timm.) Sm. 1170
Nymphæa candida Presl. 648
 — tetragona Georgi 1171, 1937
Odontites litoralis Fr. . . . 1315

- serotina (Lam.) Rchb. 923,
924, 1309, 1310
- verna (Bell.) Dum. . . 1311—
1314
- Oenanthe aquatica (L.)
Poir. 833, 1270
- Ophioglossum vulgatum L. 411
- Orchis incarnatus L. . . . 1105
- maculatus L. 1865
- masculus L. 578
- Origanum vulgare L. . . . 333,
885, 2069
- Oxalis acetosella L. f. albo-
venosa Lindb. fil. . . . 1231
- — f. coerulea (Pers.) . . 789
- Oxytropis campestris (L.)
DC. f. sordida (Willd.) 768,
769, 1996
- Pæonia anomala L. *a* typica
Huth. 212
- Paris quadrifolius L. . . . 577
- Parnassia palustris L. . . . 1970
- Pedicularis lapponica L. . . 937
- palustris L. 936, 1335
- — var. borealis J. W.
Zett. 1336, 1337
- — *opsiantha (E. L.
Ekman) 1338
- sceptrum Carolinum L. 939,
1339
- verticillata L. 938
- Peplis portula L. 297
- Petasites officinalis Mœnch 392
- Peucedanum palustre (L.)
Moench 1271
- Phaca frigida L. 1997
- Phalaris arundinacea L. . . 1036,
1037
- Phippsia algida (Soland.)
R. Br. 1042
- Phleum alpinum L. 1040
- Boehmeri Wibel . . 43 a—43 c
- pratense L. 42 a, 42 b
- Phragmites communis Trin. 60
- — f. flavescens Custer 1048
- Phyllodoce coerulea (L.)
Bab. 843, 844
- Picris hieracioides L. . . . 997,
1407, 1408
- Pilularia globulifera L. . . 1006
- Pimpinella magna L. . . . 830
- saxifraga L. *a* rotundifo-
lia Scop. 831
- — β dissecta (M. B.)
Spreng. 832
- Pinguicula alpina L. 356 a, 356 b
- villosa L. 357 a, 357 b
- vulgaris L. 355
- Pinus silvestris L. var.
erythranthera Sanio . . 420
- Plantago lanceolata L. 952, 953
- — var. sphaerostachya
Wimm. 359
- intermedia Gil. 1346
- major L. *a* typica Beck. 358
- maritima L. 360
- media L. 1347
- ramosa (Gil.) Aschers. 1348
- Plantanthera bifolia (L.)
Rchb. 1106
- Poa alpigena (Fr.) Lindm. 1055,
1819
- alpina L. . . . 473, 1054, 1052
- annua L. 62
- compressa L. . . . 63, 475
- glauca Vahl 1050, 1816, 1817
- pratensis L. *angustifo-
lia (L.) 65, 1056, 1057
- — *irrigata (Lindm.) . . 478
- nemoralis L. . . . 474, 1053
- palustris L. . . . 1054, 1818
- remota Forselles . . 476, 477
- trivialis L. 64
- Polemonium campanula-
tum (Th. Fr.) Lindb.
fil. 867, 868
- coeruleum L. 2050
- humile Willd. 328
- Polygala amarellum Crantz 284,
793, 794, 2004

- vulgare L. 792
- Polygonatum multiflorum*
(L.) All. 164
- officinale All. 163, 575
- Polygonum æquale* Lindm. 1148,
1149
- amphibium L. 1145
- bistorta L. 184
- convolvulus L. 1915
- foliosum Lindb. fil. 188, 603
- heterophyllum Lindm. 1147
- hydropiper L. 187
- minus Huds. 1146
- nodosum Pers. 1913, 1914
- persicaria L. 186
- tomentosum Schrank 1912
- — f. viride Sælan 185
- viviparum L. 1142—1144
- Polypodium vulgare* L. var.
attenuatum Milde 7
- Potamogeton alpinus* Bal-
bis 1026
- compressus L. 433, 1028
- crispus L. 432
- filiformis Pers. 28, 434
- — mf. terrestris 1030
- — × *P. vaginatus*
Turcz. 1031, 1798
- gramineus L. var. flu-
viatilis Fr. f. angustifo-
lius Tiselius 1027
- — × *P. natans* L. 22,
424, 425, 1792
- — × *P. perfoliatus* L. 25 a,
25 b, 431
- lucens L. 1794
- natans L. 1025
- — modif. terrestris 1791
- obtusifolius Mert. et
Koch 1029
- pectinatus L. 27
- — × *P. vaginatus*
Turcz. 435
- perfoliatus L. 24
- polygonifolius Pourret 23 a,
426, 427
- — f. amphibius Fr. 23 b, 428
- prælongus Wulfen 1793
- rutilus Wolfgang 1796, 1797
- vaginatus Turcz. 26 a, 26 b
- Zizii M. et K. 429, 430, 1795
- Potentilla anserina* L. *α* ar-
gentina (Huds.) 267, 1980
- argentea L. *α* typica
Beck 728, 1982
- Egedii Wormsk. 1981
- erecta (L.) Hampe 731
- impolita Wahlenb. 1210, 1983
- multifida L. *lapponica
F. Nyl. 727
- nivea L. 1985
- norvegica L. 726
- reptans L. 732, 733
- strigosa Pall., Bunge 1979
- Tabernæmontani
Aschers 729
- thuringiaca Bernh.
*Goldbachii (Rupr.) Th.
Wolf 730, 1984
- villosa (Crantz) *α* typica
Th. Wolf 268, 1211
- — f. ad formam ternat-
tam Blytt 1212
- Primula farinosa* L. 853
- sibirica Jacq. 1278
- stricta Hornem. 322 a, 322 b
- veris L. 2040, 2041
- — *β* canescens Opiz 854 a,
854 b
- Prunus padus* L. 1206, 1207
- spinosa L. 1205
- Pteridium aquilinum* (L.)
Kuhn *α* glabra (Hook.) 409
- Pulmonaria officinalis* L. *α*
immaculata Opiz. 329
- Pulsatilla patens* (L.) Mill. 214
- vernalis (L.) Mill. 1943
- Pyrola chlorantha* Sw. 306, 840
- media Sw. 307

- minor L. 803
 — — × *P. rotundifolia* L. 2037
 — rotundifolia L. 838
 — — f. pallida Lindb. fil. 839
 — uniflora L. 1272
Quercus robur L. f. cuneifolia Vukot. 1134
Ramischia secunda (L.) Garcke 841
Ranunculus acer L. 222
 — auricomus L. 1177
 — — var. fallax Wimm. .. 221, 1178
 — — *sibiricus (Glehn) Lindb. fil. 661, 1179
 — Baudotii Godr. f. submersus Gren. et Godr. 219
 — bulbosus L. 662, 663
 — cassubicus L. 1180
 — cymbalaria Pursh. 1945
 — ficaria L. 225, 664, 665
 — — var. obtusissimus Lindb. fil. 666, 1947
 — flammula L. 658
 — glacialis L. 220
 — hyperboreus Rottb. .. 1946
 — lingua L. 1176
 — nivalis L. 660
 — paucistamineus Tausch
 a typicus Lindb. fil. f. heterophyllus (Frey) 218 a
 — — — f. submersus Lindb. fil. 218 b
 — — *β* Drouetii (Schultz) f. fluviatilis Lindb. fil. 655
 — — *eradicatus (Læstæd.) f. submersa Lindb. fil. 656
 — peltatus Schrank 657
 — repens L. 223
 — reptans L. 659
 — sceleratus L. 224
Raphanus raphanistrum L. 696
Rhamnus cathartica L. .. 804
 — frangula L. 287
Rhynchospora alba (L.) Vahl. 87 a, 87 b, 1066
 — fusca (L.) Roem. et Schult. 88, 1067
Ribes alpinum L. 707
 — nigrum L. 1204
 — rubrum L. var. 1971
 — — var. glabellum Trautv. et Meyer 1972
Rosa acicularis Lindl. 747
 — canina L. 751
 — cinnamomea L. 1224
 — coriifolia Fr. 1222
 — tomentosa Sm. var. umbelliflora (Sw.) .. 748—750
Rubus arcticus L. 720
 — — f. leuciticus Fr. 721, 1978
 — — × *R. saxatilis* L. 263, 722
 — cæsius L. × *R. idæus* L. 714
 — — × *R. saxatilis* L. .. 715
 — chamæmorus L. 264
 — humilifolius C. A. Mey 262, 1977
 — idæus L. 716
 — — f. monstr. anomalus Arrh. 1209
 — — f. longisepala Lindb. fil. 1976
 — — var. chlorocarpus Krause 717
 — — × *R. saxatilis* L. .. 718
 — pruinosis Arrh. .. 713, 1208
 — saxatilis L. 719
 — suberectus G. Anderson 712, 1975
Rumex acetosella L. 602 a, 602 b, 1141
 — aquaticus L. 1907, 1908
 — — × *R. obtusifolius* L. 601, 1909
 — auriculatus (Wallr.) .. 1910, 1911
 — crispus L. 183
 — domesticus Hartm. 600
 — — × *R. fennicus* Murb. 1139

- femicus* Murb. 1138
 — *hydrolapathum* Huds. 1906,
 1140
 — *maritimus* L. 599, 1905
Ruppia maritima L. **brevi-*
rostris (Agardh.) 30, 436
 — — **spiralis* L., Dumort. 29
Sagina maritima G. Don 622,
 623, 1158, 1159
 — *nodosa* (L.) Fenzl. 1926
 — — var. *glandulosa*
 (Bess.) 624
 — *procumbens* L. 621
Sagittaria natans Pallas 440,
 1034
 — *sagittifolia* L. 1033
Salicornia herbacea L. 605, 606
Salix acutifolia Willd. 1109
 — *amygdalina* L. 583, 1866
 — *arbuscula* L. 174 a, 174 b
 — *aurita* L. 1881
 — — × *S. livida* Wg. 1882
 — — × *S. myrtilloides* L. 1883
 — — × *S. repens* L. 1884
 — *caprea* L. 584,
 1116, 1117, 1877, 1878
 — — × *S. *cinerascens*
 (Wg.) 1879
 — — × *S. livida* Wg. × *S.*
xerophila Flod. 1118
 — — × *S. phylicifolia* L. 585
 — — × *S. repens* L. 1880
 — *cinerea* L. 1876
 — *depressa* L. **livida*
 (Wg.) 586, 1885, 1886
 — — — × *S. xerophila*
 Flod. f. *monstrosa* 1119
 — — **cinerascens* (Wg.) . . . 1887
 — *glaucal* L. 175, 1891—1893
 — — × *S. nigricans* Sm. 1120—
 1122
 — *hastata* L. 1115, 1872—1874
 — *herbacea* L. 1896
 — — × *S. lapponum* L. . . . 1897
 — *lapponum* L. 1889
 — — var. *serrata* Flod. . . . 1890
 — *myrsinites* L. 1894
 — — × *S. nigricans* Sm. 1895
 — *myrtilloides* L. 587
 — *nigricans* Sm. 1110, 1867
 — — f. *latifolia* 1868
 — — × *S. repens* L. 176
 — *pentandra* L. 172
 — *phylicifolia* L. 1111—1114,
 1869, 1870
 — — × *S. *rosmarinifolia*
 (L.) C. Hartm. 1871
 — *pyrolifolia* Ledeb. 1875
 — *repens* L. 1888
 — *reticulata* L. 1898
 — *stipularis* Sm., Auct.
 ross., forma 173
Salsola kali L. 1919
 — — var. *calvescens* Gren.
 et Godr. 192
Samolus Valerandi L. 1279
Sanguisorba minor Scop.
 **dictyocarpa* (Spach)
 Gams 1988
Sanicula europæa L. 826
Saussurea alpina (L.) DC. 990,
 1404
Saxifraga adscendens L. 257,
 1969
 — *aizoides* L. 253, 1968
 — *cæspitosa* L. 256 a, 256 b
 — *granulata* L. 255
 — *hirculus* L. 254, 705
 — *nivalis* L. 252, 703, 1967
 — *oppositifolia* L. 704
 — *tridactylites* L. 258 a, 258 b
Scheuchzeria palustris L. 32, 439
Schoenus ferrugineus L. . . . 491,
 1065, 1829, 1830
Scirpus acicularis L. 92
 — *cæspitosus* L. **austria-*
cus (Palla) 493
 — *compressus* (L.) Pers. 496
 — *eupaluster* Lindb. fil. f.
nulliseta Lindb. fil. 1831

- — × *S. longifolia*
 Mühlb. 631,
 632, 1163
crassifolia Ehrh. *α* pa-
ludosa (Læstæd.) Fr. 207,
 633
graminea L. 206, 627, 628
holostea L. 626
longifolia Mühlenb. 1931
media (L.) Cyrillo 625
nemorum L. 1161
palustris (Murr.) Retz.
f. glauca With. 1929
 — *f. parviflora* (Klett.
 et Richt.) 1162, 1930
uliginosa Murr. 629, 1932
Stenophragma suecicum
 (Fr.) Cel. 236 a, 236 b, 681
Thalianum (L.) Celak. 235,
 680, 1953, 1954
Stratiotes aloides L. 442,
 443, 1804
Struthiopteris filicastrum
 All. 1002
Suaeda maritima (L.) Dum-
 ort. 607, 608, 1151
Subularia aquatica L. 246
 — — *f. elongata* 688
Succisa pratensis Mœnch *α*
glabrata (Peters.) 371, 965
Taraxacum aculeatum
 Hagl. 1449
 — *acutidens* Lindb. fil. 1450,
 1451
 — *acutisectum* Markl. 1452
 — *æquilobum* Dahlst. 1453
 — *alatum* Lindb. fil. 1454
 — *albicollum* Dahlst. 1455—
 1458
 — *altissimum* Lindb. fil. 1459,
 1460
 — *angustisectum* Lindb.
 fil. 1414
 — *angustisquamum*
 Dahlst. 1461
 — *assurgens* Markl. 1462
 — *atrimarginatum* Lindb.
 fil. 1463
 — *atripietum* Markl. 1464
 — *aurosulum* Lindb. fil. 1465
 — *balticum* Dahlst. 397,
 1427—1429
 — *Boldtii* Lindb. fil. 1466
 — *boreophilum* Lindb. fil. 1467
 — *brachycranum* Dahlst. 1415
 — *caloschistum* Dahlst. 1468,
 1469
 — *canaliculatum* Lindb.
 fil. 1470—1472
 — *canentifolium* Markl. 1473
 — *canoviride* Lindb. fil. 1474
 — *caudatum* Dahlst. 1475,
 1476
 — *cochleatum* Dahlst. et
 Lindb. fil. 1440, 1441
 — *concolor* Lindb. fil. 1477
 — *copidophyllum* Dahlst. 1478
 — *crassipes* Lindb. fil. 1479,
 1480
 — *crebridens* Lindb. fil. 1481—
 1485
 — *crispifolium* Lindb. fil. 1486,
 1487
 — *croceiflorum* Dahlst. 1488
 — *croceum* Dahlst. 1432
 — *crocodes* Dahlst. 1430
 — *cuspidatum* Markl. 1489
 — *cyanolepis* Dahlst. 1490—
 1492
 — *Dahlstedtii* Lindb. fil. 1493,
 1494
 — *dissimile* Dahlst. 1416
 — *distantilobum* Lindb.
 fil. 1495, 1496
 — *duplidens* Lindb. fil. 1497,
 1498
 — *Ekmanii* Dahlst. 1499
 — *epacroides* Markl. 1500
 — *falciferum* Markl. 1501
 — *fasciatum* Dahlst. 1502, 1503

- fulvum Raunk. 1417, 1418
 — galeatum Dahlst. 1442, 1443
 — Gelertii Raunk. 1504, 1505
 — gibberum Markl. 1506, 1507
 — gracilentum Lindb. fil. 1508
 — hæmatopus Lindb. fil. 1509
 — hamatiforme Dahlst. 1510,
 1511
 — hamatum Raunk. 1512, 1513
 — Haraldii Markl. 1514
 — Hjeltii Dahlst. 395
 — jærvikylense Lindb. fil. 1515,
 1516
 — karelicum Lindb. fil et
 Markl. 1517
 — kittilense Lindb. fil. 1518,
 1519
 — Kjellmanii Dahlst. 1520,
 1524
 — kuusamoëne Lindb.
 fil. et Palmgr. 1444, 1445
 — latisectum Lindb. fil. 1522,
 1523
 — linguicuspis Lindb. fil. 1524
 — lingulatum Markl. 1525
 — litorale Raunk. 1526, 1527
 — livonicum Markl. 1528, 1529
 — lojoëne Lindb. fil. 1530—
 1532
 — longisquameum Lindb.
 fil. 1533
 — marginatum Dahlst. 396,
 1419—1421
 — Marklundii Palmgr. 1534
 — mauranthes Markl. 1535
 — mimulum Dahlst. 1536
 — mucronatum Lindb. fil. 1537,
 1538
 — obliquilobum Dahlst. 1539
 — obscurans (Dahlst.)
 Hagl. 1422, 1423
 — obtusulum Lindb. fil. 1540—
 1542
 — pallidipes Markl. 1543
 — pallidulum Lindb. fil. 1544
 — paradoxum Palmgr. 1545
 — parvuliceps Lindb. fil. 1546
 — pectinatiforme Lindb.
 fil. 1547, 1548
 — penicilliforme Lindb.
 fil. 1549
 — perattenuatum Lindb.
 fil. 1446
 — polyodon Dahlst. 1550
 — præcox Dahlst. 1551
 — præstans Lindb. fil. 1433,
 —1435
 — proximum Dahlst. 1424
 — pseudofulvum Lindb.
 fil. 1425
 — pulcherrimum Lindb.
 fil. 1552
 — pulchrifolium Markl. 1553
 — recurvum Dahlst. 1554
 — reflexilobum Lindb. fil. 1555
 — remotijugum Lindb. fil. 1556,
 1557
 — retroflexum Lindb. fil. 1558,
 1559
 — rubicundum Dahlst. 1426
 — rubrolineatum Lindb.
 fil. 1447
 — sagittifolium Lindb. fil. 1436
 —1439
 — semiglobosum Lindb.
 fil. 1560, 1561
 — septentrionale Dahlst. 1562—
 1564
 — simulum Brenner 1431
 — subalatum Lindb. fil. 1565
 — submaculosum Markl. 1566—
 1568
 — subpenicilliforme Lindb.
 fil. 1569
 — Sundbergii Dahlst. 1570
 — tenebricans Dahlst. 1571,
 1572
 — triangulare Lindb. fil. 1573,
 1574
 — tumentilobum Markl. 1575

- *uberilobum* Lindb. fil. 1448
 — *vitellinum* Dahlst. 1576
 — *xanthostigma* Lindb.
 fil. 1577
Taxus baccata L. 419, 1786
Thalictrum alpinum L. .. 1942
 — *aquilegifolium* L. 1174
 — *flavum* L. 1175, 1941
 — *simplex* L. var. *boreale*
 (F. Nyl.) Fr. 1940
Thlaspi alpestre L. 690
 — *arvense* L. 689
Thymus chamædrydys Fr. .. 334
 — *serpyllum* L. 2071
 — — var. *angustifolius*
 Pers. 886, 887, 2070
Tilia cordata Mill. 805,
 1237, 1238, 2008
 — — f. *ekebergensis* Lindb.
 fil. 1239
Tofieldia palustris Huds. .. 569
Torilis anthriscus (L.)
 Gmel. 2035
Trichophorum alpinum (L.)
 Pers. 96
Trientalis europæa L. 847
Triglochin maritima L. .. 33
 — *palustris* L. 34 a, 34 b
Trifolium arvense L. 762,
 1992, 1993
 — *fragiferum* L. 763
 — *medium* L. **flexuosum*
 Jacq. 274, 761
 — *montanum* L. .. 1228, 1994
 — *pratense* L. var. *hetero-*
 phyllum Lej. et Court. 760
 — *procumbens* L. 1995
 — *repens* L. 1229
 — *spadiceum* L. 275
 — *strepens* Crantz 764
Trisetum flavescens (L.) P.
 B. var. *subalpestre*
 (Hn.) Lindb. fil. 462
Trollius europæus L. 1173
Turritis glabra L. 230, 674
Tussilago farfara L. 1393
Typha angustifolia L. 1787
 — *latifolia* L. 421
Ulmus lævis Pall. 181, 1135, 1136
 — *scabra* Mill. 180
Urtica dioeca L. .. 598 a, 598 b
 — — var. *Sondénii* Sim-
 mons 1904
 — *utens* L. 182
Utricularia intermedia
 Hayne 1342, 1343
Vaccinium microcarpum
 Turcz. 314
 — *oxycoccus* L. 313
 — *uliginosum* L. 1273
 — *vitis* Idæa L. 845
Valeriana officinalis L. .. 963
 — *sambucifolia* Mikan fil. 1359
Valerianella olitoria L. ..370 a,
 370 b
Verbascum nigrum L. 907
 — — × *V. thapsus* L. 1303
 — *thapsus* L. 1302
Veronica anagallis aquatica
 L. 912
 — *arvensis* L. 918, 1306
 — *beccabunga* L. 913
 — *chamædrydys* L. 914
 — — f. *albiflora* 1304
 — *fruticans* Jacq. 347
 — *hederifolia* L. 920, 921
 — *longifolia* L. 916
 — *officinalis* L. 915
 — *peregrina* L. 1305
 — *polita* Fr. 919
 — *scutellata* L. 911
 — *serpyllifolia* L. 917
 — *spicata* L. 2078
 — *verna* L. 1307
Viburnum opulus L. 367
Vicia cassubica L. 2000
 — *cracca* L., Sm. 277
 — *sepium* L. 776, 1230
 — *silvatica* L. 773

- tetrasperma (L.) Mœnch. 276, 1998
 — villosa Roth 774, 775
Vincetoxicum officinale
 Moench 864
Viola arvensis Murr *a* *com-*
munis Wittr. 295, 814
 — biflora L. 1252, 1253
 — canina L. **ericetorum*
 Schrad. 2012
 — collina Bess. 1247
 — epipsila Ledeb. . . 1245, 2010
 — — × *V. palustris* L. . . 2011
 — mirabilis L. 292
 — montana L. × *V. Rivi-*
niana Rchb. 1248
 — — × *V. rupestris* Schm.
v. arenaria (D. C.) Beck 1249
 — palustris L. 1243, 1244
 — Riviniana Rchb. 293
 — rupestris Schm. var.
arenaria (D. C.) Beck . . 1251
 — — × *V. Riviniana*
 Rchb. 813
 — Selkirkii Goldie 290 a, 290 b
 — stagnina Kit. 811, 812, 1250
 — tricolor L. *a* *genuina*
 Wittr. f. *versicolor*
 Wittr. 294, 2013
 — uliginosa Bess. 1246
Viscaria alpina (L.) G. Don. 612
 — viscosa (Scop.) Aschers. 197,
 611
Woodsia alpina (Bolton)
 S. F. Gray 1776, 1777
 — glabella R. Br. 407, 1778
 — ilvensis (L.) R. Br. 1003, 1004
Zannichellia major Boenn. 1799
 — polycarpa Nolte 31, 437, 1800
Zostera marina L. 423

Fasc. I—VIII N:ris 1—400 (1906).

Fasc. IX—XX N:ris 401—1000 (1916).

Fasc. XXI—XXVI N:ris 1001—1300 (1933).

Fasc. XXVII—XLII N:ris 1301—2081 (1944).

Curavit

HARALD LINDBERG

New York Botanical Garden Library

QK 290 .L46 fasc.21

Lindberg, Harald/Schedae operis quod ins

gen



3 5185 00042 3945

